

**Landesamt für  
Datenverarbeitung und Statistik**



# **Statistische Berichte**

---

A IV 6 - j / 97

**Gemeldete  
Geschlechtskrankheiten  
im Land Brandenburg**

**1997**

**Erarbeitet:**

Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Brandenburg  
Dezernat Gesundheit, Sozialleistungen, Rechtspflege

**Herausgeber:**

Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Brandenburg  
Dezernat Öffentlichkeitsarbeit  
Postfach 60 10 52  
14410 Potsdam

Telefon: (0331) 39 403 - 405  
Fax: (0331) 39 418  
Internet: <http://www.brandenburg.de/lds/>  
E-Mail: [Info@lds.brandenburg.de](mailto:Info@lds.brandenburg.de)

Erschienen im März 1998  
Preis: 4,00 DM

**Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet!**

## Inhalt

	Seite
Erläuterungen	4
Tabellen	
1. Gemeldete Erkrankte an Syphilis 1980, 1985 und 1990 bis 1997	6
2. Gemeldete Erkrankte an Tripper 1980, 1985 und 1990 bis 1997	6
3. Gemeldete Erkrankte an Syphilis 1980, 1985 und 1990 bis 1997 nach Altersgruppen und Geschlecht	7
4. Gemeldete Erkrankte an Tripper 1980, 1985 und 1990 bis 1997 nach Altersgruppen und Geschlecht	8
5. Gemeldete Erkrankte an Geschlechtskrankheiten insgesamt 1990, 1992, 1994 und 1996 nach Verwaltungsbezirken	9
6. Gemeldete Erkrankte an Geschlechtskrankheiten 1997 nach Art der Erkrankung, Geschlecht und Verwaltungsbezirken	10

## Erläuterungen

### Ziel der Statistik

Die Statistik der Geschlechtskrankheiten beinhaltet Angaben über Erkrankte nach Alter, Geschlecht und Art der Erkrankung. Mehrfachinfektionen einer Person werden als ein Erkrankungsfall gezählt.

Aus den vorliegenden Zeitreihen sollen epidemiologische Erkenntnisse zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten gewonnen werden.

### Rechtsgrundlage

Rechtsgrundlage ist der § 11 des Gesetzes zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 2126-4 veröffentlichten bereinigten Fassung, geändert durch Artikel 55 des 2. Statistikbereinigungsgesetzes vom 2. August 1994 (BGBl. I S. 1963), zuletzt geändert durch Artikel 8 der Statistikänderungsverordnung (StatÄndV) vom 20. November 1996 (BGBl. I S. 1804).

### Berichtskreis

Jeder Fall einer ansteckungsfähigen Erkrankung an einer Geschlechtskrankheit ist von dem behandelnden oder sonst hinzugezogenen Arzt unverzüglich ohne Nennung des Namens und der Anschrift des Erkrankten dem Gesundheitsamt, in dessen Bezirk er seine ärztliche Tätigkeit ausübt, zu melden.

Werden Fälle einer ansteckungsfähigen Geschlechtskrankheit bei Soldaten der Bundeswehr festgestellt oder behandelt, so sind diese dem Standortarzt zu melden. Die Meldung ist an das Statistische Landesamt des zuständigen Landes weiterzuleiten.

### Methodische Hinweise

Der vorliegende Statistische Bericht beinhaltet Daten der Jahre 1980, 1985 und 1990 bis 1997. Seit 1991 ist die Altersaufgliederung verändert, so daß bei Altersgruppierungen keine vollständige Übereinstimmung in den Altersgruppen 15 bis unter 25 Jahren bei zurückliegenden Zeiträumen erreicht werden kann.

Zu beachten ist, daß die kreislich aufgeführten Erkrankungsfälle nicht immer dem Wohnort des behandelten Patienten entsprechen, da der Behandlungsort nicht identisch mit dem Wohnort sein muß. Diese Kreisauflösungen geben somit nur Auskunft über die behandelten Geschlechtskrankheiten im Kreis, für die eine Meldung erfolgte.

Durch die Anonymisierung der Meldungen an die Gesundheitsämter lassen sich Doppelzählungen, die durch Konsultation eines weiteren Arztes als auch durch Mehrfachinfektionen einer Person im gleichen Berichtsjahr entstehen können, nicht vermeiden.

### Systematiken

Als Systematik wird die „Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen“ (ICD) der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 9. Revision verwendet.

## Allgemeiner Überblick

Die seit Jahren beobachtete Verringerung gemeldeter Geschlechtskrankheiten hat sich bis 1996 fortgesetzt. Im Berichtsjahr 1997 wurden 30 an Syphilis, 146 an Tripper sowie eine an Weichem Schanker erkrankte Person registriert. Mit der Gesamtzahl von 177 Erkrankten ist gegenüber den Vorjahren eine leichte Steigerung an gemeldeten Geschlechtskrankheiten zu verzeichnen.

Der größte Anteil gemeldeter Fälle betraf Erkrankungen an Tripper.

Rund 71 Prozent der Erkrankten insgesamt (126 Personen) waren männlichen Geschlechts. 51 gemeldete ansteckungsfähige Geschlechtskrankheiten bezogen sich auf das weibliche Geschlecht. Die gefährdetsten Altersgruppen waren 20- bis unter 50jährige Männer und Frauen.

## Zeichenerklärung (nach DIN 55 301)

- nichts vorhanden (gleich null)
- ... Angabe fällt später an

Durch Auf- bzw. Abrunden von Einzelangaben können sich geringe Abweichungen in den Endsummen ergeben.

**1. Gemeldete Erkrankte an Syphilis 1980, 1985 und 1990 bis 1997**

Jahr	Syphilis			Insgesamt je 100 000 der Bevölkerung
	insgesamt	männlich	weiblich	
1980	95	65	30	3,5
1985	25	18	7	0,9
1990	33	22	11	1,3
1991	48	28	20	1,9
1992	41	29	12	1,6
1993	36	21	15	1,4
1994	24	9	15	0,9
1995	44	20	24	1,7
1996	24	17	7	0,9
1997	30	18	12	...

**2. Gemeldete Erkrankte an Tripper 1980, 1985 und 1990 bis 1997**

Jahr	Tripper			Insgesamt je 100 000 der Bevölkerung
	insgesamt	männlich	weiblich	
1980	8 400	4 487	3 913	310,6
1985	7 758	4 123	3 635	286,1
1990	2 075	1 219	856	80,1
1991	1 009	676	333	39,4
1992	746	484	262	29,3
1993	457	301	156	17,9
1994	316	197	119	12,5
1995	203	125	78	8,0
1996	145	94	51	5,7
1997	146	108	38	...

### 3. Gemeldete Erkrankte an Syphilis 1980, 1985 und 1990 bis 1997 nach Altersgruppen und Geschlecht

Jahr	Alter von ... bis unter ... Jahren								insgesamt
	unter 15	15 bis unter 20 <sup>1)</sup>	20 bis unter 25 <sup>2)</sup>	25 bis unter 30	30 bis unter 40	40 bis unter 50	50 und älter	unbekannt	
insgesamt									
1980	-	5	39	21	19	6	5	-	95
1985	-	-	12	2	4	5	2	-	25
1990	-	2	13	8	6	3	1	-	33
1991	1	2	14	8	10	5	8	-	48
1992	-	7	14	6	7	4	2	1	41
1993	-	2	14	12	6	1	1	-	36
1994	-	-	12	6	4	1	1	-	24
1995	1	2	13	8	9	9	2	-	44
1996	-	-	3	6	13	1	1	-	24
1997	1	1	6	8	7	5	1	1	30
männlich									
1980	-	1	21	17	18	5	3	-	65
1985	-	-	7	2	4	3	2	-	18
1990	-	-	8	7	3	3	1	-	22
1991	-	-	10	5	7	4	2	-	28
1992	-	3	11	5	4	4	1	1	29
1993	-	1	11	4	4	1	-	-	21
1994	-	-	1	4	2	1	1	-	9
1995	-	-	2	6	6	5	1	-	20
1996	-	-	1	4	11	1	-	-	17
1997	1	1	2	4	5	4	1	-	18
weiblich									
1980	-	4	18	4	1	1	2	-	30
1985	-	-	5	-	-	2	-	-	7
1990	-	2	5	1	3	-	-	-	11
1991	1	2	4	3	3	1	6	-	20
1992	-	4	3	1	3	-	1	-	12
1993	-	1	3	8	2	-	1	-	15
1994	-	-	11	2	2	-	-	-	15
1995	1	2	11	2	3	4	1	-	24
1996	-	-	2	2	2	-	1	-	7
1997	-	-	4	4	2	1	-	1	12

1) 1980, 1985 und 1990 beziehen sich die Angaben auf die Altersgruppe 15 bis unter 18 Jahre

2) 1980, 1985 und 1990 beziehen sich die Angaben auf die Altersgruppe 18 bis unter 25 Jahre

#### 4. Gemeldete Erkrankte an Tripper 1980, 1985 und 1990 bis 1997 nach Altersgruppen und Geschlecht

Jahr	Alter von ... bis unter ... Jahren								
	unter 15	15 bis unter 20 <sup>1)</sup>	20 bis unter 25 <sup>2)</sup>	25 bis unter 30	30 bis unter 40	40 bis unter 50	50 und älter	unbekannt	insgesamt
insgesamt									
1980	20	799	5 080	1 548	737	203	13	-	8 400
1985	9	535	4 964	1 384	706	131	29	-	7 758
1990	6	167	1 262	417	186	29	8	-	2 075
1991	4	173	386	247	168	19	6	6	1 009
1992	5	122	261	179	130	35	9	5	746
1993	3	50	159	116	102	16	7	4	457
1994	2	38	88	81	84	16	6	1	316
1995	-	20	46	61	54	15	6	1	203
1996	-	19	37	29	40	13	5	2	145
1997	-	23	26	33	42	14	8	-	146
männlich									
1980	1	166	2 624	1 059	482	144	11	-	4 487
1985	-	144	2 545	862	455	95	22	-	4 123
1990	2	53	730	283	126	19	6	-	1 219
1991	-	81	265	184	121	15	6	4	676
1992	2	46	169	132	97	27	7	4	484
1993	-	20	93	87	81	12	6	2	301
1994	1	13	52	54	63	8	6	-	197
1995	-	11	20	35	40	14	4	1	125
1996	-	10	19	18	32	9	4	2	94
1997	-	13	21	24	35	8	7	-	108
weiblich									
1980	19	633	2 456	489	255	59	2	-	3 913
1985	9	391	2 419	522	251	36	7	-	3 635
1990	4	114	532	134	60	10	2	-	856
1991	4	92	121	63	47	4	-	2	333
1992	3	76	92	47	33	8	2	1	262
1993	3	30	66	29	21	4	1	2	156
1994	1	25	36	27	21	8	-	1	119
1995	-	9	26	26	14	1	2	-	78
1996	-	9	18	11	8	4	1	-	51
1997	-	10	5	9	7	6	1	-	38

1) 1980, 1985 und 1990 beziehen sich die Angaben auf die Altersgruppe 15 bis unter 18 Jahre

2) 1980, 1985 und 1990 beziehen sich die Angaben auf die Altersgruppe 18 bis unter 25 Jahre

### 5. Gemeldete Erkrankte an Geschlechtskrankheiten insgesamt 1990, 1992, 1994 und 1996 nach Verwaltungsbezirken

Verwaltungsbezirk	Neuerkrankungen an Geschlechtskrankheiten insgesamt				Neuerkrankungen an Geschlechtskrankheiten insgesamt je 100 000 der Bevölkerung			
	1990	1992	1994	1996	1990	1992	1994	1996
Brandenburg an der Havel	146	47 <sup>1)</sup>	24	8	158,0	37,9 <sup>1)</sup>	27,1	9,4
Cottbus	220 <sup>2)</sup>	74 <sup>2)</sup>	27	25	130,5 <sup>2)</sup>	44,9 <sup>2)</sup>	21,2	20,4
Frankfurt (Oder)	96	69	19	14	111,4	81,0	22,8	17,4
Potsdam	175	64	30	22	124,2	46,1	21,6	16,2
Barnim	70	64	16	5	46,8	43,4	10,7	3,3
Dahme-Spreewald	102	20	6	1	70,1	13,9	4,2	0,7
Elbe-Elster	84	22	18	7	58,7	15,7	13,0	5,1
Havelland	79	12	9	2	59,7	9,3	7,0	1,5
Märkisch-Oderland	70	37	34	3	42,8	23,0	20,0	1,7
Oberhavel	113	24	9	2	66,8	14,4	5,4	1,2
Oberspreewald-Lausitz	131	71	41	24	78,7	44,2	25,8	15,4
Oder-Spree	223	70	15	9	106,4	34,4	8,0	4,7
Ostprignitz-Ruppin	81	23	11	-	66,6	19,4	9,4	-
Potsdam-Mittelmark	88	14 <sup>3)</sup>	5	13	52,9	10,8 <sup>3)</sup>	2,9	7,1
Prignitz	73	26	14	10	71,3	25,4	13,6	9,9
Spree-Neiße	96 <sup>4)</sup>	53 <sup>4)</sup>	7	7	79,3 <sup>4)</sup>	45,8 <sup>4)</sup>	4,6	4,6
Teltow-Fläming	117	28	15	14	76,8	18,7	10,3	9,4
Uckermark	119	64	41	4	73,0	38,9	25,2	2,5
Land Brandenburg	2 108	788	341	170	81,4	31,0	13,4	6,7

1) einschließlich Brandenburg, Land  
 2) einschließlich Cottbus, Land  
 3) ohne Brandenburg, Land  
 4) ohne Cottbus, Land

6. Gemeldete Erkrankte an Geschlechtskrankheiten 1997 nach Art der Erkrankung, Geschlecht und Verwaltungsbezirken

Verwaltungsbezirk	Gemeldete Erkrankte an Geschlechtskrankheiten insgesamt			davon									Mehrfachinfektionen		
				Syphilis			Tripper			sonstige Geschlechtskrankheiten <sup>1)</sup>					
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
Brandenburg an der Havel	11	10	1	4	3	1	7	7	-	-	-	-	-	-	-
Cottbus	23	11	12	6	2	4	17	9	8	-	-	-	-	-	-
Frankfurt (Oder)	13	12	1	3	2	1	10	10	-	-	-	-	-	-	-
Potsdam	21	14	7	-	-	-	21	14	7	-	-	-	-	-	-
Barnim	8	6	2	-	-	-	8	6	2	-	-	-	-	-	-
Dahme-Spreewald	13	12	1	1	1	-	12	11	1	-	-	-	-	-	-
Elbe-Elster	11	10	1	1	1	-	10	9	1	-	-	-	-	-	-
Havelland	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Märkisch-Oderland	9	5	4	2	-	2	7	5	2	-	-	-	-	-	-
Oberhavel	4	3	1	-	-	-	4	3	1	-	-	-	-	-	-
Oberspreewald-Lausitz	20	11	9	-	-	-	20	11	9	-	-	-	-	-	-
Oder-Spree	4	3	1	2	1	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-
Ostprignitz-Ruppin	2	1	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-
Potsdam-Mittelmark	7	7	-	2	2	-	5	5	-	-	-	-	-	-	-
Prignitz	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
Spree-Neiße	10	8	2	5	4	1	5	4	1	-	-	-	-	-	-
Teltow-Fläming	11	10	1	1	1	-	10	9	1	-	-	-	-	-	-
Uckermark	8	3	5	2	1	1	6	2	4	-	-	-	-	-	-
Land insgesamt	177	126	51	30	18	12	146	108	38	1	-	1	-	-	-

1) Weicher Schanker, venerische Lymphknotenentzündung



