

**Landesamt für
Datenverarbeitung und Statistik**



Statistische Berichte

A IV 6 - j / 98

**Gemeldete
Geschlechtskrankheiten
im Land Brandenburg**

1998

Erarbeitet:

Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Brandenburg
Dezernat Gesundheit, Sozialleistungen, Rechtspflege

Herausgeber:

Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Brandenburg
Dezernat Öffentlichkeitsarbeit
Postfach 60-10 52
14410 Potsdam

Telefon: (0331) 39 403 - 405
Fax: (0331) 39 418
Internet: <http://www.brandenburg.de/lds/>
E-Mail: Info@lds.brandenburg.de

Erschienen im März 1999
Preis: 4,00 DM

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet!

Inhalt

	Seite
Erläuterungen	4
Tabellen	
1. Gemeldete Erkrankte an Syphilis 1980, 1985, 1990 und 1995 bis 1998	6
2. Gemeldete Erkrankte an Tripper 1980, 1985, 1990 und 1995 bis 1998	6
3. Gemeldete Erkrankte an Syphilis 1980, 1985, 1990 und 1995 bis 1998 nach Altersgruppen und Geschlecht	7
4. Gemeldete Erkrankte an Tripper 1980, 1985, 1990 und 1995 bis 1998 nach Altersgruppen und Geschlecht	8
5. Gemeldete Erkrankte an Geschlechtskrankheiten insgesamt 1990 und 1995 bis 1997 nach Verwaltungsbezirken	9
6. Gemeldete Erkrankte an Geschlechtskrankheiten 1998 nach Art der Erkrankung, Geschlecht und Verwaltungsbezirken	10

Erläuterungen

Ziel der Statistik

Die Statistik der Geschlechtskrankheiten beinhaltet Angaben über Erkrankte nach Alter, Geschlecht und Art der Erkrankung. Mehrfachinfektionen einer Person werden als ein Erkrankungsfall gezählt.

Aus den vorliegenden Zeitreihen sollen epidemiologische Erkenntnisse zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten gewonnen werden.

Rechtsgrundlage

Rechtsgrundlage ist der Artikel 1 des Gesetzes zur Änderung des Gesetzes zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten vom 25. August 1969 (BGBl. I S. 1351), zuletzt geändert durch Artikel 10 des 3. Statistikbereinigungsgesetzes vom 29. Dezember 1997 (BGBl. I S. 3158).

Berichtskreis

Jeder Fall einer ansteckungsfähigen Erkrankung an einer Geschlechtskrankheit ist von dem behandelnden oder sonst hinzugezogenen Arzt unverzüglich ohne Nennung des Namens und der Anschrift des Erkrankten dem Gesundheitsamt, in dessen Bezirk er seine ärztliche Tätigkeit ausübt, zu melden.

Werden Fälle einer ansteckungsfähigen Geschlechtskrankheit bei Soldaten der Bundeswehr festgestellt oder behandelt, so sind diese dem Standortarzt zu melden. Die Meldung ist an das Statistische Landesamt des zuständigen Landes weiterzuleiten.

Methodische Hinweise

Der vorliegende Statistische Bericht beinhaltet Daten der Jahre 1980, 1985 und 1990 bis 1998. Seit 1991 ist die Altersaufgliederung verändert, so dass bei Altersgruppierungen keine vollständige Übereinstimmung in den Altersgruppen 15 bis unter 25 Jahren bei zurückliegenden Zeiträumen erreicht werden kann.

Zu beachten ist, dass die kreislich aufgeführten Erkrankungsfälle nicht immer dem Wohnort des behandelten Patienten entsprechen, da der Behandlungsort nicht identisch mit dem Wohnort sein muss. Diese Kreisauflösungen geben somit nur Auskunft über die behandelten Geschlechtskrankheiten im Kreis, für die eine Meldung erfolgte.

Durch die Anonymisierung der Meldungen an die Gesundheitsämter lassen sich Doppelzählungen, die durch Konsultation eines weiteren Arztes als auch durch Mehrfachinfektionen einer Person im gleichen Berichtsjahr entstehen können, nicht vermeiden.

Systematiken

Als Systematik wird die „Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen“ (ICD) der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 9. Revision verwendet.

Allgemeiner Überblick

Die seit Jahren beobachtete Verringerung gemeldeter Geschlechtskrankheiten hat sich bis 1998 fortgesetzt. Nur im Berichtsjahr 1997 war mit 177 Erkrankten gegenüber den Vorjahren eine leichte Steigerung an gemeldeten Geschlechtskrankheiten zu verzeichnen. Dagegen wurden 1998 mit 34 an Syphilis, 67 an Tripper sowie eine an Weichem Schanker erkrankte Personen den Gesundheitsämtern weitaus weniger Erkrankungsfälle gemeldet.

Bald drei Viertel aller Erkrankten waren männlichen Geschlechts. 28 gemeldete ansteckungsfähige Geschlechtskrankheiten bezogen sich auf das weibliche Geschlecht. Die gefährdetsten Altersgruppen waren 20- bis unter 50-jährige Männer und Frauen.

Zeichenerklärung (nach DIN 55 301)

- nichts vorhanden (gleich null)
- ... Angabe fällt später an

Durch Auf- bzw. Abrunden von Einzelangaben können sich geringe Abweichungen in den Endsummen ergeben.

1. Gemeldete Erkrankte an Syphilis 1980, 1985, 1990 und 1995 bis 1998

Jahr	Syphilis			Insgesamt je 100 000 der Bevölkerung
	insgesamt	männlich	weiblich	
1980	95	65	30	3,5
1985	25	18	7	0,9
1990	33	22	11	1,3
1995	44	20	24	1,7
1996	24	17	7	0,9
1997	30	18	12	1,2
1998	34	19	15	...

2. Gemeldete Erkrankte an Tripper 1980, 1985, 1990 und 1995 bis 1998

Jahr	Tripper			Insgesamt je 100 000 der Bevölkerung
	insgesamt	männlich	weiblich	
1980	8 400	4 487	3 913	310,6
1985	7 758	4 123	3 635	286,1
1990	2 075	1 219	856	80,1
1995	203	125	78	8,0
1996	145	94	51	5,7
1997	146	108	38	5,7
1998	67	54	13	...

3. Gemeldete Erkrankte an Syphilis 1980, 1985, 1990 und 1995 bis 1998 nach Altersgruppen und Geschlecht

Jahr	Alter von ... bis unter ... Jahren								insgesamt
	unter 15	15 bis unter 20 ¹⁾	20 bis unter 25 ²⁾	25 bis unter 30	30 bis unter 40	40 bis unter 50	50 und älter	unbekannt	
insgesamt									
1980	-	5	39	21	19	6	5	-	95
1985	-	-	12	2	4	5	2	-	25
1990	-	2	13	8	6	3	1	-	33
1995	1	2	13	8	9	9	2	-	44
1996	-	-	3	6	13	1	1	-	24
1997	1	1	6	8	7	5	1	1	30
1998	-	1	5	12	8	6	1	1	34
männlich									
1980	-	1	21	17	18	5	3	-	65
1985	-	-	7	2	4	3	2	-	18
1990	-	-	8	7	3	3	1	-	22
1995	-	-	2	6	6	5	1	-	20
1996	-	-	1	4	11	1	-	-	17
1997	1	1	2	4	5	4	1	-	18
1998	-	1	1	6	4	5	1	1	19
weiblich									
1980	-	4	18	4	1	1	2	-	30
1985	-	-	5	-	-	2	-	-	7
1990	-	2	5	1	3	-	-	-	11
1995	1	2	11	2	3	4	1	-	24
1996	-	-	2	2	2	-	1	-	7
1997	-	-	4	4	2	1	-	1	12
1998	-	-	4	6	4	1	-	-	15

1) 1980, 1985 und 1990 beziehen sich die Angaben auf die Altersgruppe 15 bis unter 18 Jahre
 2) 1980, 1985 und 1990 beziehen sich die Angaben auf die Altersgruppe 18 bis unter 25 Jahre

4. Gemeldete Erkrankte an Tripper 1980, 1985, 1990 und 1995 bis 1998 nach Altersgruppen und Geschlecht

Jahr	Alter von ... bis unter ... Jahren								insgesamt
	unter 15	15 bis unter 20 ¹⁾	20 bis unter 25 ²⁾	25 bis unter 30	30 bis unter 40	40 bis unter 50	50 und älter	unbekannt	
insgesamt									
1980	20	799	5 080	1 548	737	203	13	-	8 400
1985	9	535	4 964	1 384	706	131	29	-	7 758
1990	6	167	1 262	417	186	29	8	-	2 075
1995	-	20	46	61	54	15	6	1	203
1996	-	19	37	29	40	13	5	2	145
1997	-	23	26	33	42	14	8	-	146
1998	-	5	14	17	15	12	3	1	67
männlich									
1980	1	166	2 624	1 059	482	144	11	-	4 487
1985	-	144	2 545	862	455	95	22	-	4 123
1990	2	53	730	283	126	19	6	-	1 219
1995	-	11	20	35	40	14	4	1	125
1996	-	10	19	18	32	9	4	2	94
1997	-	13	21	24	35	8	7	-	108
1998	-	3	12	10	13	12	3	1	54
weiblich									
1980	19	633	2 456	489	255	59	2	-	3 913
1985	9	391	2 419	522	251	36	7	-	3 635
1990	4	114	532	134	60	10	2	-	856
1995	-	9	26	26	14	1	2	-	78
1996	-	9	18	11	8	4	1	-	51
1997	-	10	5	9	7	6	1	-	38
1998	-	2	2	7	2	-	-	-	13

1) 1980, 1985 und 1990 beziehen sich die Angaben auf die Altersgruppe 15 bis unter 18 Jahre

2) 1980, 1985 und 1990 beziehen sich die Angaben auf die Altersgruppe 18 bis unter 25 Jahre

5. Gemeldete Erkrankte an Geschlechtskrankheiten insgesamt 1990 und 1995 bis 1997 nach Verwaltungsbezirken

Verwaltungsbezirk	Neuerkrankungen an Geschlechtskrankheiten Insgesamt				Neuerkrankungen an Geschlechtskrankheiten Insgesamt je 100 000 der Bevölkerung			
	1990	1995	1996	1997	1990	1995	1996	1997
Brandenburg an der Havel	146	23	8	11	158,0	26,5	9,4	13,2
Cottbus	220 ¹⁾	14	25	23	130,5 ¹⁾	11,2	20,7	19,2
Frankfurt (Oder)	96	20	14	13	111,4	24,5	17,4	16,5
Potsdam	175	20	22	21	124,2	14,5	16,8	15,7
Barnim	70	11	5	8	46,8	7,3	3,3	5,1
Dahme-Spreewald	102	7	1	13	70,1	4,9	0,7	8,7
Elbe-Elster	84	7	7	11	58,7	5,1	5,1	8,1
Havelland	79	4	2	1	59,7	3,1	1,5	0,7
Märkisch-Oderland	70	12	3	9	42,8	7,0	1,7	5,1
Oberhavel	113	9	2	4	66,8	5,3	1,2	2,3
Oberspreewald-Lausitz	131	31	24	20	78,7	19,6	15,4	13,0
Oder-Spree	223	19	9	4	106,4	10,0	4,7	2,1
Ostprignitz-Ruppin	81	12	-	2	66,6	10,3	-	1,7
Potsdam-Mittelmark	88	5	13	7	52,9	2,8	7,1	3,7
Prignitz	73	8	10	1	71,3	7,8	9,9	1,0
Spree-Neiße	96 ²⁾	18	7	10	79,3 ²⁾	11,8	4,6	6,5
Teltow-Fläming	117	15	14	11	76,8	10,2	9,4	7,3
Uckermark	119	13	4	8	73,0	8,1	2,5	5,0
Land Brandenburg	2 108	248	170	177	81,4	9,8	6,7	6,9

1) einschließlich Cottbus, Land
2) ohne Cottbus, Land

6. Gemeldete Erkrankte an Geschlechtskrankheiten 1998 nach Art der Erkrankung, Geschlecht und Verwaltungsbezirken

Verwaltungsbezirk	Gemeldete Erkrankte an Geschlechtskrankheiten insgesamt			davon									Mehrfachinfektionen		
				Syphilis			Tripper			sonstige Geschlechtskrankheiten ¹⁾					
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
Brandenburg an der Havel	8	6	2	2	1	1	5	4	1	1	1	-	-	-	-
Cottbus	8	6	2	2	1	1	6	5	1	-	-	-	-	-	-
Frankfurt (Oder)	17	14	3	7	4	3	10	10	-	-	-	-	-	-	-
Potsdam	6	4	2	1	-	1	5	4	1	-	-	-	-	-	-
Barnim	3	2	1	-	-	-	3	2	1	-	-	-	-	-	-
Dahme-Spreewald	3	2	1	1	-	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-
Elbe-Elster	4	3	1	-	-	-	4	3	1	-	-	-	-	-	-
Havelland	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Märkisch-Oderland	3	1	2	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oberhavel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oberspreewald-Lausitz	15	11	4	3	3	-	12	8	4	-	-	-	-	-	-
Oder-Spree	4	4	-	1	1	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-
Ostprignitz-Ruppin	5	3	2	4	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Potsdam-Mittelmark	3	1	2	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prignitz	2	1	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-
Spree-Neiße	8	5	3	4	3	1	4	2	2	-	-	-	-	-	-
Teltow-Fläming	4	4	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-
Uckermark	8	7	1	2	2	-	6	5	1	-	-	-	-	-	-
Land insgesamt	102	74	28	34	19	15	67	54	13	1	1	-	-	-	-

1) Weicher Schanker, venerische Lymphknotenentzündung



