

**Landesamt für
Datenverarbeitung und Statistik**



**LAND
BRANDENBURG**



Statistische Berichte

A IV 5-j/93

**Tuberkulose
im Land Brandenburg**

1993

Erarbeitet:

Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Brandenburg
Dezernat Gesundheit, Sozialleistungen, Rechtspflege

Herausgeber:

Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Brandenburg
Dezernat Öffentlichkeitsarbeit
Postfach 60 10 52
14410 Potsdam

Telefon: (0331) 39 403 - 405
Fax: (0331) 39 418
BTX: *47474#

Erschienen im Juni 1994
Preis: 4,50 DM

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet !

Inhalt

| | Seite |
|---|-------|
| Erläuterungen | 3 |
| Tabellen | |
| 1. Zugänge an Tuberkulose nach Diagnosegruppen und Geschlecht 1981, 1985 und 1989 bis 1993 | 7 |
| 2. Zugänge an Tuberkulose je 100 000 der Bevölkerung nach Diagnosegruppen und Geschlecht 1981, 1985 und 1989 bis 1993 | 8 |
| 3. Zugänge an Tuberkulose der Atmungsorgane nach Altersgruppen und Geschlecht 1993 | 9 |
| 4. Zugänge an Tuberkulose anderer Organe nach Altersgruppen und Geschlecht 1993 | 10 |
| 5. Zugänge an Tuberkulose nach Diagnosegruppen und Verwaltungsbezirken 1993 | 11 |
| 6. Zugänge an Tuberkulose insgesamt nach Risikofaktoren, Altersgruppen und Geschlecht 1993 | 12 |
| 7. Zugänge an Tuberkulose nach Risikofaktoren, Diagnosegruppen und Geschlecht 1993 | 13 |
| 8. Zugänge an Tuberkulose nach Risikofaktoren und Verwaltungsbezirken 1993 | 14 |
| 9. Zugänge an Tuberkulose nach dem Grund der Meldung, Altersgruppen und Geschlecht 1993 | 15 |
| 10. Zugänge an Tuberkulose nach dem Grund der Meldung, Diagnosegruppen und Geschlecht 1993 | 16 |
| 11. Zugänge an Tuberkulose nach dem Grund der Meldung und Verwaltungsbezirken 1993 | 17 |
| 12. Veränderungen/Ausscheiden von aktiv Tuberkulosekranken nach Gründen und Geschlecht 1993 | 18 |
| 13. Gestorbene an Tuberkulose nach Altersgruppen und Geschlecht 1993 | 19 |

Erläuterungen

Ziel der Statistik

Erhebungsbestände der Tuberkulosestatistik sind die Zugänge der an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane und anderer Organe erkrankten Personen nach Alter und Geschlecht.

Auf der Grundlage des statistischen Datenmaterials können das Tuberkulosegeschehen verfolgt, beurteilt und der Situation angepaßte Bekämpfungsmaßnahmen eingeleitet werden.

Rechtsgrundlage

Rechtsgrundlage ist der § 5a des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten beim Menschen (Bundes-Seuchengesetz) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Dezember 1979 (BGBl. I S. 2262), zuletzt geändert durch Artikel 25 § 79 der Verordnung vom 26. Februar 1993 (BGBl. I S. 278)

Berichtskreis

Laufende Erfassung der Zugänge (Inzidenz) an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane und anderer Organe durch den behandelnden oder sonst hinzugezogenen Arzt. Die Meldung erfolgt an das für den Aufenthalt des Betroffenen zuständige Gesundheitsamt.

Methodische Hinweise

Das aufbereitete Datenmaterial beruht für Angaben von 1980 bis 1987 auf der Auswertung der drei Bezirke Cottbus, Frankfurt (Oder) und Potsdam. Hierfür war eine kreisliche Bereinigung nicht möglich. Für 1988 bis 1990 wurden die Einzelfallmeldungen an das Zentralkomitee zur Bekämpfung der Tuberkulose, Außenstelle Berlin-Buch, zugrunde gelegt. Ab 1991 sind die Meldebögen der Gesundheitsämter Grundlage der Auswertung. Bis 1990 erfolgte keine Untergliederung nach der Staatsangehörigkeit. Diese Aussage wird für Ergebnisse ab 1991 getroffen. Die Zahl der Tuberkulosen insgesamt schließt alle Zugänge, die durch Sektion bekannt wurden, ein.

Da zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Angaben zur mittleren Bevölkerung für 1993 noch nicht zur Verfügung standen, konnten Berechnungen absoluter Zahlen, bezogen auf 100 000 der Bevölkerung, für das Berichtsjahr nicht erfolgen.

Systematiken

Als Systematik wird die "Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen" (ICD) der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 9. Revision verwendet.

Allgemeiner Überblick

Als Tuberkulose im Sinne der statistischen Erfassung gelten Erkrankungen, die durch

- Mycobacterium tuberculosis,
- Mycobacterium bovis,
- Mycobacterium africanum oder
- Mycobacterium avium

verursacht werden.

Zu den aktiven Tuberkuloseerkrankungen zählen die Tuberkulosen mit Bakteriennachweis, sonst mit entsprechendem Röntgen- oder Organbefund bei in der Regel positiver Tuberkulinreaktion.

Als Zugang an Tuberkulose gelten Erst- und Wiedererkrankte. Nicht gemeldet sind Konvertoren sowie überwachungsbedürftige Tuberkulosen der Atmungsorgane, überwachungsbedürftige Tuberkulosen anderer Organe sowie Krankheits- und Ansteckungsverdächtige.

Die Zahl der für das Land Brandenburg gemeldeten Neuerkrankungen an Tuberkulose ist nach dem rückläufigen Trend der vergangenen Jahre 1993 um 72 Personen gestiegen. Von den 394 neugemeldeten Erkrankungen entfallen 90,4 Prozent auf Tuberkulose der Atmungsorgane. Bei fast 10 Prozent aller Tuberkulosen wurde Tuberkulose anderer Organe diagnostiziert. Männer erkrankten weitaus häufiger an Tuberkulose als Frauen. Dies wird besonders bei Tuberkulose der Atmungsorgane deutlich. Bei Tuberkulose anderer Organe überwogen Erkrankungen weiblicher Personen. Fast ein Fünftel aller Neuerkrankungen an Tuberkulose (73 Personen) waren Ausländer.

Die im Land Brandenburg ausgewerteten Meldebögen beinhalten bei Zugängen an Tuberkulose auch Aussagen zu festgestellten Risikofaktoren nach Diagnosegruppen, Alter und Geschlecht. Für zwei Drittel aller Zugänge sind keine Risikofaktoren aufgeführt, für reichlich 7 Prozent wurde Diabetes mellitus als Risikofaktor genannt. Jeweils 15 Prozent aller Neuzugänge an Tuberkulose sind mit Alkohol oder sonstigen Risikofaktoren erfaßt worden. Während bei sonstigen Risikofaktoren bzw. Diabetes mellitus die Anteile gegenüber 1992 leicht zurückgingen oder gleich blieben, ist für den Risikofaktor Alkohol eine Verdopplung der prozentualen Anteile festzustellen. Dies betrifft fast ausschließlich das männliche Geschlecht.

Die größte Zahl der 394 Zugänge an Tuberkulose erfolgte als Ersterkrankung (86,3 %). 10,4 Prozent der Zugänge sind durch Wiedererkrankung der Patienten begründet.

Die Aussagen zum Ausscheiden von aktiv Tuberkulosekranken aus der Betreuung durch Tod weisen mit 22 Sterbefällen eine geringe Differenz zu den vorläufigen Angaben der Todesursachenstatistik von 23 Sterbefällen aus.

Zeichenerklärung (nach DIN 55 301)

- nichts vorhanden (genau null)

... Angabe fällt später an

1. Zugänge an Tuberkulose nach Diagnosegruppen und Geschlecht 1981, 1985 und 1988 bis 1993

| Jahr | i = insgesamt m = männlich w = weiblich | Tuberkulose insgesamt | Tuberkulose nach Diagnosegruppen | | | | | Tuberkulose anderer Organe | |
|------|---|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|--|
| | | | Tuberkulose der Atmungsorgane | | | | Lungen-tuberkulose | | sonstige Tuberkulose der Atmungsorgane |
| | | | insgesamt | darunter | | Tuberkulose anderer Organe | | | |
| | | | | mit Nachweis von Tb-Bakterien | ohne Nachweis von Tb-Bakterien | | | | |
| 1981 | i | 605 | 496 | 318 | 178 | 466 | 30 | 109 | |
| | m | 324 | 289 | 187 | 102 | 269 | 20 | 35 | |
| | w | 281 | 207 | 131 | 76 | 197 | 10 | 74 | |
| 1985 | i | 484 | 374 | 239 | 135 | 352 | 22 | 110 | |
| | m | 255 | 226 | 140 | 86 | 211 | 15 | 29 | |
| | w | 229 | 148 | 99 | 49 | 141 | 7 | 81 | |
| 1988 | i | 454 | 364 | 208 | 156 | 330 | 34 | 90 | |
| | m | 271 | 237 | 134 | 103 | 215 | 22 | 34 | |
| | w | 183 | 127 | 74 | 53 | 115 | 12 | 56 | |
| 1989 | i | 439 | 362 | 223 | 139 | 322 | 40 | 77 | |
| | m | 258 | 227 | 140 | 87 | 203 | 24 | 31 | |
| | w | 181 | 135 | 83 | 52 | 119 | 16 | 46 | |
| 1990 | i | 386 | 325 | 183 | 142 | 306 | 19 | 61 | |
| | m | 229 | 206 | 114 | 92 | 193 | 13 | 23 | |
| | w | 157 | 119 | 69 | 50 | 113 | 6 | 38 | |
| 1991 | i | 327 | 291 | 195 | 96 | 282 | 9 | 36 | |
| | m | 199 | 182 | 130 | 52 | 175 | 7 | 17 | |
| | w | 128 | 109 | 65 | 44 | 107 | 2 | 19 | |
| 1992 | i | 322 | 281 | 192 | 89 | 273 | 8 | 41 | |
| | m | 196 | 181 | 123 | 58 | 178 | 3 | 15 | |
| | w | 126 | 100 | 69 | 31 | 95 | 5 | 26 | |
| 1993 | i | 394 | 356 | 233 | 123 | 345 | 11 | 38 | |
| | m | 253 | 239 | 161 | 78 | 230 | 9 | 14 | |
| | w | 141 | 117 | 72 | 45 | 115 | 2 | 24 | |

3. Zugänge an Tuberkulose der Atmungsorgane nach Altersgruppen und Geschlecht 1993

| Alter von ... bis unter ... Jahren | Tuberkulose der Atmungsorgane | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|----------|----------------------------------|----------|-----------------------------------|----------|-------------------|----------|--|----------|
| | Insgesamt | | darunter | | | | Lungentuberkulose | | sonstige Tuberkulose der Atmungsorgane | |
| | | | mit Nachweis von Tb-Bakterien | | ohne Nachweis von Tb-Bakterien | | | | | |
| | männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich |
| unter 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 5 - 10 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 10 - 15 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - |
| 15 - 20 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | - | 1 |
| 20 - 25 | 15 | 4 | 11 | 3 | 4 | 1 | 15 | 4 | - | - |
| 25 - 30 | 25 | 9 | 17 | 5 | 8 | 4 | 24 | 9 | 1 | - |
| 30 - 35 | 23 | 16 | 19 | 10 | 4 | 6 | 23 | 16 | - | - |
| 35 - 40 | 26 | 5 | 20 | 3 | 6 | 2 | 26 | 5 | - | - |
| 40 - 45 | 21 | 3 | 10 | 3 | 11 | - | 17 | 3 | 4 | - |
| 45 - 50 | 15 | 1 | 11 | 1 | 4 | - | 15 | 1 | - | - |
| 50 - 55 | 24 | 4 | 19 | 1 | 5 | 3 | 23 | 4 | 1 | - |
| 55 - 60 | 24 | 6 | 14 | 4 | 10 | 2 | 24 | 6 | - | - |
| 60 - 65 | 19 | 6 | 12 | 4 | 7 | 2 | 19 | 6 | - | - |
| 65 - 70 | 15 | 5 | 8 | 1 | 7 | 4 | 13 | 5 | 2 | - |
| 70 - 75 | 10 | 8 | 7 | 7 | 3 | 1 | 10 | 8 | - | - |
| 75 und älter | 15 | 41 | 9 | 27 | 6 | 14 | 14 | 41 | 1 | - |
| Insgesamt | 239 | 117 | 161 | 72 | 78 | 45 | 230 | 115 | 9 | 2 |

4. Zugänge an Tuberkulose anderer Organe nach Altersgruppen und Geschlecht 1993

| Alter von ... bis unter ... Jahren | Tuberkulose anderer Organe | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|----------|----------|----------|-----------------|----------|---------------------|----------|-----------------------|----------|-----------------|----------|
| | insgesamt | | davon | | | | | | | | | |
| | | | Meningen | | Urogenitaltrakt | | Knochen und Gelenke | | periphere Lymphknoten | | sonstige Organe | |
| | männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich |
| unter 5 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| 5 - 10 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 10 - 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 - 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 - 25 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 25 - 30 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 - 35 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 35 - 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 - 45 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 45 - 50 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 50 - 55 | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 55 - 60 | 6 | 3 | - | - | 1 | 2 | - | - | 4 | 1 | 1 | - |
| 60 - 65 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 65 - 70 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 70 - 75 | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - |
| 75 und älter | 1 | 6 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | 2 | - | 1 |
| Insgesamt | 14 | 24 | 3 | 1 | 4 | 12 | - | 1 | 6 | 8 | 1 | 2 |

5. Zugänge an Tuberkulose nach Diagnosegruppen und Verwaltungsbezirken 1993

| Verwaltungsbezirk | Tuberkulose insgesamt | Tuberkulose nach Diagnosegruppen | | |
|----------------------------|-----------------------|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | Lungentuberkulose | sonstige Tuberkulose der Atmungsorgane | Tuberkulose anderer Organe |
| Brandenburg an der Havel | 14 | 9 | - | 5 |
| Cottbus | 20 | 18 | - | 2 |
| Frankfurt (Oder) | 20 | 17 | 2 | 1 |
| Potsdam | 19 | 15 | - | 4 |
| Barnim | 28 | 24 | 2 | 2 |
| davon: Bernau | 14 | 12 | 1 | 1 |
| Eberswalde | 14 | 12 | 1 | 1 |
| Dahme-Spreewald | 16 | 14 | - | 2 |
| davon: Königs Wusterhausen | 8 | 7 | - | 1 |
| Lübben | 4 | 4 | - | - |
| Luckau | 4 | 3 | - | 1 |
| Elbe-Elster | 19 | 19 | - | - |
| davon: Bad Liebenwerda | 6 | 6 | - | - |
| Finsterwalde | 4 | 4 | - | - |
| Herzberg | 9 | 9 | - | - |
| Havelland | 29 | 25 | 1 | 3 |
| davon: Nauen | 16 | 15 | - | 1 |
| Rathenow | 13 | 10 | 1 | 2 |
| Märkisch-Oderland | 21 | 19 | - | 2 |
| davon: Bad Freienwalde | 7 | 6 | - | 1 |
| Seelow | 5 | 5 | - | - |
| Strausberg | 9 | 8 | - | 1 |
| Oberhavel | 24 | 22 | - | 2 |
| davon: Gransee | 9 | 9 | - | - |
| Oranienburg | 15 | 13 | - | 2 |
| Oberspreewald-Lausitz | 21 | 17 | 2 | 2 |
| davon: Calau | 7 | 4 | 2 | 1 |
| Senftenberg | 14 | 13 | - | 1 |
| Oder-Spree | 64 | 61 | 1 | 2 |
| davon: Beeskow | 9 | 9 | - | - |
| Eisenhüttenstadt, Stadt | 38 | 38 | - | - |
| Eisenhüttenstadt, Land | 4 | 2 | - | 2 |
| Fürstenwalde | 13 | 12 | 1 | - |
| Ostprignitz-Ruppin | 14 | 14 | - | - |
| davon: Kyritz | 3 | 3 | - | - |
| Neuruppin | 9 | 9 | - | - |
| Wittstock | 2 | 2 | - | - |
| Potsdam-Mittelmark | 25 | 19 | 1 | 5 |
| davon: Belzig | 5 | 3 | - | 2 |
| Brandenburg, Land | 2 | 2 | - | - |
| Potsdam, Land | 18 | 14 | 1 | 3 |
| Prignitz | 11 | 6 | 1 | 4 |
| davon: Perleberg | 4 | 3 | - | 1 |
| Pritzwalk | 7 | 3 | 1 | 3 |
| Spree-Neiße | 17 | 17 | - | - |
| davon: Cottbus, Land | 6 | 6 | - | - |
| Forst | 4 | 4 | - | - |
| Guben | 6 | 6 | - | - |
| Spremberg | 1 | 1 | - | - |
| Teltow-Fläming | 15 | 13 | 1 | 1 |
| davon: Jüterbog | 3 | 3 | - | - |
| Luckenwalde | 2 | 1 | 1 | - |
| Zossen | 10 | 9 | - | 1 |
| Uckermark | 17 | 16 | - | 1 |
| davon: Angermünde | 11 | 11 | - | - |
| Prenzlau | 4 | 3 | - | 1 |
| Schwedt/Oder | 1 | 1 | - | - |
| Templin | 1 | 1 | - | - |
| Land insgesamt | 394 | 345 | 11 | 38 |

6. Zugänge an Tuberkulose insgesamt nach Risikofaktoren, Altersgruppen und Geschlecht 1993

| Alter von ... bis unter ... Jahren | Geschlecht i = insgesamt m = männlich w = weiblich | Zugänge insgesamt | davon nach Risikofaktoren | | | | |
|--|---|----------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|---------|---------------------------------|
| | | | ohne Risiko- faktoren | Staub- lungen erkrankung | Diabetes mellitus | Alkohol | sonstige Risiko- faktoren |
| unter 5 | i | 3 | 3 | - | - | - | - |
| | m | 1 | 1 | - | - | - | - |
| | w | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 5 - 10 | i | 2 | 1 | - | - | - | 1 |
| | m | - | - | - | - | - | - |
| | w | 2 | 1 | - | - | - | 1 |
| 10 - 15 | i | 3 | 2 | - | - | - | 1 |
| | m | 1 | - | - | - | - | 1 |
| | w | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 15 - 20 | i | 11 | 9 | - | - | - | 2 |
| | m | 5 | 5 | - | - | - | - |
| | w | 6 | 4 | - | - | - | 2 |
| 20 - 25 | i | 20 | 16 | - | - | - | 4 |
| | m | 15 | 12 | - | - | - | 3 |
| | w | 5 | 4 | - | - | - | 1 |
| 25 - 30 | i | 35 | 26 | - | - | 4 | 5 |
| | m | 26 | 20 | - | - | 3 | 3 |
| | w | 9 | 6 | - | - | 1 | 2 |
| 30 - 35 | i | 41 | 27 | - | 1 | 6 | 7 |
| | m | 23 | 13 | - | 1 | 5 | 4 |
| | w | 18 | 14 | - | - | 1 | 3 |
| 35 - 40 | i | 31 | 11 | - | - | 15 | 5 |
| | m | 26 | 6 | - | - | 15 | 5 |
| | w | 5 | 5 | - | - | - | - |
| 40 - 45 | i | 25 | 13 | - | - | 6 | 6 |
| | m | 21 | 12 | - | - | 5 | 4 |
| | w | 4 | 1 | - | - | 1 | 2 |
| 45 - 50 | i | 18 | 9 | - | 1 | 7 | 1 |
| | m | 16 | 8 | - | 1 | 7 | - |
| | w | 2 | 1 | - | - | - | 1 |
| 50 - 55 | i | 32 | 16 | - | 2 | 9 | 5 |
| | m | 26 | 11 | - | 2 | 9 | 4 |
| | w | 6 | 5 | - | - | - | 1 |
| 55 - 60 | i | 39 | 23 | - | 4 | 7 | 5 |
| | m | 30 | 18 | - | 2 | 7 | 3 |
| | w | 9 | 5 | - | 2 | - | 2 |
| 60 - 65 | i | 27 | 18 | - | 2 | 3 | 4 |
| | m | 20 | 14 | - | 1 | 3 | 2 |
| | w | 7 | 4 | - | 1 | - | 2 |
| 65 - 70 | i | 23 | 18 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| | m | 17 | 13 | - | 2 | 1 | 1 |
| | w | 6 | 5 | 1 | - | - | - |
| 70 - 75 | i | 21 | 15 | - | 2 | 1 | 3 |
| | m | 10 | 8 | - | - | - | 2 |
| | w | 11 | 7 | - | 2 | 1 | 1 |
| 75 und älter | i | 63 | 39 | - | 15 | - | 9 |
| | m | 16 | 13 | - | 1 | - | 2 |
| | w | 47 | 26 | - | 14 | - | 7 |
| Insgesamt | i | 394 | 246 | 1 | 29 | 59 | 59 |
| | m | 253 | 154 | - | 10 | 55 | 34 |
| | w | 141 | 92 | 1 | 19 | 4 | 25 |

7. Zugänge an Tuberkulose nach Risikofaktoren, Diagnosegruppen und Geschlecht 1993

| Diagnosegruppe | Geschlecht i = insgesamt m = männlich w = weiblich | Zugänge insgesamt | davon nach Risikofaktoren | | | | |
|---|---|----------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------|---------|---------------------------------|
| | | | ohne Risiko- faktoren | Staub- lungen- erkrankung | Diabetes mellitus | Alkohol | sonstige Risiko- faktoren |
| Tuberkulose der Atmungsorgane mit Nachweis von Tb-Bakterien | | | | | | | |
| direkt im Sputumausstrich | i | 182 | 110 | - | 15 | 31 | 26 |
| | m | 126 | 76 | - | 6 | 29 | 15 |
| | w | 56 | 34 | - | 9 | 2 | 11 |
| in sonstigem Material oder mit anderen Methoden | i | 51 | 28 | - | 6 | 11 | 6 |
| | m | 35 | 20 | - | 1 | 10 | 4 |
| | w | 16 | 8 | - | 5 | 1 | 2 |
| Tuberkulose der Atmungsorgane ohne Nachweis von Tb-Bakterien | | | | | | | |
| Primärtuberkulose (ausgenommen Pleuritis tuberculosa) | i | 77 | 51 | 1 | 3 | 6 | 16 |
| | m | 47 | 31 | - | 1 | 5 | 10 |
| | w | 30 | 20 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| Pleuritis tuberculosa | i | 11 | 4 | - | - | 4 | 3 |
| | m | 9 | 4 | - | - | 4 | 1 |
| | w | 2 | - | - | - | - | 2 |
| postprimäre Tuberkulose (ausgenommen Pleuritis tuberculosa) | i | 35 | 27 | - | - | 5 | 3 |
| | m | 22 | 15 | - | - | 5 | 2 |
| | w | 13 | 12 | - | - | - | 1 |
| Tuberkulose anderer Organe | | | | | | | |
| Tuberkulose der Meningen | i | 4 | 3 | - | 1 | - | - |
| | m | 3 | 2 | - | 1 | - | - |
| | w | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Tuberkulose des Urogenitaltraktes | i | 16 | 14 | - | 1 | - | 1 |
| | m | 4 | 4 | - | - | - | - |
| | w | 12 | 10 | - | 1 | - | 1 |
| Tuberkulose der Knochen und Gelenke | i | 1 | 1 | - | - | - | - |
| | m | - | - | - | - | - | - |
| | w | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Tuberkulose der peripheren Lymphknoten | i | 14 | 6 | - | 3 | 2 | 3 |
| | m | 6 | 1 | - | 1 | 2 | 2 |
| | w | 8 | 5 | - | 2 | - | 1 |
| Tuberkulose sonstiger Organe | i | 3 | 2 | - | - | - | 1 |
| | m | 1 | 1 | - | - | - | - |
| | w | 2 | 1 | - | - | - | 1 |
| Tuberkulose insgesamt | | | | | | | |
| | i | 394 | 246 | 1 | 29 | 59 | 59 |
| | m | 253 | 154 | - | 10 | 55 | 34 |
| | w | 141 | 92 | 1 | 19 | 4 | 25 |

8. Zugänge an Tuberkulose nach Risikofaktoren Verwaltungsbezirken 1993

| Verwaltungsbezirk | Zugänge insgesamt | davon nach Risikofaktoren | | | | |
|----------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|---------|-------------------------|
| | | ohne Risikofaktoren | Staublungen-erkrankungen | Diabetes mellitus | Alkohol | sonstige Risikofaktoren |
| Brandenburg an der Havel | 14 | 10 | - | 1 | 3 | - |
| Cottbus | 20 | 18 | - | 1 | 1 | - |
| Frankfurt (Oder) | 20 | 10 | - | 2 | 7 | 1 |
| Potsdam | 19 | 12 | - | 2 | 1 | 4 |
| Barnim | 28 | 19 | - | 2 | 4 | 3 |
| davon: Bernau | 14 | 11 | - | - | 1 | 2 |
| Eberswalde | 14 | 8 | - | 2 | 3 | 1 |
| Dahme-Spreewald | 16 | 9 | - | 1 | 6 | - |
| davon: Königs Wusterhausen | 8 | 4 | - | - | 4 | - |
| Lübben | 4 | 3 | - | 1 | - | - |
| Luckau | 4 | 2 | - | - | 2 | - |
| Elbe-Elster | 19 | 10 | - | 1 | 4 | 4 |
| davon: Bad Liebenwerda | 6 | 6 | - | - | - | - |
| Finsterwalde | 4 | 3 | - | 1 | - | - |
| Herzberg | 9 | 1 | - | - | 4 | 4 |
| Havelland | 29 | 17 | - | 3 | 8 | 1 |
| davon: Nauen | 16 | 10 | - | 1 | 4 | 1 |
| Rathenow | 13 | 7 | - | 2 | 4 | - |
| Märkisch-Oderland | 21 | 9 | - | 4 | 7 | 1 |
| davon: Bad Freienwalde | 7 | 1 | - | 3 | 2 | 1 |
| Seelow | 5 | 5 | - | - | - | - |
| Strausberg | 9 | 3 | - | 1 | 5 | - |
| Oberhavel | 24 | 14 | - | 1 | - | 9 |
| davon: Gransee | 9 | 8 | - | - | - | 1 |
| Oranienburg | 15 | 6 | - | 1 | - | 8 |
| Oberspreewald-Lausitz | 21 | 11 | - | 3 | - | 7 |
| davon: Calau | 7 | 4 | - | 1 | - | 2 |
| Senftenberg | 14 | 7 | - | 2 | - | 5 |
| Oder-Spree | 64 | 48 | - | - | 2 | 14 |
| davon: Beeskow | 9 | 3 | - | - | - | 6 |
| Eisenhüttenstadt, Stadt | 38 | 30 | - | - | 2 | 6 |
| Eisenhüttenstadt, Land | 4 | 4 | - | - | - | - |
| Fürstenwalde | 13 | 11 | - | - | - | 2 |
| Ostprignitz-Ruppin | 14 | 7 | - | 2 | 4 | 1 |
| davon: Kyritz | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Neuruppin | 9 | 6 | - | 1 | 1 | 1 |
| Wittstock | 2 | - | - | - | 2 | - |
| Potsdam-Mittelmark | 25 | 12 | - | 3 | 2 | 8 |
| davon: Belzig | 5 | 4 | - | 1 | - | - |
| Brandenburg, Land | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Potsdam, Land | 18 | 6 | - | 2 | 2 | 8 |
| Prignitz | 11 | 6 | - | 2 | 1 | 2 |
| davon: Perleberg | 4 | 3 | - | - | 1 | - |
| Pritzwalk | 7 | 3 | - | 2 | - | 2 |
| Spree-Neiße | 17 | 14 | 1 | - | 1 | 1 |
| davon: Cottbus, Land | 6 | 5 | 1 | - | - | - |
| Forst | 4 | 3 | - | - | - | 1 |
| Guben | 6 | 5 | - | - | 1 | - |
| Spremberg | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Teltow-Fläming | 15 | 6 | - | 1 | 8 | - |
| davon: Jüterbog | 3 | 1 | - | - | 2 | - |
| Luckenwalde | 2 | 1 | - | - | 1 | - |
| Zossen | 10 | 4 | - | 1 | 5 | - |
| Uckermark | 17 | 14 | - | - | - | 3 |
| davon: Angermünde | 11 | 9 | - | - | - | 2 |
| Prenzlau | 4 | 4 | - | - | - | - |
| Schwedt/Oder | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Templin | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Land insgesamt | 394 | 246 | 1 | 29 | 59 | 59 |

9. Zugänge an Tuberkulose nach dem Grund der Meldung, Altersgruppen und Geschlecht 1993

| Alter von ... bis unter ... Jahren | Geschlecht i = insgesamt m = männlich w = weiblich | Zugänge insgesamt | Grund der Meldung | | | | |
|--|---|----------------------|---------------------|--------------------------------|------------------|---|---|
| | | | Erst- erkrankung | Erfassung durch Autopsie | Wiedererkrankung | | |
| | | | | | insgesamt | darunter in laufender Überwachung | darunter mit chemothera- peutischer Behandlung |
| unter 5 | i | 3 | 3 | - | - | - | - |
| | m | 1 | 1 | - | - | - | - |
| | w | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 5 - 10 | i | 2 | 2 | - | - | - | - |
| | m | - | - | - | - | - | - |
| | w | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 10 - 15 | i | 3 | 3 | - | - | - | - |
| | m | 1 | 1 | - | - | - | - |
| | w | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 15 - 20 | i | 11 | 11 | - | - | - | - |
| | m | 5 | 5 | - | - | - | - |
| | w | 6 | 6 | - | - | - | - |
| 20 - 25 | i | 20 | 20 | - | - | - | - |
| | m | 15 | 15 | - | - | - | - |
| | w | 5 | 5 | - | - | - | - |
| 25 - 30 | i | 35 | 34 | 1 | - | - | - |
| | m | 26 | 25 | 1 | - | - | - |
| | w | 9 | 9 | - | - | - | - |
| 30 - 35 | i | 41 | 39 | - | 2 | 2 | 2 |
| | m | 23 | 21 | - | 2 | 2 | 2 |
| | w | 18 | 18 | - | - | - | - |
| 35 - 40 | i | 31 | 28 | - | 3 | 2 | 2 |
| | m | 26 | 23 | - | 3 | 2 | 2 |
| | w | 5 | 5 | - | - | - | - |
| 40 - 45 | i | 25 | 23 | - | 2 | 2 | 2 |
| | m | 21 | 19 | - | 2 | 2 | 2 |
| | w | 4 | 4 | - | - | - | - |
| 45 - 50 | i | 18 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| | m | 16 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| | w | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 50 - 55 | i | 32 | 26 | - | 6 | 2 | 6 |
| | m | 26 | 22 | - | 4 | 1 | 4 |
| | w | 6 | 4 | - | 2 | 1 | 2 |
| 55 - 60 | i | 39 | 34 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| | m | 30 | 26 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| | w | 9 | 8 | - | 1 | 1 | 1 |
| 60 - 65 | i | 27 | 17 | - | 10 | 6 | 5 |
| | m | 20 | 12 | - | 8 | 5 | 4 |
| | w | 7 | 5 | - | 2 | 1 | 1 |
| 65 - 70 | i | 23 | 20 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| | m | 17 | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| | w | 6 | 6 | - | - | - | - |
| 70 - 75 | i | 21 | 17 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| | m | 10 | 8 | - | 2 | 2 | 1 |
| | w | 11 | 9 | 1 | 1 | - | 1 |
| 75 und älter | i | 63 | 48 | 8 | 7 | 3 | 5 |
| | m | 16 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | w | 47 | 34 | 7 | 6 | 2 | 4 |
| Insgesamt | i | 394 | 340 | 13 | 41 | 25 | 31 |
| | m | 253 | 219 | 5 | 29 | 20 | 22 |
| | w | 141 | 121 | 8 | 12 | 5 | 9 |

10. Zugänge an Tuberkulose nach dem Grund der Meldung, Diagnosegruppen und Geschlecht 1993

| Diagnosegruppe | Geschlecht i = insgesamt m = männlich w = weiblich | Zugänge insgesamt | Grund der Meldung | | | | |
|---|---|----------------------|---------------------|--------------------------------|------------------|--|---|
| | | | Erst- erkrankung | Erfassung durch Autopsie | Wiedererkrankung | | |
| | | | | | insgesamt | darunter in laufender Über- wachung | darunter mit chemothera- peutischer Behandlung |
| Tuberkulose der Atmungs- organe mit Nachweis von Tb-Bakterien | | | | | | | |
| direkt im Sputum- ausstrich | i | 182 | 160 | 1 | 21 | 11 | 16 |
| | m | 126 | 109 | 1 | 16 | 10 | 13 |
| | w | 56 | 51 | - | 5 | 1 | 3 |
| in sonstigem Material oder mit anderen Methoden | i | 51 | 42 | 4 | 5 | 4 | 3 |
| | m | 35 | 30 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| | w | 16 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Tuberkulose der Atmungs- organe ohne Nachweis von Tb-Bakterien | | | | | | | |
| Primärtuberkulose (ausgenommen Pleuritis tuberculosa) | i | 77 | 70 | 1 | 6 | 5 | 5 |
| | m | 47 | 42 | - | 5 | 4 | 4 |
| | w | 30 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pleuritis tuberculosa | i | 11 | 11 | - | - | - | - |
| | m | 9 | 9 | - | - | - | - |
| | w | 2 | 2 | - | - | - | - |
| postprimäre Tuberkulose (ausgenommen Pleuritis tuberculosa) | i | 35 | 26 | 2 | 7 | 5 | 5 |
| | m | 22 | 17 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| | w | 13 | 9 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| Tuberkulose anderer Organe | | | | | | | |
| Tuberkulose der Meningen | i | 4 | 4 | - | - | - | - |
| | m | 3 | 3 | - | - | - | - |
| | w | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Tuberkulose des Urogenitaltraktes | i | 16 | 14 | 2 | - | - | - |
| | m | 4 | 4 | - | - | - | - |
| | w | 12 | 10 | 2 | - | - | - |
| Tuberkulose der Knochen und Gelenke | i | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
| | m | - | - | - | - | - | - |
| | w | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
| Tuberkulose der peripheren Lymph- knoten | i | 14 | 11 | 2 | 1 | - | 1 |
| | m | 6 | 4 | 1 | 1 | - | 1 |
| | w | 8 | 7 | 1 | - | - | - |
| Tuberkulose sonstiger Organe | i | 3 | 2 | 1 | - | - | - |
| | m | 1 | 1 | - | - | - | - |
| | w | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
| Tuberkulose insgesamt | | | | | | | |
| | i | 394 | 340 | 13 | 41 | 25 | 31 |
| | m | 253 | 219 | 5 | 29 | 20 | 22 |
| | w | 141 | 121 | 8 | 12 | 5 | 9 |

11. Zugänge an Tuberkulose nach dem Grund der Meldung und Verwaltungsbezirken 1993

| Verwaltungsbezirk | Zugänge insgesamt | Grund der Meldung | | | | |
|----------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|------------------|---|---|
| | | Erst- erkrankung | Erfassung durch Autopsie | Wiedererkrankung | | |
| | | | | insgesamt | darunter in laufender Überwachung | darunter mit chemothera- peutischer Behandlung |
| Brandenburg an der Havel | 14 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Cottbus | 20 | 16 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| Frankfurt (Oder) | 20 | 19 | - | 1 | 1 | 1 |
| Potsdam | 19 | 16 | - | 3 | 2 | 3 |
| Barnim | 28 | 20 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| davon: Bernau | 14 | 9 | - | 5 | 3 | 2 |
| Eberswalde | 14 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Dahme-Spreewald | 16 | 13 | 3 | - | - | - |
| davon: Königs Wusterhausen | 8 | 6 | 2 | - | - | - |
| Lübben | 4 | 4 | - | - | - | - |
| Luckau | 4 | 3 | 1 | - | - | - |
| Elbe-Elster | 19 | 17 | - | 2 | 1 | 2 |
| davon: Bad Liebenwerda | 6 | 5 | - | 1 | 1 | 1 |
| Finsterwalde | 4 | 4 | - | - | - | - |
| Herzberg | 9 | 8 | - | 1 | - | 1 |
| Havelland | 29 | 26 | - | 3 | 2 | 2 |
| davon: Nauen | 16 | 13 | - | 3 | 2 | 2 |
| Rathenow | 13 | 13 | - | - | - | - |
| Märkisch-Oderland | 21 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| davon: Bad Freienwalde | 7 | 6 | 1 | - | - | - |
| Seelow | 5 | 5 | - | - | - | - |
| Strausberg | 9 | 8 | - | 1 | 1 | 1 |
| Oberhavel | 24 | 19 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| davon: Gransee | 9 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Oranienburg | 15 | 14 | - | 1 | 1 | 1 |
| Oberspreewald-Lausitz | 21 | 19 | - | 2 | 1 | 1 |
| davon: Calau | 7 | 5 | - | 2 | 1 | 1 |
| Senftenberg | 14 | 14 | - | - | - | - |
| Oder-Spree | 64 | 61 | - | 3 | 1 | 2 |
| davon: Beeskow | 9 | 9 | - | - | - | - |
| Eisenhüttenstadt, Stadt | 38 | 38 | - | - | - | - |
| Eisenhüttenstadt, Land | 4 | 3 | - | 1 | 1 | 1 |
| Fürstenwalde | 13 | 11 | - | 2 | - | 1 |
| Ostprignitz-Ruppin | 14 | 13 | 1 | - | - | - |
| davon: Kyritz | 3 | 3 | - | - | - | - |
| Neuruppin | 9 | 8 | 1 | - | - | - |
| Wittstock | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Potsdam-Mittelmark | 25 | 21 | - | 4 | 1 | 3 |
| davon: Belzig | 5 | 4 | - | 1 | - | - |
| Brandenburg, Land | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Potsdam, Land | 18 | 15 | - | 3 | 1 | 3 |
| Prignitz | 11 | 10 | 1 | - | - | - |
| davon: Perleberg | 4 | 4 | - | - | - | - |
| Pritzwalk | 7 | 6 | 1 | - | - | - |
| Spree-Neiße | 17 | 16 | - | 1 | 1 | - |
| davon: Cottbus, Land | 6 | 5 | - | 1 | 1 | - |
| Forst | 4 | 4 | - | - | - | - |
| Guben | 6 | 6 | - | - | - | - |
| Spremberg | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Teltow-Fläming | 15 | 11 | - | 4 | 3 | 4 |
| davon: Jüterbog | 3 | 1 | - | 2 | 1 | 2 |
| Luckenwalde | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| Zossen | 10 | 9 | - | 1 | 1 | 1 |
| Uckermark | 17 | 13 | 3 | 1 | - | 1 |
| davon: Angermünde | 11 | 11 | - | - | - | - |
| Prenzlau | 4 | 1 | 3 | - | - | - |
| Schwedt/Oder | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
| Templin | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Land insgesamt | 394 | 340 | 13 | 41 | 25 | 31 |

12. Veränderungen/Ausscheiden von aktiv Tuberkulosekranken nach Gründen und Geschlecht 1993

| Veränderungen/ Ausscheiden nach Gründen | Insgesamt | Männlich | Weiblich |
|--|-----------|----------|----------|
| Übergang als überwachungsbedürftige Tuberkulose der Atmungsorgane | 197 | 116 | 81 |
| Übergang als überwachungsbedürftige Tuberkulose der anderer Organe | 23 | 8 | 15 |
| Tod an Tuberkulose | 16 | 9 | 7 |
| Tod an Tuberkulose, erst durch Autopsie erfaßt | 6 | 2 | 4 |
| Tod an Spätfolgen der Tuberkulose | - | - | - |
| Tod aus anderer Ursache | 29 | 18 | 11 |
| Fortzug | 50 | 41 | 9 |
| Diagnoseberichtigung | 15 | 11 | 4 |
| Abgang aus sonstigen Gründen | 4 | 4 | - |

13. Gestorbene an Tuberkulose nach Altersgruppen und Geschlecht 1993

| Alter von ... bis unter ... Jahren | Tuberkulose insgesamt | | Tuberkulose nach Diagnosegruppen | | | | | | | |
|--|--------------------------|-----------|----------------------------------|-----------|--|----------|----------|----------|----------------------------------|----------|
| | | | Tuberkulose der Atmungsorgane | | | | | | Tuberkulose anderer Organe | |
| | insgesamt | | davon | | | | | | | |
| | | | Lungen- tuberkulose | | sonstige Tuberkulose der Atmungsorgane | | | | | |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich | |
| unter 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 - 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 - 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 - 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 - 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 - 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 - 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 - 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 - 45 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 45 - 50 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 50 - 55 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 55 - 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 - 65 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 1 |
| 65 - 70 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | 1 | - | - |
| 70 - 75 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 75 und älter | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 | - | - | - | - |
| Insgesamt | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 9 | - | 1 | - | 1 |

