

**Landesamt für
Datenverarbeitung und Statistik**



Statistische Berichte

A IV 5 - j / 97

**Tuberkulose
im Land Brandenburg**

1997

Erarbeitet:

Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Brandenburg
Dezernat Gesundheit, Sozialleistungen, Rechtspflege

Herausgeber:

Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Brandenburg
Dezernat Öffentlichkeitsarbeit
Postfach 60 10 52
14410 Potsdam

Telefon: (0331) 39 403 - 405
Fax: (0331) 39 418
Internet: <http://www.brandenburg.de/lds/>
E-Mail: Info@lds.brandenburg.de

Erschienen im November 1998
Preis: 4,50 DM

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet!

Inhalt

	Seite
Erläuterungen	4
1. Zugänge an Tuberkulose 1991 bis 1997 nach Diagnosegruppen und Geschlecht	6
2. Zugänge an Tuberkulose je 100 000 der Bevölkerung 1991 bis 1997 nach Diagnosegruppen und Geschlecht	7
3. Zugänge an Tuberkulose der Atmungsorgane 1997 nach Altersgruppen und Geschlecht	8
4. Zugänge an Tuberkulose anderer Organe 1997 nach Altersgruppen und Geschlecht	9
5. Zugänge an Tuberkulose 1997 nach Diagnosegruppen und Verwaltungsbezirken	10
6. Zugänge an Tuberkulose insgesamt 1997 nach Risikofaktoren, Altersgruppen und Geschlecht	11
7. Zugänge an Tuberkulose 1997 nach Risikofaktoren, Diagnosegruppen und Geschlecht	12
8. Zugänge an Tuberkulose 1997 nach Risikofaktoren und Verwaltungsbezirken	13
9. Zugänge an Tuberkulose 1997 nach dem Grund der Meldung, Altersgruppen und Geschlecht	14
10. Zugänge an Tuberkulose 1997 nach dem Grund der Meldung, Diagnosegruppen und Geschlecht	15
11. Zugänge an Tuberkulose 1997 nach dem Grund der Meldung und Verwaltungsbezirken	16
12. Veränderungen/Ausscheiden von aktiv Tuberkulosekranken 1997 nach Gründen und Geschlecht	17
13. Gestorbene an Tuberkulose 1997 nach Altersgruppen und Geschlecht	18

Erläuterungen

Ziel der Statistik

Erhebungsbestände der Tuberkulosestatistik sind die Zugänge der an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane und anderer Organe erkrankten Personen nach Alter und Geschlecht. Auf der Grundlage des statistischen Datenmaterials können das Tuberkulosegeschehen verfolgt, beurteilt und der Situation angepaßte Bekämpfungsmaßnahmen eingeleitet werden.

Rechtsgrundlage

Rechtsgrundlage ist der § 5a des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten beim Menschen (Bundesseuchengesetz) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Dezember 1979 (BGBl. I S. 2262, 1980 BGBl. I S. 151), geändert durch das Gesetz zur Änderung des Bundesseuchengesetzes (BSeuchÄndG) vom 25.05.1995 (BGBl. I S. 746) und durch Art. 10 des Gesetzes vom 07.08.1996 (BGBl. I S. 1254), zuletzt geändert durch Art. 7 der Statistikänderungsverordnung (StatÄndV) vom 20.11.1996 (BGBl. I S. 1804).

Berichtskreis

Laufende Erfassung der Zugänge (Inzidenz) an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane und anderer Organe durch den behandelnden oder sonst hinzugezogenen Arzt. Die Meldung erfolgt an das für den Aufenthalt des Betroffenen zuständige Gesundheitsamt.

Methodische Hinweise

Grundlage der Auswertung sind die Meldebögen der Gesundheitsämter. Die Zahl der Tuberkulosen insgesamt schließt alle Zugänge, die durch Sektion bekannt wurden, ein.

Systematiken

Als Systematik wird die "Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen" (ICD) der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 9. Revision verwendet.

Allgemeiner Überblick

Als Tuberkulose im Sinne der statistischen Erfassung gelten Erkrankungen, die durch

- Mycobacterium tuberculosis,
- Mycobacterium bovis,
- Mycobacterium africanum

verursacht werden.

Zu den aktiven Tuberkuloseerkrankungen zählen die Tuberkulosen mit Bakteriennachweis, sonst mit entsprechendem Röntgen- oder Organbefund bei in der Regel positiver Tuberkulinreaktion.

Als Zugang an Tuberkulose gelten Erst- und Wiedererkrankte. Nicht gemeldet sind Konvertoren sowie überwachungsbedürftige Tuberkulosen der Atmungsorgane, überwachungsbedürftige Tuberkulosen anderer Organe sowie Krankheits- und Ansteckungsverdächtige.

Die Zahl der für das Land Brandenburg gemeldeten Zugänge an Tuberkulose betrug 1997 263. Dies entspricht 10,3 je 100 000 der Bevölkerung.

Von den neu gemeldeten Erkrankungen entfallen 87,1 Prozent auf Tuberkulose der Atmungsorgane. Bei 12,9 Prozent aller Tuberkulosen wurde Tuberkulose anderer Organe diagnostiziert. Männer erkrankten weitaus häufiger an Tuberkulose als Frauen (13,2 je 100 000 der männlichen und 7,4 je 100 000 der weiblichen Bevölkerung). 19,0 Prozent aller Zugänge an Tuberkulose (50 Personen) waren Ausländer.

Die im Land Brandenburg ausgewerteten Meldebogen beinhalten bei Zugängen an Tuberkulose auch Aussagen zu festgestellten Risikofaktoren nach Diagnosegruppen, Alter und Geschlecht. Für 65,0 Prozent aller Zugänge sind keine Risikofaktoren aufgeführt, für 5,7 Prozent wurde Diabetes mellitus als Risikofaktor genannt. 0,8 Prozent der Tuberkulosekranken wiesen den Risikofaktor Staublungenerkrankung aus. 10,3 Prozent bzw. 18,3 Prozent aller Neuzugänge an Tuberkulose sind mit dem Risikofaktor Alkohol oder sonstigen Risikofaktoren erfaßt worden.

Die größte Zahl der 263 Zugänge an Tuberkulose erfolgte als Ersterkrankung (85,7 %). 14,1 Prozent der Zugänge sind durch Wiedererkrankung der Patienten begründet. 2,3 Prozent aller Zugänge an Tuberkulose wurden durch Autopsie erfaßt.

Die Aussagen zum Ausscheiden von aktiv Tuberkulosekranken aus der Betreuung durch Tod weisen mit 10 Sterbefällen eine Differenz von 2 Sterbefällen zu den Angaben der Todesursachenstatistik der Diagnose-Nr. 011 - 018 und 137 ICD/9. aus.

Zeichenerklärung (nach DIN 55 301)

- = nichts vorhanden (genau null)
- 0 = weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts

- i = insgesamt
- m = männlich
- w = weiblich

1. Zugänge an Tuberkulose 1991 bis 1997 nach Diagnosegruppen und Geschlecht

Jahr	Tuberkulose insgesamt	Tuberkulose nach Diagnosegruppen						Tuberkulose anderer Organe
		Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	
		insgesamt	darunter		Lungen-tuberkulose	sonstige Tuberkulose der Atmungsorgane		
			mit Nachweis von Tb-Bakterien	ohne Nachweis von Tb-Bakterien				
1991	i	327	291	195	96	282	9	36
	m	199	182	130	52	175	7	17
	w	128	109	65	44	107	2	19
1992	i	322	281	192	89	273	8	41
	m	196	181	123	58	178	3	15
	w	126	100	69	31	95	5	26
1993	i	394	356	233	123	345	11	38
	m	253	239	161	78	230	9	14
	w	141	117	72	45	115	2	24
1994	i	348	307	216	91	294	13	41
	m	238	220	157	63	210	10	18
	w	110	87	59	28	84	3	23
1995	i	323	282	213	69	268	14	41
	m	204	185	142	43	176	9	19
	w	119	97	71	26	92	5	22
1996	i	314	274	206	68	265	9	40
	m	209	187	144	43	182	5	22
	w	105	87	62	25	83	4	18
1997	i	263	229	168	61	218	11	34
	m	167	159	117	42	150	9	8
	w	96	70	51	19	68	2	26

2. Zugänge an Tuberkulose je 100 000 der Bevölkerung 1991 bis 1997 nach Diagnosegruppen und Geschlecht

Jahr		Tuberkulose insgesamt	Tuberkulose nach Diagnosegruppen					Tuberkulose anderer Organe	
			Tuberkulose der Atmungsorgane				Lungen-tuberkulose		sonstige Tuberkulose der Atmungsorgane
			insgesamt	darunter		Lungen-tuberkulose			
				mit Nachweis von Tb-Bakterien	ohne Nachweis von Tb-Bakterien				
1991	i	12,8	11,4	7,6	3,7	11,0	0,4	1,4	
	m	16,1	14,7	10,5	4,2	14,1	0,6	1,4	
	w	9,7	8,2	4,9	3,3	8,1	0,2	1,4	
1992	i	12,7	11,0	7,5	3,5	10,7	0,3	1,6	
	m	15,9	14,7	10,0	4,7	14,4	0,2	1,2	
	w	9,6	7,6	5,3	2,4	7,3	0,4	2,0	
1993	i	15,5	14,0	9,2	4,8	13,6	0,4	1,5	
	m	20,4	19,2	13,0	6,3	18,5	0,7	1,1	
	w	10,8	9,0	5,5	3,5	8,8	0,2	1,8	
1994	i	13,7	12,1	8,5	3,6	11,6	0,5	1,6	
	m	19,2	17,7	12,7	5,1	16,9	0,8	1,5	
	w	8,5	6,7	4,6	2,2	6,5	0,2	1,8	
1995	i	12,7	11,1	8,4	2,7	10,6	0,6	1,6	
	m	16,4	14,9	11,4	3,5	14,1	0,7	1,5	
	w	9,2	7,5	5,5	2,0	7,1	0,4	1,7	
1996	i	12,3	10,8	8,1	2,7	10,4	0,4	1,6	
	m	16,7	14,9	11,5	3,4	14,5	0,4	1,8	
	w	8,1	6,7	4,8	1,9	6,4	0,3	1,4	
1997	i	10,3	8,9	6,6	2,4	8,5	0,4	1,3	
	m	13,2	12,6	9,3	3,3	11,9	0,7	0,6	
	w	7,4	5,4	3,9	1,5	5,2	0,2	2,0	

3. Zugänge an Tuberkulose der Atmungsorgane 1997 nach Altersgruppen und Geschlecht

Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren	Tuberkulose der Atmungsorgane									
	insgesamt		darunter				Lungentuberkulose		sonstige Tuberkulose der Atmungsorgane	
			mit Nachweis von Tb-Bakterien		ohne Nachweis von Tb-Bakterien					
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
unter 5	1	1	-	-	1	1	1	1	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	4	4	2	4	2	-	3	4	1	-
20 - 25	10	2	6	2	4	-	8	2	2	-
25 - 30	27	3	21	1	6	2	25	2	2	1
30 - 35	16	3	14	2	2	1	15	3	1	-
35 - 40	13	4	10	3	3	1	12	3	1	1
40 - 45	15	3	14	3	1	-	15	3	-	-
45 - 50	4	2	4	2	-	-	4	2	-	-
50 - 55	6	2	3	1	3	1	6	2	-	-
55 - 60	12	3	9	3	3	-	12	3	-	-
60 - 65	10	7	6	6	4	1	10	7	-	-
65 - 70	12	5	9	4	3	1	12	5	-	-
70 - 75	12	6	9	3	3	3	11	6	1	-
75 und älter	17	25	10	17	7	8	16	25	1	-
Insgesamt	159	70	117	51	42	19	150	68	9	2

4. Zugänge an Tuberkulose anderer Organe 1997 nach Altersgruppen und Geschlecht

Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren	Tuberkulose anderer Organe											
	insgesamt		davon									
			Meningen		Urogenitaltrakt		Knochen und Gelenke		periphere Lymphknoten		sonstige Organe	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
unter 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 - 35	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
35 - 40	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
40 - 45	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
45 - 50	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
50 - 55	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
55 - 60	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1
60 - 65	1	2	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
65 - 70	1	5	-	-	-	1	1	1	-	3	-	-
70 - 75	-	10	-	1	-	7	-	-	-	2	-	-
75 und älter	2	3	-	-	-	2	-	-	1	1	1	-
insgesamt	8	26	-	1	2	12	1	1	3	9	2	3

5. Zugänge an Tuberkulose 1997 nach Diagnosegruppen und Verwaltungsbezirken

Verwaltungsbezirk	Zugänge		Tuberkulose nach Diagnosegruppen			Neuerkrankungen insgesamt je 100 000 der Bevölkerung
	insgesamt	darunter Ausländer	Lungen-tuberkulose	sonstige Tuberkulose der Atmungsorgane	Tuberkulose anderer Organe	
Kreisfreie Städte						
Brandenburg an der Havel	7	3	7	-	-	8,4
Cottbus	11	-	8	-	3	9,2
Frankfurt (Oder)	15	2	14	-	1	19,0
Potsdam	12	5	9	-	3	9,0
Landkreise						
Barnim	10	1	8	-	2	6,4
Dahme-Spreewald	12	-	9	1	2	8,0
Elbe-Elster	11	1	9	1	1	8,1
Havelland	7	3	6	-	1	5,2
Märkisch-Oderland	14	-	13	-	1	7,9
Oberhavel	16	-	14	-	2	9,1
Oberspreewald-Lausitz	14	-	12	2	-	9,1
Oder-Spree	42	20	34	4	4	21,7
Ostprignitz-Ruppin	13	3	10	-	3	11,2
Potsdam-Mittelmark	26	2	21	1	4	13,8
Prignitz	12	1	7	1	4	12,0
Spree-Neiße	16	3	15	1	-	10,3
Teltow-Fläming	7	-	5	-	2	4,6
Uckermark	18	6	17	-	1	11,4
Land Brandenburg	263	50	218	11	34	10,3

6. Zugänge an Tuberkulose insgesamt 1997 nach Risikofaktoren, Altersgruppen und Geschlecht

Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren		Zugänge insgesamt	davon nach Risikofaktoren				
			ohne Risiko- faktoren	Staub- lungen- erkrankung	Diabetes mellitus	Alkohol	sonstige Risiko- faktoren
unter 5	i	2	2	-	-	-	-
	m	1	1	-	-	-	-
	w	1	1	-	-	-	-
5 - 10	i	-	-	-	-	-	-
	m	-	-	-	-	-	-
	w	-	-	-	-	-	-
10 - 15	i	-	-	-	-	-	-
	m	-	-	-	-	-	-
	w	-	-	-	-	-	-
15 - 20	i	8	4	-	-	-	4
	m	4	3	-	-	-	1
	w	4	1	-	-	-	3
20 - 25	i	12	11	-	-	-	1
	m	10	9	-	-	-	1
	w	2	2	-	-	-	-
25 - 30	i	30	26	-	-	2	2
	m	27	23	-	-	2	2
	w	3	3	-	-	-	-
30 - 35	i	20	15	-	-	3	2
	m	17	13	-	-	3	1
	w	3	2	-	-	-	1
35 - 40	i	18	11	-	1	3	3
	m	13	7	-	1	3	2
	w	5	4	-	-	-	1
40 - 45	i	20	8	-	-	7	5
	m	16	6	-	-	7	3
	w	4	2	-	-	-	2
45 - 50	i	7	2	-	-	3	2
	m	4	-	-	-	2	2
	w	3	2	-	-	1	-
50 - 55	i	10	5	-	2	1	2
	m	6	2	-	2	1	1
	w	4	3	-	-	-	1
55 - 60	i	18	9	-	1	4	4
	m	14	7	-	1	3	3
	w	4	2	-	-	1	1
60 - 65	i	20	12	-	3	2	3
	m	11	4	-	3	2	2
	w	9	8	-	-	-	1
65 - 70	i	23	17	-	2	1	3
	m	13	9	-	2	1	1
	w	10	8	-	-	-	2
70 - 75	i	28	18	-	2	1	7
	m	12	7	-	2	1	2
	w	16	11	-	-	-	5
75 und älter	i	47	31	2	4	-	10
	m	19	14	2	-	-	3
	w	28	17	-	4	-	7
Insgesamt	i	263	171	2	15	27	48
	m	167	105	2	11	25	24
	w	96	66	-	4	2	24

7. Zugänge an Tuberkulose 1997 nach Risikofaktoren, Diagnosegruppen und Geschlecht

Diagnosegruppe		Zugänge insgesamt	davon nach Risikofaktoren				
			ohne Risikofaktoren	Staublungen-erkrankung	Diabetes mellitus	Alkohol	sonstige Risikofaktoren
Tuberkulose der Atmungsorgane mit Nachweis von Tb-Bakterien							
direkt im Sputumausstrich	i	115	66	2	8	15	24
	m	84	48	2	6	15	13
	w	31	18	-	2	-	11
in sonstigem Material oder mit anderen Methoden	i	53	33	-	4	8	8
	m	33	20	-	2	6	5
	w	20	13	-	2	2	3
Tuberkulose der Atmungsorgane ohne Nachweis von Tb-Bakterien							
Primärtuberkulose (ausgenommen Pleuritis tuberculosa)	i						
	m	33	27	-	1	2	3
	w	24	20	-	1	2	1
Pleuritis tuberculosa	i	11	9	-	-	1	1
	m	9	7	-	-	1	1
	w	2	2	-	-	-	-
postprimäre Tuberkulose (ausgenommen Pleuritis tuberculosa)	i	17	11	-	2	1	3
	m	9	4	-	2	1	2
	w	8	7	-	-	-	1
Tuberkulose anderer Organe							
Tuberkulose der Meningen	i	1	1	-	-	-	-
	m	-	-	-	-	-	-
	w	1	1	-	-	-	-
Tuberkulose des Urogenitaltraktes	i	14	11	-	-	-	3
	m	2	2	-	-	-	-
	w	12	9	-	-	-	3
Tuberkulose der Knochen und Gelenke	i	2	2	-	-	-	-
	m	1	1	-	-	-	-
	w	1	1	-	-	-	-
Tuberkulose der peripheren Lymphknoten	i	12	10	-	-	-	2
	m	3	3	-	-	-	-
	w	9	7	-	-	-	2
Tuberkulose sonstiger Organe	i	5	1	-	-	-	4
	m	2	-	-	-	-	2
	w	3	1	-	-	-	2
Tuberkulose insgesamt							
	i	263	171	2	15	27	48
	m	167	105	2	11	25	24
	w	96	66	-	4	2	24

8. Zugänge an Tuberkulose 1997 nach Risikofaktoren und Verwaltungsbezirken

Verwaltungsbezirk	Zugänge insgesamt	davon nach Risikofaktoren				
		ohne Risikofaktoren	Staublungen-erkrankungen	Diabetes mellitus	Alkohol	sonstige Risikofaktoren
Kreisfreie Städte						
Brandenburg an der Havel	7	5	-	1	1	-
Cottbus	11	6	-	1	-	4
Frankfurt (Oder)	15	9	-	2	4	-
Potsdam	12	10	-	-	-	2
Landkreise						
Barnim	10	8	-	-	2	-
Dahme-Spreewald	12	9	-	2	-	1
Elbe-Elster	11	8	-	-	3	-
Havelland	7	7	-	-	-	-
Märkisch-Oderland	14	4	1	1	2	6
Oberhavel	16	2	-	-	1	13
Oberspreewald-Lausitz	14	5	1	-	4	4
Oder-Spree	42	31	-	1	2	8
Ostprignitz-Ruppin	13	12	-	-	1	-
Potsdam-Mittelmark	26	19	-	-	4	3
Prignitz	12	5	-	2	1	4
Spree-Neiße	16	9	-	3	1	3
Teltow-Fläming	7	6	-	1	-	-
Uckermark	18	16	-	1	1	-
Land Brandenburg	263	171	2	15	27	48

9. Zugänge an Tuberkulose 1997 nach dem Grund der Meldung, Altersgruppen und Geschlecht

Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren		Zugänge insgesamt	Grund der Meldung				
			Erst- erkrankung	Erfassung durch Autopsie	Wiedererkrankung		
					insgesamt	darunter in laufender Überwachung	darunter mit chemothera- peutischer Behandlung
unter 5	i	2	2	-	-	-	-
	m	1	1	-	-	-	-
	w	1	1	-	-	-	-
5 - 10	i	-	-	-	-	-	-
	m	-	-	-	-	-	-
	w	-	-	-	-	-	-
10 - 15	i	-	-	-	-	-	-
	m	-	-	-	-	-	-
	w	-	-	-	-	-	-
15 - 20	i	8	8	-	-	-	-
	m	4	4	-	-	-	-
	w	4	4	-	-	-	-
20 - 25	i	12	11	1	-	-	-
	m	10	9	1	-	-	-
	w	2	2	-	-	-	-
25 - 30	i	30	29	-	1	-	1
	m	27	26	-	1	-	1
	w	3	3	-	-	-	-
30 - 35	i	20	18	-	2	1	1
	m	17	15	-	2	1	1
	w	3	3	-	-	-	-
35 - 40	i	18	17	-	1	1	1
	m	13	12	-	1	1	1
	w	5	5	-	-	-	-
40 - 45	i	20	12	1	7	4	5
	m	16	10	-	6	4	4
	w	4	2	1	1	-	1
45 - 50	i	7	6	-	1	1	1
	m	4	3	-	1	1	1
	w	3	3	-	-	-	-
50 - 55	i	10	7	-	3	1	2
	m	6	5	-	1	1	1
	w	4	2	-	2	-	1
55 - 60	i	18	16	1	1	1	1
	m	14	12	1	1	1	1
	w	4	4	-	-	-	-
60 - 65	i	20	16	-	4	1	4
	m	11	8	-	3	-	3
	w	9	8	-	1	1	1
65 - 70	i	23	18	1	4	3	4
	m	13	9	1	3	2	3
	w	10	9	-	1	1	1
70 - 75	i	28	22	1	5	1	3
	m	12	10	1	1	-	1
	w	16	12	-	4	1	2
75 und älter	i	47	38	1	8	1	3
	m	19	15	-	4	1	3
	w	28	23	1	4	-	-
Insgesamt	i	263	220	6	37	15	26
	m	167	139	4	24	12	20
	w	96	81	2	13	3	6

10. Zugänge an Tuberkulose 1997 nach dem Grund der Meldung, Diagnosegruppen und Geschlecht

Diagnosegruppe		Zugänge insgesamt	Grund der Meldung				
			Erst- erkrankung	Erfassung durch Autopsie	Wiedererkrankung		
					insgesamt	darunter in laufender Über- wachung	darunter mit chemothera- peutischer Behandlung
Tuberkulose der Atmungsorgane mit Nachweis von Tb-Bakterien							
direkt im Sputumausstrich	i	115	100	-	15	6	11
	m	84	73	-	11	5	9
	w	31	27	-	4	1	2
in sonstigem Material oder mit anderen Methoden	i	53	42	3	8	3	5
	m	33	23	3	7	3	5
	w	20	19	-	1	-	-
Tuberkulose der Atmungsorgane ohne Nachweis von Tb-Bakterien							
Primärtuberkulose (ausgenommen Pleuritis tuberculosa)	i	33	29	-	4	3	3
	m	24	22	-	2	2	2
	w	9	7	-	2	1	1
Pleuritis tuberculosa	i	11	11	-	-	-	-
	m	9	9	-	-	-	-
	w	2	2	-	-	-	-
postprimäre Tuberkulose (ausgenommen Pleuritis tuberculosa)	i	17	9	2	6	3	6
	m	9	4	1	4	2	4
	w	8	5	1	2	1	2
Tuberkulose anderer Organe							
Tuberkulose der Meningen	i	1	1	-	-	-	-
	m	-	-	-	-	-	-
	w	1	1	-	-	-	-
Tuberkulose des Urogenitaltraktes	i	14	11	-	3	-	1
	m	2	2	-	-	-	-
	w	12	9	-	3	-	1
Tuberkulose der Knochen und Gelenke	i	2	2	-	-	-	-
	m	1	1	-	-	-	-
	w	1	1	-	-	-	-
Tuberkulose der peripheren Lymphknoten	i	12	11	-	1	-	-
	m	3	3	-	-	-	-
	w	9	8	-	1	-	-
Tuberkulose sonstiger Organe	i	5	4	1	-	-	-
	m	2	2	-	-	-	-
	w	3	2	1	-	-	-
Tuberkulose insgesamt							
	i	263	220	6	37	15	26
	m	167	139	4	24	12	20
	w	96	81	2	13	3	6

11. Zugänge an Tuberkulose 1997 nach dem Grund der Meldung und Verwaltungsbezirken

Verwaltungsbezirk	Zugänge Insgesamt	Grund der Meldung				
		Erst- erkrankung	Erfassung durch Autopsie	Wiedererkrankung		
				Insgesamt	darunter in laufender Überwachung	darunter mit chemothera- peutischer Behandlung
Kreisfreie Städte						
Brandenburg an der Havel	7	7	-	-	-	-
Cottbus	11	5	1	5	1	5
Frankfurt (Oder)	15	9	1	5	5	5
Potsdam	12	9	-	3	-	-
Landkreise						
Barnim	10	6	1	3	1	1
Dahme-Spreewald	12	10	-	2	-	2
Elbe-Elster	11	11	-	-	-	-
Havelland	7	7	-	-	-	-
Märkisch-Oderland	14	13	-	1	-	-
Oberhavel	16	14	-	2	2	2
Oberspreewald-Lausitz	14	14	-	-	-	-
Oder-Spree	42	35	2	5	2	5
Ostprignitz-Ruppin	13	13	-	-	-	-
Potsdam-Mittelmark	26	23	-	3	1	1
Prignitz	12	8	-	4	-	2
Spree-Neiße	16	12	1	3	2	2
Teltow-Fläming	7	7	-	-	-	-
Uckermark	18	17	-	1	1	1
Land Brandenburg	263	220	6	37	15	26

12. Veränderungen/Ausscheiden von aktiv Tuberkulosekranken 1997 nach Gründen und Geschlecht

Veränderungen/ Ausscheiden nach Gründen	Insgesamt	Männlich	Weiblich
Übergang als Überwachungsbedürftige Tuberkulose der Atmungsorgane	193	122	71
Übergang als Überwachungsbedürftige Tuberkulose der anderer Organe	18	9	9
Tod an Tuberkulose	12	9	3
Tuberkulose, erst durch Autopsie erfaßt	6	4	2
davon			
Todesursache Tuberkulose	1	-	1
andere Todesursachen	5	4	1
Tod an Spätfolgen der Tuberkulose	1	1	-
Tod aus anderer Ursache	18	8	10
Fortzug	30	27	3
Diagnoseberichtigung	4	4	-
Abgang aus sonstigen Gründen	1	-	1

13. Gestorbene an Tuberkulose 1997 nach Altersgruppen und Geschlecht

Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren	Tuberkulose insgesamt		Tuberkulose nach Diagnosegruppen							
			Tuberkulose der Atmungsorgane						Tuberkulose anderer Organe	
			insgesamt		davon					
					Lungen- tuberkulose		sonstige Tuberkulose der Atmungsorgane			
männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	
unter 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 - 30	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35 - 40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40 - 45	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
45 - 50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 - 55	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
55 - 60	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
60 - 65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65 - 70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70 - 75	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
75 und älter	4	4	-	-	4	4	-	-	-	-
Insgesamt	10	4	-	-	10	4	-	-	-	-