

Statistische Berichte

AUS BADEN-WÜRTTEMBERG

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, Neckarstraße 18B

xx 1570



BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Zu A IV 5 - vj

Reihe: Medizinalstatistik.
Nr. II - M/D - 1/54

26. Juni 1954

Die Tuberkuloseerkrankungen und die Maßnahmen der Tuberkulosefürsorgestellen im 1. Vierteljahr 1954.

Der Bestand der an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane erkrankten Personen belief sich am Ende des 1. Vierteljahres 1954 auf 54 522 gegen 53 821 Personen im entsprechenden Vergleichsvierteljahr des Vorjahres. Diese geringfügige absolute Zunahme stellt jedoch bezogen auf die Bevölkerung eine Abnahme von 80,3 auf 79,2 auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr dar. Der Anteil der Männer im Alter von über 15 Jahren ist mit rund 46 vH an den Gesamterkrankungsfällen verhältnismäßig hoch.

In den Regierungsbezirken fallen fast durchweg die relativ hohen Bestandsziffern im Regierungsbezirk Nordbaden auf. Auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr kommen dort 102,6 Erkrankungsfälle gegen 74,2 in Nordwürttemberg, 73,2 in Südwürttemberg-Hohenzollern und 68,7 im Regierungsbezirk Südbaden. Es läßt sich jedoch nicht nachprüfen, inwieweit diese Unterschiede erfassungsmäßig bedingt sind.

Auch bei den Zugängen an aktiver Tbc der Atmungsorgane zeigt sich eine geringfügige Abnahme. Dabei sind die Zugänge an offener Tbc von 11,3 auf 10,0 (auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr) zurückgegangen. Von den 1 695 Zugängen an offener Tbc sind 723 oder 42,7 vH Neuzugänge ohne Zugänge aus anderen Gruppen.

Im Rahmen der Wohnungsfürsorge hatten die Fürsorgerinnen im 1. Vierteljahr 1954 insgesamt 15 454 Hausbesuche bei Tuberkulosepatienten gemacht, davon 5 443 oder 32,5 vH bei an offener Tuberkulose Erkrankten. Von den Untersuchungsmethoden wurden besonders die Tuberkulinproben in erhöhtem Umfang vorgenommen.

Die Tuberkuloseerkrankungen und die Maßnahmen der Tuberkulosefürsorgestellen im 1. Vierteljahr 1954

| Gegenstand | Land Baden-Württ. | | Regierungsbezirk | | | | | | | |
|--|-------------------|------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|------------|
| | | | Nordwürttemberg | | Nordbaden | | Südbaden | | Südwestfalen-Lippe | |
| | 1.Vj. 1953 | 1.Vj. 1954 | 1.Vj. 1953 | 1.Vj. 1954 | 1.Vj. 1953 | 1.Vj. 1954 | 1.Vj. 1953 | 1.Vj. 1954 | 1.Vj. 1953 | 1.Vj. 1954 |
| Lungentuberkulose | | | | | | | | | | |
| a) Bestand (am Ende des Vj.) | | | | | | | | | | |
| Aktive Fälle | 53821 | 54522 | 19427 | 19410 | 15643 | 15727 | 9742 | 10131 | 9009 | 9254 |
| auf 10 000 der Bevölkerung | 80,3 | 79,2 | 76,6 | 74,2 | 103,9 | 102,6 | 68,3 | 68,8 | 73,0 | 73,2 |
| darunter Kinder 0 - 15 Jahre | 11472 | 11051 | 3165 | 2903 | 3957 | 3891 | 1752 | 1800 | 2598 | 2457 |
| Männer 15 Jahre und älter | 24298 | 25021 | 9294 | 9416 | 6878 | 7057 | 4489 | 4665 | 3637 | 3883 |
| Frauen 15 Jahre und älter | 18051 | 18450 | 6968 | 7091 | 4808 | 4779 | 3501 | 3666 | 2774 | 2914 |
| Von den aktiven Fällen waren offene Fälle | 17038 | 16737 | 6365 | 6116 | 4771 | 4724 | 3270 | 3286 | 2632 | 2611 |
| auf 10 000 der Bevölkerung | 25,4 | 24,3 | 25,1 | 23,4 | 31,7 | 30,8 | 22,9 | 22,3 | 21,3 | 20,6 |
| darunter Kinder 0 - 15 Jahre | 263 | 271 | 95 | 94 | 98 | 108 | 35 | 41 | 35 | 28 |
| Männer 15 Jahre und älter | 10587 | 10503 | 3978 | 3868 | 3013 | 2999 | 1948 | 1970 | 1648 | 1666 |
| Frauen 15 Jahre und älter | 6188 | 5963 | 2292 | 2154 | 1660 | 1617 | 1287 | 1275 | 949 | 917 |
| Inaktive Fälle (II a) | 93606 | 99293 | 36248 | 38238 | 27962 | 29331 | 17622 | 18278 | 11774 | 13446 |
| b) Zugänge (Neuzugänge und Zugänge aus anderen Gruppen) | | | | | | | | | | |
| Aktive Fälle | 5837 | 5712 | 2599 | 2531 | 1292 | 1170 | 968 | 1029 | 978 | 982 |
| auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr | 35,4 | 33,7 | 41,6 | 39,4 | 34,8 | 31,0 | 27,6 | 28,4 | 32,2 | 31,5 |
| darunter Kinder 0 - 15 Jahre | 1090 | 1066 | 424 | 426 | 210 | 197 | 197 | 226 | 259 | 217 |
| Männer 15 Jahre und älter | 2739 | 2779 | 1262 | 1223 | 630 | 625 | 429 | 470 | 418 | 461 |
| Frauen 15 Jahre und älter | 2008 | 1867 | 913 | 882 | 452 | 348 | 342 | 333 | 301 | 304 |
| Von den aktiven Fällen waren offene Fälle | 1871 | 1695 | 800 | 714 | 465 | 377 | 316 | 326 | 290 | 278 |
| auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr | 11,3 | 10,0 | 12,8 | 11,1 | 12,5 | 10,0 | 9,0 | 9,0 | 9,5 | 8,9 |
| davon Neuzugänge offene Fälle | 775 | 723 | 313 | 282 | 192 | 155 | 150 | 159 | 120 | 127 |
| geschlossene Fälle | 2389 | 2222 | 1045 | 960 | 476 | 425 | 421 | 438 | 447 | 399 |
| Sonstige aktive Fälle von Tbc (Haut, Knochen, Drüsen, Meningitis) | | | | | | | | | | |
| a) Bestand | | | | | | | | | | |
| Gesamtzahl | 8528 | 8513 | 3066 | 2831 | 2486 | 2545 | 1812 | 1872 | 1164 | 1265 |
| auf 10 000 der Bevölkerung | 12,7 | 12,4 | 12,1 | 10,8 | 16,5 | 16,6 | 12,7 | 12,7 | 9,4 | 10,0 |
| b) Zugänge, | | | | | | | | | | |
| Gesamtzahl | 637 | 687 | 283 | 315 | 119 | 104 | 112 | 138 | 123 | 130 |
| auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr | 3,9 | 4,1 | 4,5 | 4,9 | 3,2 | 2,8 | 3,2 | 3,8 | 4,0 | 4,2 |
| davon Neuzugänge | 481 | 517 | 192 | 211 | 100 | 84 | 93 | 118 | 96 | 104 |
| Tbc-Erfassungszahlen | | | | | | | | | | |
| Gesamtzahl der Zuweisungen an die Fürsorge-stelle (I - IV) | 48663 | 50619 | 20407 | 21790 | 11052 | 10244 | 10272 | 10774 | 6932 | 7811 |
| Gesamtbestand der Fürsorge- und Überwachungsfälle | 278959 | 290225 | 100507 | 102008 | 87192 | 90510 | 54782 | 57234 | 36478 | 40473 |
| auf 10 000 der Bevölkerung | 416,1 | 421,5 | 396,0 | 390,1 | 579,2 | 590,6 | 383,8 | 388,7 | 295,6 | 319,9 |
| Gesamtzahl der neuerfaßten Personen 1) | 175973 | 145386 | 129651 | 77886 | 21447 | 42556 | 13440 | 12060 | 11435 | 12884 |
| auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr | 1066,2 | 858,6 | 2075,5 | 1211,4 | 578,4 | 1128,7 | 382,7 | 332,9 | 376,3 | 414,1 |
| Leistungen und Maßnahmen der Tbc-Fürsorgestellen | | | | | | | | | | |
| Zahl der Untersuchungen (ohne Reihenuntersuchungen) | 116636 | 120911 | 49796 | 51845 | 25944 | 24684 | 23881 | 15545 | 17015 | 18837 |
| auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr | 706,7 | 714,0 | 797,2 | 806,4 | 699,7 | 654,7 | 680,1 | 705,2 | 559,9 | 605,5 |
| davon Erstuntersuchungen | 48135 | 49948 | 20149 | 21445 | 11375 | 10659 | 9832 | 10770 | 6779 | 7674 |
| auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr | 291,6 | 295,0 | 322,6 | 333,5 | 306,8 | 266,8 | 280,0 | 297,3 | 223,1 | 246,7 |
| Röntgendurchleuchtungen | 115378 | 118683 | 47120 | 49716 | 26130 | 24323 | 24977 | 25521 | 17151 | 19123 |
| Reihendurchleuchtungen | 23518 | 19994 | 14482 | 11194 | 1499 | 2451 | 3040 | 1286 | 4497 | 5073 |
| Großaufnahmen | 16893 | 16389 | 8820 | 7410 | 3675 | 3971 | 2917 | 3324 | 1481 | 1684 |
| Schirmbildaufnahmen (einschl. Röntgenkataster) | 103792 | 100405 | 94762 | 65358 | 8896 | 34808 | 128 | 239 | 6 | - |
| Schichtaufnahmen | 5450 | 6463 | 5139 | 4919 | 154 | 864 | 134 | 528 | 23 | 152 |
| Sputumuntersuchungen | 8303 | 8249 | 4810 | 4666 | 757 | 832 | 1132 | 976 | 1604 | 1775 |
| Blutsenkungsproben | 14367 | 14134 | 8247 | 7593 | 1314 | 1571 | 2434 | 2569 | 2372 | 2401 |
| Hausbesuche insgesamt | 15582 | 15454 | 7373 | 7709 | 4986 | 3930 | 1167 | 1260 | 2056 | 2555 |
| Hausbesuche bei offener Tbc | 5993 | 5443 | 2802 | 2706 | 1762 | 1250 | 609 | 620 | 820 | 867 |
| vH der Offen-Tuberkulösen | 35,2 | 32,5 | 44,0 | 44,2 | 36,9 | 26,5 | 18,6 | 18,9 | 31,2 | 33,2 |
| Überweisungen in stationäre Behandlung | 2838 | 2896 | 980 | 960 | 808 | 885 | 632 | 655 | 418 | 396 |
| Überweisungen in ambulante Behandlung | 1585 | 1196 | 524 | 346 | 479 | 498 | 248 | 84 | 334 | 268 |

1) Gesamtzahl der Neuzugänge (I-IV) plus Zahl der durch Röntgenreihenuntersuchungen erfaßten Personen (einschl. Röntgenkataster)