

Statistische Berichte

des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg

Stuttgart, Neckarstraße 18B

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

A IV 5-v 3/60

23. Februar 1961

Tuberkuloseerkrankungen und Maßnahmen der Tuberkulose- fürsorgestellen im 3. Vierteljahr 1960

Am 30. September 1960 waren nach den Berichten der Tuberkulosefürsorgestellen 34 329 Einwohner Baden-Württembergs an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane erkrankt. In 10 644 Fällen handelte es sich dabei um eine offene Lungentuberkulose. Gegenüber dem 30. September 1959 ist die Gesamtzahl der aktiven Fälle um 2261 (6,2 vH), die Zahl der Fälle offener Lungentuberkulose um 581 (5,2 vH) zurückgegangen. Von den an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten sind 56,1 vH Männer, 32,3 vH Frauen und 11,6 vH Kinder unter 15 Jahren.

An sonstiger aktiver Tuberkulose waren am 30. September 1960 6230 Personen erkrankt, das sind 172 (2,7 vH) weniger als ein Jahr zuvor.

Im dritten Vierteljahr 1960 wurden durch die Tuberkulosefürsorgestellen und durch die allgemeinen Röntgenreihenuntersuchungen 2237 (im entsprechenden Zeitraum des Vorjahres 2474) vorher nicht bekannte Fälle aktiver Tuberkulose festgestellt; darunter befanden sich 476 (579) Fälle offener Lungentuberkulose. Durch Übergänge aus anderen Diagnosegruppen (Verschlechterungen) ergaben sich weitere 2145 (2304) Zugänge an aktiver Tuberkulose.

Am Ende des Berichtsvierteljahres standen 259 043 Einwohner Baden-Württembergs (3,4 vH der Gesamtbevölkerung) in laufender Fürsorge oder in Überwachung der Tuberkulosefürsorgestellen. Diese Zahl ist um etwa 3300 niedriger als vor Jahresfrist.

Im Rahmen der Leistungen und Maßnahmen der Tuberkulosefürsorgestellen ist im dritten Vierteljahr 1960 die Zahl der Groß- und Schirmbildaufnahmen (ohne Röntgenkataster) gegenüber dem entsprechenden Quartal 1959 erhöht worden, während sich die Zahl der Untersuchungen und der sonstigen Leistungen der Fürsorgestellen verringert hat.

Tuberkuloseerkrankungen und Maßnahmen der Tuberkulosefürsorgestellen im 3. Vierteljahr 1960

| B e z e i c h n u n g | Baden-Württemberg | | | R e g i e r u n g s b e z i r k | | | | | | | |
|--|-------------------|---------------|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| | | | | Nord- württemberg | | Nordbaden | | Südbaden | | Südwestfalen- Hohenzollern | |
| | 3.Vj. 1958. | 3.Vj. 1959 | 3.Vj. 1960 | 3.Vj. 1959 | 3.Vj. 1960 | 3.Vj. 1959 | 3.Vj. 1960 | 3.Vj. 1959 | 3.Vj. 1960 | 3.Vj. 1959 | 3.Vj. 1960 |
| Lungentuberkulose | | | | | | | | | | | |
| a) Bestand (am Ende des Vj.) | | | | | | | | | | | |
| Aktive Fälle | 38 846 | 36 590 | 34 329 | 14 436 | 13 760 | 8 044 | 7 445 | 7 604 | 7 377 | 6 506 | 5 747 |
| Auf 10 000 der Bevölkerung | 52,5 | 48,6 | 44,6 | 49,1 | 45,7 | 48,7 | 44,3 | 48,1 | 45,7 | 47,7 | 41,3 |
| Davon Kinder 0 bis unter 15 Jahre | 4 815 | 4 421 | 3 997 | 1 297 | 1 277 | 1 223 | 989 | 1 032 | 948 | 869 | 783 |
| Männer 15 Jahre und älter | 20 959 | 20 110 | 19 259 | 8 264 | 7 933 | 4 429 | 4 328 | 3 971 | 3 896 | 3 446 | 3 102 |
| Frauen 15 Jahre und älter | 13 072 | 12 059 | 11 073 | 4 875 | 4 550 | 2 392 | 2 128 | 2 601 | 2 533 | 2 191 | 1 862 |
| Von den aktiven Fällen waren offene Fälle | 11 535 | 11 225 | 10 644 | 4 463 | 4 188 | 2 536 | 2 469 | 2 331 | 2 263 | 1 895 | 1 724 |
| Auf 10 000 der Bevölkerung | 15,6 | 14,9 | 13,8 | 15,2 | 13,9 | 15,4 | 14,7 | 14,7 | 14,0 | 13,9 | 12,4 |
| Davon Kinder 0 bis unter 15 Jahre | 88 | 116 | 113 | 44 | 44 | 24 | 19 | 44 | 47 | 4 | 3 |
| Männer 15 Jahre und älter | 8 064 | 8 007 | 7 672 | 3 176 | 2 988 | 1 872 | 1 850 | 1 584 | 1 556 | 1 375 | 1 278 |
| Frauen 15 Jahre und älter | 3 383 | 3 102 | 2 859 | 1 243 | 1 156 | 640 | 600 | 703 | 660 | 516 | 443 |
| Inaktive Fälle (IIa) | 119 078 | 118 583 | 118 579 | 45 365 | 44 628 | 36 804 | 38 243 | 18 613 | 19 087 | 17 801 | 16 621 |
| b) Zugänge (Neuzugänge und Zugänge aus anderen Gruppen) | | | | | | | | | | | |
| Aktive Fälle | 4 562 | 4 272 | 3 878 | 1 607 | 1 514 | 1 039 | 958 | 871 | 795 | 755 | 611 |
| Auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr | 24,5 | 22,5 | 20,1 | 21,8 | 20,0 | 25,0 | 22,7 | 21,9 | 19,6 | 22,0 | 17,5 |
| Davon Kinder 0 bis unter 15 Jahre | 607 | 551 | 501 | 142 | 167 | 156 | 129 | 145 | 107 | 108 | 98 |
| Männer 15 Jahre und älter | 2 467 | 2 356 | 2 231 | 927 | 872 | 562 | 580 | 478 | 438 | 389 | 341 |
| Frauen 15 Jahre und älter | 1 488 | 1 365 | 1 146 | 538 | 475 | 321 | 249 | 248 | 250 | 258 | 172 |
| Von den aktiven Fällen waren offene Fälle | 1 350 | 1 341 | 1 190 | 516 | 465 | 328 | 307 | 274 | 245 | 223 | 173 |
| Auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr | 7,3 | 7,1 | 6,2 | 7,0 | 6,2 | 7,9 | 7,3 | 6,9 | 6,0 | 6,5 | 4,9 |
| Darunter Neuzugänge | 598 | 579 | 476 | 243 | 195 | 104 | 90 | 128 | 108 | 104 | 85 |
| Offene Fälle | 1 758 | 1 494 | 1 356 | 531 | 497 | 315 | 310 | 339 | 296 | 309 | 253 |
| Geschlossene Fälle | | | | | | | | | | | |
| Sonstige aktive Fälle von Tbc (Haut, Knochen, Drüsen, Meningitis) | | | | | | | | | | | |
| a) Bestand (am Ende des Vj.) | | | | | | | | | | | |
| Gesamtzahl | 6 809 | 6 402 | 6 230 | 2 341 | 2 238 | 1 628 | 1 608 | 1 388 | 1 422 | 1 045 | 962 |
| Auf 10 000 der Bevölkerung | 9,2 | 8,5 | 8,1 | 8,0 | 7,4 | 9,9 | 9,6 | 8,8 | 8,8 | 7,7 | 6,9 |
| b) Zugänge (Neuzugänge und Zugänge aus anderen Gruppen) | | | | | | | | | | | |
| Gesamtzahl | 570 | 506 | 504 | 214 | 223 | 90 | 79 | 109 | 110 | 93 | 92 |
| Auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr | 3,1 | 2,7 | 2,6 | 2,9 | 3,0 | 2,2 | 1,9 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,6 |
| Darunter Neuzugänge | 462 | 401 | 405 | 157 | 183 | 74 | 62 | 98 | 93 | 72 | 67 |
| Tbc-Erfassungszahlen | | | | | | | | | | | |
| Gesamtzahl der Zuweisungen an die Fürsorgestellen (I-IV) | 41 746 | 40 121 | 39 021 | 19 294 | 19 698 | 8 119 | 8 145 | 8 050 | 6 961 | 4 658 | 4 219 |
| Gesamtbestand der Fürsorge- und Überwachungsfälle (am Ende des Vj.) | 268 627 | 262 345 | 259 043 | 100 280 | 98 785 | 74 868 | 75 994 | 47 557 | 47 746 | 39 640 | 36 518 |
| Auf 10 000 der Bevölkerung | 362,8 | 348,1 | 336,6 | 341,3 | 328,3 | 453,3 | 451,8 | 300,6 | 296,1 | 290,5 | 262,1 |
| Leistungen und Maßnahmen der Tbc-Fürsorgestellen | | | | | | | | | | | |
| Untersuchungen | 97 709 | 94 044 | 88 676 | 42 178 | 40 453 | 18 173 | 18 634 | 19 508 | 17 058 | 14 185 | 12 531 |
| Auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr | 524,9 | 496,0 | 458,6 | 570,9 | 535,3 | 437,4 | 440,8 | 489,7 | 421,1 | 413,1 | 358,0 |
| Darunter Erstuntersuchungen | 41 309 | 39 433 | 38 252 | 19 350 | 19 261 | 8 103 | 8 050 | 7 660 | 6 674 | 4 320 | 4 267 |
| Auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr | 221,9 | 208,0 | 197,8 | 261,9 | 254,9 | 195,0 | 190,4 | 192,3 | 164,8 | 125,8 | 121,9 |
| Röntgendurchleuchtungen | 85 807 | 82 172 | 73 121 | 32 827 | 28 290 | 16 085 | 16 522 | 19 448 | 16 765 | 13 812 | 11 546 |
| Reihendurchleuchtungen | 6 333 | 5 280 | 5 018 | 3 158 | 2 227 | 783 | 610 | 105 | 495 | 1 234 | 1 686 |
| Großaufnahmen | 14 063 | 13 984 | 14 274 | 6 678 | 6 686 | 3 129 | 3 055 | 2 429 | 2 879 | 1 748 | 1 654 |
| Schirmbildaufnahmen (ohne Röntgenkataster) | 13 353 | 15 817 | 15 977 | 9 725 | 11 138 | 4 689 | 3 727 | 170 | 42 | 1 233 | 1 070 |
| Schichtaufnahmen | 4 346 | 5 110 | 3 196 | 4 184 | 2 463 | 423 | 283 | 319 | 346 | 184 | 104 |
| Sputumuntersuchungen | 6 036 | 5 564 | 4 772 | 2 443 | 2 111 | 998 | 696 | 565 | 461 | 1 558 | 1 504 |
| Blutsenkungsproben | 9 790 | 8 868 | 6 834 | 4 019 | 3 073 | 1 230 | 1 007 | 1 516 | 1 332 | 2 103 | 1 422 |
| Hausbesuche insgesamt | 14 552 | 14 312 | 13 658 | 5 817 | 5 683 | 3 982 | 3 672 | 1 344 | 1 591 | 3 169 | 2 712 |
| Darunter bei offener Tbc | 4 550 | 4 621 | 4 321 | 1 896 | 1 790 | 1 321 | 1 132 | 561 | 641 | 843 | 758 |
| vll der Offen-Tuberkulösen | 39,4 | 41,2 | 40,6 | 42,5 | 42,7 | 52,1 | 45,8 | 24,1 | 28,3 | 44,5 | 44,0 |
| Überweisungen in stationäre Behandlung | 2 397 | 2 119 | 1 948 | 530 | 485 | 725 | 736 | 554 | 478 | 310 | 249 |