

Statistische Berichte

des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg

Stuttgart, Neckarstraße 18B



BEVÖLKERUNG UND KULTUR

A IV 5 - v 4/60

25. April 1961

Tuberkuloseerkrankungen und Maßnahmen der Tuberkuloseförsorgestellen im 4. Vierteljahr 1960

Am Jahresende 1960 standen 258 600 Einwohner Baden-Württembergs (3,3 vH der Gesamtbevölkerung) in laufender Fürsorge oder in Überwachung der Tuberkuloseförsorgestellen. Die Zahl ist um rund 600 niedriger als vor einem Jahr.

Während des vierten Vierteljahres 1960 hat sich der Bestand der an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten um 1187 auf 33 142 verringert. Während des ganzen Jahres ist die Gesamtzahl um 1755 Personen (5,0 vH) zurückgegangen. Innerhalb des Krankenbestandes verminderte sich die Zahl der offenen Fälle im Verlauf des Jahres 1960 um 522 (4,8 vH) auf 10 307. Der Bestand an aktiver Tuberkulose anderer Organe verringerte sich während des gleichen Zeitraumes um 122 (2,0 vH) auf 6016 Fälle.

Durch die Tuberkuloseförsorgestellen und allgemeinen Röntgenreihenuntersuchungen wurden während des Berichtsvierteljahres 2563 (im entsprechenden Zeitraum des Vorjahres 2500) vorher nicht bekannte Fälle aktiver Tuberkulose festgestellt; darunter befanden sich 515 (499) Fälle offener Lungentuberkulose. Außerdem waren 2632 (2737) Zugänge an aktiver Tuberkulose durch Übergänge aus anderen Diagnosegruppen (Verschlechterungen) zu verzeichnen.

Im vierten Vierteljahr 1960 wurden den Fürsorgestellen 46 160 Personen zugewiesen, das sind 3243 mehr als im vierten Quartal 1959.

Tuberkuloseerkrankungen und Maßnahmen der Tuberkulosefürsorgestellen im 4. Vierteljahr 1960

| B e z e i c h n u n g | Baden-Württemberg | | | R e g i e r u n g s b e z i r k | | | | | | | |
|--|-------------------|---------------|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------|---------------|
| | | | | Nord- württemberg | | Nordbaden | | Südbaden | | Südwürttemberg- Hehenzollern | |
| | 4.Vj. 1958 | 4.Vj. 1959 | 4.Vj. 1960 | 4.Vj. 1959 | 4.Vj. 1960 | 4.Vj. 1959 | 4.Vj. 1960 | 4.Vj. 1959 | 4.Vj. 1960 | 4.Vj. 1959 | 4.Vj. 1960 |
| Lungentuberkulose | | | | | | | | | | | |
| a) Bestand (am Ende des Vj.) | | | | | | | | | | | |
| Aktive Fälle | 37 697 | 34 897 | 33 142 | 13 909 | 13 342 | 7 483 | 7 063 | 7 380 | 7 161 | 6 125 | 5 576 |
| Auf 10 000 der Bevölkerung | 50,7 | 46,2 | 42,9 | 47,2 | 44,2 | 45,1 | 41,8 | 46,5 | 44,2 | 44,7 | 39,9 |
| Davon Kinder 0 bis unter 15 Jahre | 4 591 | 3 946 | 3 813 | 1 207 | 1 243 | 984 | 940 | 938 | 880 | 819 | 750 |
| Männer 15 Jahre und älter | 20 435 | 19 397 | 18 856 | 7 995 | 7 747 | 4 264 | 4 170 | 3 892 | 3 872 | 3 246 | 3 067 |
| Frauen 15 Jahre und älter | 12 671 | 11 554 | 10 473 | 4 707 | 4 352 | 2 235 | 1 953 | 2 552 | 2 409 | 2 060 | 1 759 |
| Von den aktiven Fällen waren | | | | | | | | | | | |
| offene Fälle | 11 247 | 10 829 | 10 307 | 4 311 | 4 099 | 2 473 | 2 414 | 2 240 | 2 181 | 1 805 | 1 613 |
| Auf 10 000 der Bevölkerung | 15,1 | 14,3 | 13,3 | 14,6 | 13,6 | 14,9 | 14,3 | 14,1 | 13,5 | 13,2 | 11,5 |
| Davon Kinder 0 bis unter 15 Jahre | 89 | 94 | 105 | 36 | 44 | 21 | 18 | 32 | 39 | 5 | 4 |
| Männer 15 Jahre und älter | 7 899 | 7 738 | 7 533 | 3 073 | 2 959 | 1 821 | 1 820 | 1 542 | 1 519 | 1 302 | 1 235 |
| Frauen 15 Jahre und älter | 3 259 | 2 997 | 2 669 | 1 202 | 1 096 | 631 | 576 | 666 | 623 | 498 | 374 |
| Inaktive Fälle (IIa) | 119 147 | 118 489 | 119 973 | 44 997 | 45 106 | 37 177 | 38 606 | 18 738 | 19 452 | 17 577 | 16 809 |
| b) Zugänge (Neuzugänge und Zugänge aus anderen Gruppen) | | | | | | | | | | | |
| Aktive Fälle | 5 314 | 4 572 | 4 507 | 1 766 | 1 622 | 1 058 | 1 005 | 915 | 966 | 833 | 914 |
| Auf 10 000 der Bevölkerung | 28,4 | 24,2 | 23,2 | 24,0 | 21,3 | 25,6 | 23,7 | 23,1 | 23,7 | 24,4 | 26,0 |
| Davon Kinder 0 bis unter 15 Jahre | 710 | 602 | 614 | 170 | 203 | 159 | 158 | 131 | 109 | 142 | 144 |
| Männer 15 Jahre und älter | 2 766 | 2 574 | 2 636 | 1 009 | 960 | 624 | 600 | 490 | 573 | 451 | 503 |
| Frauen 15 Jahre und älter | 1 838 | 1 396 | 1 257 | 587 | 459 | 275 | 247 | 294 | 284 | 240 | 267 |
| Von den aktiven Fällen waren | | | | | | | | | | | |
| offene Fälle | 1 530 | 1 345 | 1 398 | 518 | 507 | 349 | 337 | 249 | 307 | 229 | 247 |
| Auf 10 000 der Bevölkerung | 8,2 | 7,1 | 7,2 | 7,0 | 6,7 | 8,4 | 7,9 | 6,3 | 7,5 | 6,7 | 7,0 |
| Darunter Neuzugänge | 611 | 499 | 515 | 209 | 205 | 95 | 74 | 95 | 108 | 100 | 128 |
| Offene Fälle | 1 864 | 1 497 | 1 550 | 517 | 516 | 320 | 312 | 353 | 329 | 307 | 393 |
| Geschlossene Fälle | | | | | | | | | | | |
| Sonstige aktive Fälle von Tbc (Haut, Knochen, Drüsen, Meningitis) | | | | | | | | | | | |
| a) Bestand (am Ende des Vj.) | | | | | | | | | | | |
| Gesamtzahl | 6 493 | 6 138 | 6 016 | 2 209 | 2 177 | 1 600 | 1 515 | 1 348 | 1 398 | 981 | 926 |
| Auf 10 000 der Bevölkerung | 8,7 | 8,1 | 7,8 | 7,5 | 7,2 | 9,6 | 9,0 | 8,5 | 8,6 | 7,2 | 6,6 |
| b) Zugänge (Neuzugänge und Zugänge aus anderen Gruppen) | 710 | 665 | 688 | 278 | 265 | 114 | 130 | 140 | 141 | 133 | 152 |
| Gesamtzahl | | | | | | | | | | | |
| Auf 10 000 der Bevölkerung | 3,8 | 3,5 | 3,5 | 3,7 | 3,5 | 2,8 | 3,1 | 3,5 | 3,5 | 3,9 | 4,3 |
| und 1 Jahr | 521 | 504 | 498 | 209 | 167 | 77 | 86 | 112 | 120 | 106 | 125 |
| Darunter Neuzugänge | | | | | | | | | | | |
| Tbc-Erfassungszahlen | | | | | | | | | | | |
| Gesamtzahl der Zuweisungen an die Fürsorgestellen (I-IV) | 43 084 | 42 917 | 46 160 | 20 822 | 24 083 | 8 429 | 8 597 | 8 531 | 7 875 | 5 135 | 5 605 |
| Gesamtbestand der Fürsorge- und Überwachungsfälle (am Ende des Vj.) | 264 699 | 259 185 | 258 627 | 98 823 | 98 762 | 74 498 | 75 655 | 47 535 | 47 793 | 38 329 | 36 417 |
| Auf 10 000 der Bevölkerung | 356,1 | 342,8 | 334,7 | 335,4 | 327,0 | 449,2 | 447,6 | 299,6 | 295,3 | 279,8 | 260,5 |
| Leistungen und Maßnahmen der Tbc-Fürsorgestellen | | | | | | | | | | | |
| Untersuchungen | 108 054 | 99 191 | 98 377 | 45 415 | 46 198 | 19 193 | 19 602 | 19 283 | 16 976 | 15 300 | 15 601 |
| Auf 10 000 der Bevölkerung | 577,6 | 525,6 | 506,3 | 617,0 | 607,9 | 463,9 | 461,4 | 486,8 | 417,3 | 448,3 | 443,8 |
| und 1 Jahr | 43 787 | 43 009 | 45 786 | 21 223 | 23 272 | 8 246 | 8 563 | 8 223 | 7 572 | 5 317 | 6 379 |
| Darunter Erstuntersuchungen | | | | | | | | | | | |
| Auf 10 000 der Bevölkerung | 234,1 | 227,9 | 235,6 | 288,3 | 306,2 | 199,3 | 201,6 | 207,6 | 186,1 | 155,8 | 181,5 |
| und 1 Jahr | 92 487 | 84 221 | 77 372 | 33 650 | 29 452 | 17 516 | 16 883 | 18 574 | 16 889 | 14 481 | 14 148 |
| Röntgendurchleuchtungen | 11 466 | 6 654 | 6 652 | 3 303 | 3 049 | 892 | 583 | 476 | 159 | 1 983 | 2 861 |
| Reihendurchleuchtungen | 15 266 | 14 415 | 15 411 | 6 476 | 7 156 | 2 990 | 2 998 | 3 258 | 3 308 | 1 691 | 1 949 |
| Großaufnahmen | | | | | | | | | | | |
| Schirmbildaufnahmen (ohne Röntgenkataster) | 13 978 | 18 580 | 21 685 | 11 801 | 14 960 | 5 497 | 4 948 | 298 | 675 | 984 | 1 102 |
| Schichtaufnahmen | 6 033 | 4 848 | 3 553 | 3 609 | 2 636 | 488 | 300 | 558 | 439 | 193 | 178 |
| Sputumuntersuchungen | 7 191 | 6 095 | 5 624 | 2 578 | 2 285 | 1 217 | 987 | 538 | 659 | 1 762 | 1 693 |
| Blutsenkungsproben | 10 667 | 8 255 | 8 115 | 3 681 | 3 460 | 1 165 | 1 192 | 1 491 | 1 667 | 1 918 | 1 796 |
| Hausbesuche insgesamt | 14 333 | 13 429 | 13 454 | 5 725 | 5 216 | 4 021 | 4 071 | 973 | 1 539 | 2 710 | 2 628 |
| Darunter bei offener Tbc | 4 628 | 4 479 | 4 554 | 1 875 | 1 800 | 1 361 | 1 407 | 412 | 590 | 831 | 757 |
| vH der Offen-Tuberkulösen | 41,1 | 41,4 | 44,2 | 43,5 | 43,9 | 55,0 | 58,3 | 18,4 | 27,1 | 46,0 | 46,9 |
| Überweisungen in stationäre Behandlung | 2 223 | 1 956 | 1 851 | 474 | 436 | 650 | 650 | 512 | 488 | 320 | 277 |