

# Statistische Berichte

des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg

Stuttgart, Neckarstraße 18B

---

## BEVÖLKERUNG UND KULTUR

A IV 5 - vj 1/62

31. Juli 1962

### Tuberkuloseerkrankungen und Maßnahmen der Tuberkulosefürsorgestellen im 1. Vierteljahr 1962

Am 31. März 1962 waren nach den Berichten der Tuberkulosefürsorgestellen 30 430 Einwohner von Baden-Württemberg an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane erkrankt. In 9484 Fällen handelte es sich dabei um eine offene Lungentuberkulose. Innerhalb eines Jahres hat die Gesamtzahl der aktiven Fälle um 2246 (6,9%), die Zahl der Fälle offener Lungentuberkulose um 628 (6,2%) abgenommen. Die Zahl der an aktiver Tuberkulose anderer Organe Erkrankten ist im gleichen Zeitraum um 195 (3,3%) auf 5654 zurückgegangen.

Im ersten Vierteljahr 1962 wurden von den Tuberkulosefürsorgestellen 2189 (im gleichen Zeitraum des Vorjahres 2405) Fälle aktiver Tuberkulose erstmals erfaßt; darunter befanden sich 420 (477) Fälle offener Lungentuberkulose. Außerdem waren 2166 (2564) Zugänge an aktiver Tuberkulose durch Übergänge aus anderen Diagnosegruppen (Verschlechterungen) zu verzeichnen.

Am Ende des Berichtsvierteljahres standen 253 389 Einwohner Baden-Württembergs (3,2% der Gesamtbevölkerung) in laufender Fürsorge oder Überwachung durch die Tuberkulosefürsorgestellen. Die Zahl ist um 3847 (1,5%) niedriger als vor einem Jahr.

Die Zahl der von den Tuberkulosefürsorgestellen durchgeführten Schirmbildaufnahmen (ohne Röntgenkataster) hat sich im Berichtsvierteljahr - verglichen mit dem ersten Vierteljahr 1961 - mehr als verdreifacht, während die Gesamtzahl der sonstigen Maßnahmen und Leistungen der Tuberkulosefürsorgestellen leicht zurückgegangen ist.

## Tuberkuloseerkrankungen und Maßnahmen der Tuberkulosefürsorgestellen im 1. Vierteljahr 1962

| Bezeichnung   | Regierungsbezirk  |         |         |                 |        |                |        |                |        |                    |        |
|---|-------------------|---------|---------|-----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|--------------------|--------|
|   | Baden-Württemberg |         |         | Nordwürttemberg |        | Nordbaden      |        | Südbaden       |        | Südwestfalen-Lippe |        |
|   | 1. Vierteljahr    |         |         | 1. Vierteljahr  |        | 1. Vierteljahr |        | 1. Vierteljahr |        | 1. Vierteljahr     |        |
|   | 1960              | 1961    | 1962    | 1961            | 1962   | 1961           | 1962   | 1961           | 1962   | 1961               | 1962   |
| <b>Lungentuberkulose</b>  |                   |         |         |                 |        |                |        |                |        |                    |        |
| a) Bestand (am Ende des Vj.):   |                   |         |         |                 |        |                |        |                |        |                    |        |
| Aktive Fälle:   | 34 618            | 32 676  | 30 430  | 13 024          | 11 637 | 6 920          | 6 310  | 7 122          | 7 094  | 5 610              | 5 389  |
| Auf 10 000 der Bevölkerung  | 45,6              | 42,0    | 38,6    | 42,7            | 37,7   | 40,7           | 36,7   | 43,7           | 43,0   | 39,9               | 37,9   |
| Kinder unter 15 Jahren  | 4 034             | 3 728   | 3 536   | 1 185           | 1 037  | 882            | 817    | 888            | 935    | 773                | 747    |
| Männer 15 Jahre und älter   | 19 255            | 18 682  | 17 651  | 7 633           | 6 972  | 4 093          | 3 777  | 3 869          | 3 914  | 3 087              | 2 988  |
| Frauen 15 Jahre und älter   | 11 329            | 10 266  | 9 243   | 4 206           | 3 628  | 1 945          | 1 716  | 2 365          | 2 245  | 1 750              | 1 654  |
| Von den aktiven Fällen waren offene Fälle:  | 10 734            | 10 112  | 9 484   | 4 002           | 3 656  | 2 387          | 2 220  | 2 120          | 2 133  | 1 603              | 1 475  |
| Auf 10 000 der Bevölkerung  | 14,1              | 13,0    | 12,0    | 13,1            | 11,8   | 14,1           | 12,9   | 13,0           | 12,9   | 11,4               | 10,4   |
| Kinder unter 15 Jahren  | 95                | 95      | 96      | 37              | 36     | 19             | 22     | 34             | 33     | 5                  | 5      |
| Männer 15 Jahre und älter   | 7 711             | 7 457   | 7 091   | 2 920           | 2 701  | 1 811          | 1 709  | 1 499          | 1 541  | 1 227              | 1 140  |
| Frauen 15 Jahre und älter   | 2 928             | 2 560   | 2 297   | 1 045           | 919    | 557            | 489    | 587            | 559    | 371                | 330    |
| Inaktive Fälle (IIa)  | 118 599           | 120 348 | 122 031 | 45 585          | 45 998 | 38 722         | 39 004 | 19 314         | 19 615 | 16 727             | 17 414 |
| b) Zugänge (Neuzugänge und Zugänge aus anderen Gruppen):                            |                   |         |         |                 |        |                |        |                |        |                    |        |
| Aktive Fälle:   | 4 279             | 4 179   | 3 765   | 1 462           | 1 345  | 1 050          | 991    | 961            | 864    | 706                | 565    |
| Auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr   | 22,7              | 21,9    | 19,4    | 19,5            | 17,7   | 25,2           | 23,4   | 24,0           | 21,3   | 20,4               | 16,2   |
| Kinder unter 15 Jahren  | 630               | 577     | 507     | 135             | 110    | 160            | 189    | 164            | 124    | 118                | 84     |
| Männer 15 Jahre und älter   | 2 383             | 2 404   | 2 202   | 900             | 826    | 607            | 566    | 515            | 481    | 382                | 329    |
| Frauen 15 Jahre und älter   | 1 266             | 1 198   | 1 056   | 427             | 409    | 283            | 236    | 282            | 259    | 206                | 152    |
| Von den aktiven Fällen waren offene Fälle:  | 1 283             | 1 184   | 1 103   | 421             | 404    | 326            | 287    | 260            | 266    | 177                | 146    |
| Auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr   | 6,8               | 6,2     | 5,7     | 5,6             | 5,3    | 7,8            | 6,8    | 6,5            | 6,6    | 5,1                | 4,2    |
| Darunter Neuzugänge:  |                   |         |         |                 |        |                |        |                |        |                    |        |
| Offene Fälle  | 521               | 477     | 420     | 192             | 179    | 90             | 78     | 104            | 100    | 91                 | 63     |
| Geschlossene Fälle  | 1 577             | 1 554   | 1 342   | 472             | 438    | 366            | 354    | 396            | 333    | 320                | 217    |
| Sonstige aktive Fälle von Tbc (Haut, Knochen, Drüsen, Meningitis, Urogenitalsystem) |                   |         |         |                 |        |                |        |                |        |                    |        |
| a) Bestand (am Ende des Vj.):   | 6 123             | 5 849   | 5 654   | 2 158           | 2 130  | 1 437          | 1 374  | 1 340          | 1 288  | 914                | 862    |
| Auf 10 000 der Bevölkerung  | 8,1               | 7,5     | 7,2     | 7,1             | 6,9    | 8,5            | 8,0    | 8,2            | 7,8    | 6,5                | 6,1    |
| b) Zugänge (Neuzugänge und Zugänge aus anderen Gruppen):                            | 518               | 790     | 590     | 359             | 189    | 93             | 190    | 167            | 121    | 171                | 90     |
| Auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr   | 2,7               | 4,1     | 3,0     | 4,8             | 2,5    | 2,2            | 4,5    | 4,2            | 3,0    | 5,0                | 2,6    |
| Darunter Neuzugänge   | 403               | 374     | 427     | 160             | 140    | 69             | 124    | 85             | 96     | 60                 | 67     |
| <b>Tuberkulose-Erfassungszahlen</b>   |                   |         |         |                 |        |                |        |                |        |                    |        |
| Zuweisungen an die Fürsorgestellen (I-IV)   | 49 382            | 48 099  | 44 067  | 24 874          | 21 005 | 9 139          | 9 166  | 8 594          | 8 888  | 5 492              | 5 008  |
| Fürsorge- und Überwachungsfälle (am Ende des Vj.):                                  | 259 153           | 257 236 | 253 389 | 98 372          | 96 871 | 75 447         | 73 917 | 46 762         | 45 461 | 36 655             | 37 140 |
| Auf 10 000 der Bevölkerung  | 341,3             | 330,6   | 321,5   | 322,8           | 313,5  | 444,1          | 429,7  | 287,2          | 275,5  | 260,8              | 261,3  |
| <b>Leistungen und Maßnahmen der Tuberkulose-Fürsorgestellen</b>                     |                   |         |         |                 |        |                |        |                |        |                    |        |
| Untersuchungen:   | 106 197           | 102 641 | 100 942 | 49 866          | 44 868 | 19 754         | 20 117 | 19 048         | 19 933 | 13 973             | 16 024 |
| Auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr   | 562,2             | 537,4   | 521,0   | 667,5           | 591,2  | 473,2          | 475,2  | 476,1          | 491,3  | 404,5              | 458,7  |
| Darunter Erstuntersuchungen   | 48 223            | 48 066  | 43 116  | 25 542          | 20 592 | 9 226          | 9 128  | 8 155          | 8 581  | 5 143              | 4 815  |
| Auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr   | 255,3             | 251,7   | 222,6   | 341,9           | 271,3  | 221,0          | 215,6  | 203,8          | 211,5  | 148,9              | 137,8  |
| Röntgendurchleuchtungen   | 88 642            | 82 524  | 77 210  | 33 727          | 29 649 | 17 068         | 16 560 | 18 607         | 17 530 | 13 122             | 13 471 |
| Reihendurchleuchtungen  | 16 435            | 16 384  | 7 276   | 10 370          | 2 476  | 1 695          | 1 461  | 1 792          | 365    | 2 527              | 2 974  |
| Großaufnahmen   | 16 344            | 15 937  | 17 442  | 7 454           | 8 692  | 3 178          | 3 003  | 3 332          | 3 278  | 1 973              | 2 469  |
| Schirmbildaufnahmen (ohne Röntgenkataster)  | 20 516            | 21 634  | 72 131  | 13 234          | 59 404 | 7 024          | 8 436  | 222            | 1 913  | 1 154              | 2 378  |
| Schichtaufnahmen  | 4 394             | 3 581   | 4 175   | 2 568           | 3 084  | 257            | 248    | 640            | 723    | 116                | 120    |
| Sputumuntersuchungen  | 6 143             | 5 634   | 5 062   | 2 316           | 2 079  | 1 044          | 906    | 657            | 610    | 1 617              | 1 467  |
| Blutsenkungsproben  | 9 151             | 8 413   | 7 212   | 3 637           | 2 911  | 1 181          | 1 110  | 1 799          | 1 573  | 1 796              | 1 618  |
| Hausbesuche:  | 12 367            | 12 072  | 10 586  | 4 713           | 4 183  | 3 476          | 3 173  | 1 257          | 1 005  | 2 626              | 2 225  |
| Darunter bei offener Tuberkulose  | 3 858             | 3 541   | 3 328   | 1 320           | 1 221  | 1 143          | 1 133  | 424            | 343    | 654                | 631    |
| % der Offen-Tuberkulösen  | 35,9              | 35,0    | 35,1    | 33,0            | 33,4   | 47,9           | 51,0   | 20,0           | 16,1   | 40,8               | 42,8   |
| Überweisungen in stationäre Behandlung  | 2 248             | 2 048   | 1 728   | 557             | 416    | 690            | 601    | 510            | 462    | 291                | 249    |
| Überweisungen in ambulante Behandlung   |                   | 534     | 474     | 200             | 170    | 81             | 103    | 33             | 51     | 220                | 150    |