

Statistische Berichte XY 1571

des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg



Stuttgart, Konrad-Adenauer-Straße 18 B

A IV 5 - j/66

Bevölkerung und Kultur

24. August 1967


Tuberkuloseerkrankungen und Maßnahmen der Tuberkulosefürsorgestellen
im Jahr 1966 mit Vierteljahresergebnissen

Am 31. Dezember 1966 standen 252 819 Einwohner Baden-Württembergs bei den Tuberkulosefürsorgestellen in laufender Fürsorge oder Überwachung. Auf 10 000 Einwohner berechnet, waren das 296 Personen. Im Vergleich mit dem Stand am Ende des Vorjahres nahm die Zahl der Betreuten um 7517 (- 2,9%) ab. Zu diesem Rückgang hat besonders die Verringerung der Zahl der eigentlichen Fürsorgefälle um 5,5% beigetragen. Sie betrug nur noch 29 962. Auch die Zahl der Überwachungs- und Beobachtungsfälle verkleinerte sich, und zwar die der Überwachungsfälle um 2,6% auf 211 777, die der Beobachtungsfälle um 1,3% auf 11 080. Auf 10 000 Einwohner kamen 35,1 an aktiver Tuberkulose Erkrankte, vor fünf Jahren waren es noch 46,9.

Zum Jahresende 1966 meldeten die Gesundheitsämter 25 296 an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane erkrankte Personen, das sind 6% weniger als im Vorjahr. Dabei ging die Zahl der an offener Tuberkulose der Atmungsorgane Leidenden um 4,8% auf 7646 und die der an geschlossener Tuberkulose Erkrankten um 6,4% auf 17 650 zurück. Auch die Zahl der an Tuberkulose anderer Organe Erkrankten (4666) war rückläufig (- 2,8%).

Im Jahr 1966 wurden 13 978 Zugänge an Tuberkulose Erkrankter gemeldet, darunter 2688 Übergänge aus anderen Gruppen (Diagnoseübergänge und Altersübergänge). Eigentliche Zugänge wurden 11 290 gezählt, von diesen waren 7830 (69,4%) erstmals bekannt gewordene Tuberkulose, 3103 (27,4%) Wiedererkrankte und 357 (3,2%) Kranke, die aus Kreisen außerhalb Baden-Württembergs kamen. (In dieser Untergliederung wurden die Zugänge 1966 zum ersten Malerfaßt.) Werden diese 11 290 Zugänge nach der Tuberkuloseform gegliedert, so ergibt sich folgendes Bild: 23% entfielen auf ansteckende Tuberkulose der Atmungsorgane, 62% auf nicht ansteckende Tuberkulose der Atmungsorgane und 15% auf Tuberkulose anderer Organe.

Über die Entwicklung des Bestandes der an aktiver Tuberkulose Erkrankten gibt das Schaubild für den Zeitraum von 1956 bis 1966 näheren Aufschluß.



Tuberkuloseerkrankungen und Maßnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	1965				1966			
		Baden-Württemberg							
		1.Vj.	2.Vj.	3.Vj.	4.Vj.	1.Vj.	2.Vj.	3.Vj.	4.Vj.
	Lungentuberkulose								
	a) Bestand (am Ende des Vj.):								
1	Aktive Fälle:	27 327	27 579	27 559	26 894	26 231	26 226	26 188	25 296
2	Auf 10 000 der Bevölkerung	32,9	32,0	32,8	31,9	30,9	30,8	30,6	29,6
3	Kinder unter 15 Jahren	3 245	3 283	3 324	3 226	3 140	3 199	3 204	3 065
4	Männer 15 Jahre und älter	16 106	16 282	16 210	15 832	15 564	15 578	15 554	15 140
5	Frauen 15 Jahre und älter	7 976	8 014	8 025	7 836	7 527	7 449	7 430	7 091
	Von den aktiven Fällen waren								
6	offene Fälle:	8 496	8 477	8 351	8 030	7 946	7 947	7 980	7 646
7	Auf 10 000 der Bevölkerung	10,2	10,1	9,9	9,5	9,4	9,3	9,3	9,0
8	Kinder unter 15 Jahren	100	113	117	109	99	101	108	93
9	Männer 15 Jahre und älter	6 417	6 413	6 285	6 084	6 010	5 980	6 005	5 795
10	Frauen 15 Jahre und älter	1 979	1 951	1 949	1 837	1 837	1 866	1 867	1 758
11	Inaktive Fälle	127 261	128 198	128 720	129 234	128 940	128 412	128 001	127 553
	b) Zugänge (Neuzugänge und Zugänge aus anderen Gruppen):								
12	Aktive Fälle:	3 630	3 755	3 510	3 973	3 612	3 366	3 182	3 818
13	Auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr	17,8	18,0	16,6	18,7	17,3	15,9	14,8	17,7
14	Kinder unter 15 Jahren	477	444	443	577	463	470	399	497
15	Männer 15 Jahre und älter	2 163	2 284	2 058	2 281	2 203	2 012	1 911	2 242
16	Frauen 15 Jahre und älter	990	1 027	1 009	1 115	946	884	872	1 079
	Von den aktiven Fällen waren								
17	offene Fälle:	1 046	1 108	1 005	1 064	1 084	1 023	975	1 048
18	Auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr	5,1	5,3	4,8	5,0	5,2	4,8	4,5	4,9
	Darunter Neuzugänge ¹⁾ :								
19	Offene Fälle	439	532	504	490	464	467	406	435
20	Geschlossene Fälle	1 366	1 412	1 362	1 567	1 348	1 254	1 168	1 285
	Sonstige aktive Fälle von Tbk (Knochen und Gelenken, periphere Lymphknoten, Haut, Hirnhaut, Urogenitalorgane, sonstige Organe)								
21	a) Bestand (am Ende des Vj.):	4 941	4 992	5 059	4 801	4 753	4 795	4 823	4 666
22	Auf 10 000 der Bevölkerung	5,9	6,0	6,0	5,7	5,6	5,6	5,6	5,5
23	b) Zugänge (Neuzugänge und Zugänge aus anderen Gruppen):	421	443	459	503	470	441	399	462
24	Auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr	2,1	2,1	2,2	2,4	2,3	2,1	1,9	2,1
25	Darunter Neuzugänge	318	365	377	359	366	350	328	316
	Tuberkulose-Erfassungszahlen								
26	Fürsorge- und Überwachungs-fälle (am Ende des Vj.):	256 771	259 172	260 373	260 336	257 664	256 326	256 076	252 819
27	Auf 10 000 der Bevölkerung	308,7	309,5	309,5	309,0	303,8	300,7	299,5	296,2
	Leistungen und Maßnahmen der Tuberkulose-Fürsorgestellen								
28	Röntgendurchleuchtung	50 938	46 302	45 789	48 417	50 591	41 426	37 408	41 753
29	Großaufnahmen	18 201	12 829	12 242	12 931	13 258	11 609	11 024	12 180
30	Schirmbildaufnahmen	42 047	40 373	43 055	44 041	47 484	39 150	41 570	43 131
31	Sputumuntersuchungen	2 538	1 837	1 783	2 058	2 173	1 887	1 582	1 896
32	Blutsenkungsproben	5 515	4 661	4 141	4 476	5 209	4 380	3 673	3 983

1) 1966: Erstmals bekannt gewordene Tuberkulose und Zuzüge aus Kreisen außerhalb Baden-Württembergs.

der Tuberkulosefürsorgestellen nach Vierteljahren

1966

Regierungsbezirk																Lfd. Nr.
Nordwürttemberg				Nordbaden				Südbaden				Südwestfalen-Lippe				
1.Vj.	2.Vj.	3.Vj.	4.Vj.	1.Vj.	2.Vj.	3.Vj.	4.Vj.	1.Vj.	2.Vj.	3.Vj.	4.Vj.	1.Vj.	2.Vj.	3.Vj.	4.Vj.	
9 439	9 435	9 453	9 067	5 453	5 414	5 488	5 344	6 894	6 878	6 788	6 723	4 445	4 499	4 459	4 162	1
28,4	28,3	28,3	27,2	29,7	29,4	29,7	28,9	38,6	38,3	37,6	37,3	28,8	29,0	28,6	26,7	2
946	943	960	910	676	702	744	709	1 015	1 015	972	946	503	539	528	500	3
5 782	5 787	5 785	5 590	3 273	3 249	3 267	3 229	3 876	3 871	3 843	3 839	2 633	2 671	2 659	2 482	4
2 711	2 705	2 708	2 567	1 504	1 463	1 477	1 406	2 003	1 992	1 973	1 938	1 309	1 289	1 272	1 180	5
2 949	2 910	2 921	2 787	1 787	1 773	1 787	1 761	1 963	1 969	1 964	1 907	1 247	1 295	1 308	1 191	6
8,9	8,7	8,7	8,4	9,7	9,6	9,7	9,5	11,0	11,0	10,9	10,6	8,1	8,3	8,4	7,7	7
38	39	45	36	20	20	23	23	33	32	30	26	8	10	10	8	8
2 227	2 167	2 172	2 083	1 372	1 354	1 364	1 358	1 442	1 445	1 443	1 424	969	1 014	1 026	930	9
684	704	704	668	395	399	400	380	488	492	491	457	270	271	272	253	10
48 626	48 229	47 966	48 021	39 416	39 311	39 115	38 726	21 266	21 360	21 426	21 366	19 632	19 512	19 494	19 440	11
1 231	1 188	1 065	1 442	898	858	880	959	907	788	800	811	576	532	437	606	12
15,1	14,3	12,7	17,1	19,9	18,7	18,9	20,6	20,7	17,6	17,6	17,8	15,2	13,8	11,2	15,4	13
114	130	104	174	121	149	139	153	155	119	111	91	73	72	45	79	14
785	712	673	844	564	513	503	550	509	453	465	474	345	334	270	374	15
332	346	288	424	213	196	238	256	243	216	224	246	158	126	122	153	16
381	345	330	415	296	253	265	277	241	241	246	211	166	184	134	145	17
4,7	4,2	3,9	4,9	6,6	5,5	5,7	5,9	5,5	5,4	5,4	4,6	4,4	4,8	3,4	3,7	18
187	171	148	199	98	101	90	92	100	96	99	82	79	99	69	62	19
448	427	398	469	265	292	314	305	396	321	285	312	239	214	171	199	20
1 902	1 926	1 921	1 821	928	914	938	924	1 064	1 076	1 062	1 059	859	879	902	862	21
5,7	5,8	5,8	5,5	5,1	5,0	5,1	5,0	6,0	6,0	5,9	5,9	5,6	5,7	5,8	5,5	22
178	177	140	170	99	92	90	100	105	89	91	99	88	83	78	93	23
2,2	2,1	1,7	2,0	2,2	2,0	1,9	2,1	2,4	2,0	2,0	2,2	2,3	2,2	2,0	2,4	24
134	133	111	125	76	74	72	55	85	75	77	78	71	68	68	58	25
94 986	93 877	93 240	91 540	75 804	75 796	75 842	75 070	48 485	48 163	48 559	48 357	38 389	38 490	38 435	37 852	26
286,2	281,9	279,2	175,0	413,0	411,1	410,2	406,4	271,7	268,0	269,3	268,4	248,8	247,9	246,9	243,3	27
19 160	14 897	13 725	15 415	12 151	10 103	8 955	9 698	10 618	8 812	8 171	8 748	8 662	7 614	6 557	7 892	28
6 223	4 951	4 779	5 293	2 441	2 767	2 439	3 071	2 876	2 387	2 404	2 547	1 718	1 504	1 402	1 269	29
18 738	17 545	19 332	18 480	12 120	7 905	8 090	9 446	9 948	8 787	8 655	9 866	6 678	4 913	5 493	5 339	30
1 425	1 190	1 061	1 273	388	494	408	469	21	24	8	7	339	179	105	147	31
2 161	1 830	1 496	1 475	661	792	594	749	691	597	585	510	1 696	1 161	998	1 249	32

Tuberkuloseerkrankungen und Maßnahmen der Tuberkulosefürsorgestellen

Bezeichnung	Baden-Württemberg			Regierungsbezirk							
				Nordwürttemberg		Nordbaden		Südbaden		Südwestfalen-Lippe	
	Jahr			Jahr		Jahr		Jahr		Jahr	
	1964	1965	1966	1965	1966	1965	1966	1965	1966	1965	1966
Lungentuberkulose											
a) Bestand (am Ende des Jahres)											
Aktive Fälle:	27 558	26 894	25 296	9 596	9 067	5 768	5 344	7 013	6 723	4 517	4 162
Auf 10 000 der Bevölkerung	33,4	31,9	29,6	29,1	27,2	31,6	28,9	39,5	37,3	29,5	26,7
Kinder unter 15 Jahren	3 242	3 226	3 065	977	910	744	709	999	946	506	500
Männer 15 Jahre und älter	16 287	15 832	15 140	5 834	5 590	3 417	3 229	3 918	3 839	2 663	2 482
Frauen 15 Jahre und älter	8 029	7 836	7 091	2 785	2 567	1 607	1 406	2 096	1 938	1 348	1 180
Von den aktiven Fällen waren											
offene Fälle:	8 612	8 030	7 646	2 969	2 787	1 816	1 761	1 999	1 907	1 246	1 191
Auf 10 000 der Bevölkerung	10,4	9,5	9,0	9,0	8,4	9,9	9,5	11,3	10,6	8,1	7,7
Kinder unter 15 Jahren	93	109	93	41	36	25	23	31	26	12	8
Männer 15 Jahre und älter	6 471	6 084	5 795	2 262	2 083	1 393	1 358	1 475	1 424	954	930
Frauen 15 Jahre und älter	2 048	1 837	1 758	666	668	398	380	493	457	280	253
Inaktive Fälle	126 656	129 234	127 553	48 863	48 021	39 620	38 726	21 314	21 366	19 437	19 440
b) Zugänge (Neuzugänge und Zugänge aus anderen Gruppen)											
Aktive Fälle:	14 698	14 868	13 978	5 337	4 926	3 796	3 595	3 482	3 306	2 253	2 151
Auf 10 000 der Bevölkerung	17,9	17,8	16,4	16,3	14,8	20,9	19,5	19,8	18,4	14,8	13,9
Kinder unter 15 Jahren	1 782	1 941	1 829	574	522	589	562	529	476	249	269
Männer 15 Jahre und älter	8 759	8 786	8 368	3 303	3 014	2 231	2 130	1 935	1 901	1 317	1 323
Frauen 15 Jahre und älter	4 157	4 141	3 781	1 460	1 390	976	903	1 018	929	687	559
Von den aktiven Fällen waren											
offene Fälle:	4 436	4 223	4 130	1 565	1 471	1 059	1 091	1 004	939	595	629
Auf 10 000 der Bevölkerung	5,4	5,1	4,9	4,8	4,4	5,8	5,9	5,7	5,2	3,9	4,1
Von den aktiven Fällen waren Neuzugänge 1)											
Offene Fälle	1 949	1 965	1 772	819	705	368	381	456	377	322	309
Geschlossene Fälle	5 223	5 707	5 055	1 882	1 742	1 311	1 176	1 408	1 314	1 106	823
Sonstige aktive Fälle von Tbc (Knochen und Gelenke, periphere Lymphknoten, Haut, Hirnhaut, Urogenitalorgane, sonstige Organe)											
a) Bestand (am Ende des Jahres)	5 012	4 801	4 666	1 905	1 821	967	924	1 073	1 059	856	862
Auf 10 000 der Bevölkerung	6,1	5,7	5,5	5,8	5,5	5,3	5,0	6,0	5,9	5,6	5,5
b) Zugänge (Neuzugänge und Zugänge aus anderen Gruppen)	1 897	1 826	1 772	737	665	353	381	391	384	345	342
Auf 10 000 der Bevölkerung	2,3	2,2	2,1	2,3	2,0	1,9	2,1	2,2	2,1	2,3	2,2
Darunter Neuzugänge	1 471	1 419	1 360	550	503	278	277	317	315	274	265
Tuberkulose-Erfassungszahlen											
Fürsorge- und Überwachungsfälle	255 667	260 336	252 819	96 504	91 540	76 662	75 070	49 071	48 357	38 099	37 852
Auf 10 000 der Bevölkerung	309,6	309,0	296,2	292,9	275,0	419,9	406,4	276,6	268,4	248,7	243,3
Leistungen und Maßnahmen der Tuberkulose-Fürsorgestellen											
Röntgendurchleuchtungen	200 776	191 446	171 178	70 390	63 197	44 026	40 907	44 808	36 349	32 222	30 725
Großaufnahmen	54 339	56 203	48 071	26 498	21 246	11 999	10 718	11 175	10 214	6 531	5 893
Schirmbildaufnahmen	150 833	169 516	171 335	62 680	74 095	48 016	37 561	37 300	37 256	21 520	22 423
Sputumuntersuchungen	8 976	8 216	7 538	5 070	4 949	2 215	1 759	189	60	742	770
Blutsenkungen	19 338	18 793	17 245	8 350	6 962	2 862	2 796	2 707	2 383	4 874	5 104

1) 1966: Erstmals bekannt gewordene Tuberkulose und Zuzüge aus Kreisen außerhalb Baden-Württembergs.