



Statistische Berichte Baden-Württemberg



Artikel-Nr. 3392 00001

Agrarwirtschaft 19/00

C II 4 - m 5/00 (Erscheint nur für Mai bis Oktober) Einzelpreis DM 2,40

30.06.2000

Wachstumstand der Reben in Baden-Württemberg Ende Mai 2000

1. Wachstumstand der Reben in Baden-Württemberg 1996 bis 2000

Weinbaubereich Anbaugebiet Land	Begutachtungsziffern 1) Ende Mai				
	2000	dagegen			
		1999	1998	1997	1996
Remstal-Stuttgart	2,0	2,3	2,2	3,2	3,0
Württembergisch Unterland	1,8	2,1	2,0	2,8	2,7
Kocher-Jagst-Tauber	1,9	2,1	2,2	3,4	3,0
Württemberg 2)	1,8	2,1	2,0	2,9	2,8
Badische Bergstraße	1,8	2,3	2,3	.	.
Kraichgau	1,9	2,3	2,2	.	.
Tauberfranken	1,9	2,1	2,0	3,4	2,9
Bodensee	1,6	2,1	2,0	2,6	2,4
Markgräflerland	2,1	2,4	2,2	3,2	2,8
Kaiserstuhl	2,0	2,4	2,0	3,2	2,9
Tuniberg	2,0	2,1	2,0	2,6	3,1
Breisgau	2,2	2,6	2,3	2,7	3,1
Ortenau	1,9	2,2	2,0	2,6	2,6
Baden	2,0	2,3	2,1	2,9	2,8
Baden-Württemberg	1,9	2,2	2,1	2,9	2,8

1) Noten: 1,0 = sehr gut - weit besser als normal, 2,0 = gut - besser als normal, 3,0 = mittel - normal, 4,0 = gering - schlechter als normal, 5,0 = sehr gering - weit schlechter als normal. - 2) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar".

2. Witterung der letzten vier Wochen und Winterfeuchtigkeit in Baden-Württemberg 2000

Von den Berichterstattern beurteilten ... % die (den)

Winterfeuchtigkeit als			Niederschläge als			Temperaturverlauf als		
zu gering	ausreichend	zu hoch	zu gering	ausreichend	zu hoch	ungünstig	normal	günstig

Württemberg

2 95 3 28 72 0 0 10 90

Baden

4 94 2 23 76 1 1 14 85

Baden-Württemberg

3 94 3 26 73 1 1 12 87

Zeichenerklärung
 - = Nichts vorhanden.
 . = Kein Nachweis vorhanden.
 / = Keine Angaben, da Zahlenwert nicht sicher genug.
 0 = Mehr als Nichts, aber weniger als die Hälfte der kleinsten Einheit.

Herausgeber und Vertrieb: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Böblinger Str. 68, 70199 Stuttgart, Telefon (0711) 6 41-28 66, Fax (0711) 6 41-21 30, E-Mail: poststelle@stala.bwl.de, Internet: <http://www.statistik.baden-wuerttemberg.de>

Nachdruck mit Quellenangabe gestattet.

3. Schäden durch Winterfröste an Holz, Holzreife und Austrieb der Reben in Baden-Württemberg 2000

Weinbaubereich Anbaugebiet Land	Schäden durch Winterfröste an Holz und Knospen in % der Ertragsreblfläche				Die Holzreife bezeichneten ... % der Berichterstatter als		
	keine	schwache	mittlere	starke	schlecht	mittel	gut
Remstal-Stuttgart	100	0	-	-	-	6	94
Württembergisch Unterland	100	0	-	-	-	6	94
Kocher-Jagst-Tauber	98	2	-	-	-	15	85
Württemberg 1)	100	0	-	-	-	7	93
Badische Bergstraße	100	0	-	-	-	-	100
Kraichgau	100	0	-	-	-	9	91
Tauberfranken	100	-	-	-	4	-	96
Bodensee	100	-	-	-	-	6	94
Markgräflerland	99	1	-	-	-	27	73
Kaiserstuhl	100	-	-	-	-	-	100
Tuniberg	100	-	-	-	-	-	100
Breisgau	99	1	-	-	-	25	75
Ortenau	100	0	-	-	-	11	89
Baden	100	0	-	-	0	13	87
Baden-Württemberg	100	0	-	-	0	10	90

1) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar".

4. Schäden durch Frühjahrsfröste an Laub und Trieben in Baden-Württemberg 2000

Weinbaubereich Anbaugebiet Land	Schäden durch Frühjahrsfröste an Laub und Trieben in % der Ertragsreblfläche				Den Austrieb der Reben bezeichneten ... % der Berichterstatter als		
	keine	schwache	mittlere	starke	schlecht	mittel	gut
Remstal-Stuttgart	100	-	-	-	-	6	94
Württembergisch Unterland	100	-	-	-	-	7	93
Kocher-Jagst-Tauber	100	-	-	-	8	8	84
Württemberg 1)	100	-	-	-	1	7	92
Badische Bergstraße	100	-	-	-	-	7	93
Kraichgau	100	-	-	-	-	7	93
Tauberfranken	100	-	-	-	-	4	96
Bodensee	100	-	-	-	-	-	100
Markgräflerland	100	0	-	-	-	8	92
Kaiserstuhl	100	-	-	-	-	-	100
Tuniberg	100	-	-	-	-	-	100
Breisgau	100	-	-	-	-	3	97
Ortenau	100	0	-	-	-	8	92
Baden	100	0	-	-	-	5	95
Baden-Württemberg	100	0	-	-	0	6	94

1) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar".