

Statistische Berichte Baden-Württemberg

Artikel-Nr. 3392 98003

Agrarwirtschaft 30/98

C II 4 - m 7/98

(Erscheint nur für Mai bis Oktober)

Einzelpreis DM 2,40

20.08.1998

Wachstumstand der Reben in Baden-Württemberg Ende Juli 1998

1. Wachstunstand der Reben in Baden-Württerberg 1994 bis 1998

	Begutachtungsziffern 1) Ende des Monats										
Ueinbaubereich	1998		dagagen								
Anbaugebiet Land			1997		1996		1995		1994		
	Juni	Juli	Juni	Juli	Juni	Juli	Juni	Juli	Juni	Jul	
Remstal-Stuttgart Württembergisch Unterland Kocher-Jagst-Tauber	2,2 2,2 2,3	2,1 2,1 2,2	3,1 3,1 3,3	2,9 2,7 3,0	2,7 2,8 2,8	2,6 2,6 2,8	2,7 2,5 3,2	2,3 2,4 2,9	2,2 1,9 2,1	1,8 1.8 2.0	
Uürttemberg 2)	2,2	2,1	3,1	2,7	2,8	2,6	2,6	2,4	2,0	1,8	
Badische Bergstraße 3) Kraichgau 3) Tauberfranken Bodensee Markgräflerland Kaiserstuhl Tuniberg Breisgau Ortenau	2,3 2,2 2,1 2,1 2,3 2,1 2,3 2,2 2,1	2,4 2,2 2,3 2,1 2,2 2,1 2,1 2,3 2,2	2,7 3.3 3.0 3.0 2,7 3.0 3.0	2,7 3,5 2,9 2,7 2,6 2,8	2.7 2.8 2.5 2.5 2.5 2.7 2.6	2,7 3.0 2,2 2,5 2,5 2,4 2,7 2,3	2.4 2,9 2.7 2.7 2.9 2.6 2.8 2.5	2,4 2,5 2,3 2,4 2,4 2,3 2,6 2,3	2,3 2,2 2,3 2,3 2,1 2,3 2,5	2,2 2,0 1,9 2,1 1,9 2,4 2,0	
Baden	2,2	2,2	2,9	2,8	2,6	2,5	2,7	2,4	2,2	2,1	
Baden-Württemberg	2,2	2,2	3,0	2,8	2,7	2,5	2,7	2,4	2,1	2,0	

¹⁾ Noten: 1.0 = sehr gut - weit besser als normal, 2.0 = gut - besser als normal, 3.0 = mittel - normal, 4.0 = gering - schlechter als normal, 5.0 = sehr gering - weit schlechter als normal. - 2) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Necker". - 3) Bis 1997: Badische Bergstraße und Kraichgau ein gemeinsamer Bereich

2. Vitterung der letzten drei Vochen in Baden-Vürtterberg 1999

			Von den 8	Berichters	tattern beu	rteilten	. % die (de	n)		,	
Niederschläge als			Temperaturverlauf als			Sonne	nscheindaue	r als	Gesamtbeurteilung der Uitterung		
zu gering	aus- reichend	zu hoch	un- günstig	normal	günstig	zu gering	genügend	reichlich	als schlecht	als mittel	als gut
					Württ	emberg					
66	33	1	. 5	52	43	14	69	17	0	40	60
49	51		4	66	8a	den 9	- 54	37	2	46	52
59					Baden-Wü	rttemberg					

Nichts vorhanden.

Kein Nachweis vorhanden.
 Keine Angaben, da Zahlenwert nicht sicher genug.
 Mehr als Nichts, aber weniger als die Hälfte der kleinsten Einheit.

Rebsorten	Schäden in % der Ertragsrebfläche 1)								
vanzon fan	keine	schwache	mittlere	starke					
		Württemberg 2)							
Ueißweinsorten:									
Müller-Thurgau Riesling	76 66	16 25	6 8	2 1					
Silvaner Gutedel	77 100	22	1	0					
Rutänder	88	7	5 7	-					
Weißer Burgunder Kerner	86 80	7 16	7 3	ī					
Gewürztraminer	68	32	ŏ	-					
Rotweinsorten:									
Blauer Trollinger	81	16	3	0					
Blauer Spätburgunder Portugieser	84 94	14 6	2 0	-					
Lemberger Schwarzriesling	63 85	26 13	10	1					
Schwal Zries (Ing	1 99	13	2	-					
		Baden							
Ueißweinsorten:									
Müller-Thurgau	82	16	2	-					
Riesling Silvaner	67 94	24 5	8 1	1					
Gutedel Ruländer	40	23	34	0 3 0 0					
Veißer Burgunder	83 86	15 12	2 2	0					
Auxerrois Kerner	86 90	11 8	3 2	-					
Gewürztraminer	78	17	4	1					
Rotweinsorten:									
Blauer Trollinger	50	50	0	0					
Blauer Spätburgunder Portugieser	95 94	13 6	2 0	-					
Lembergar Schwarzriesling	62 69	19 22	13 8	6 1					
Jenna 21 103 (Ing			6	ı					
		Baden-Württemberg							
Ueißweinsorten:									
Müller-Thurgau Riesling	81 66	16	3	0					
Silvaner	87	25 12	8 1	1 0					
Gutedel Ruländer	40 83	23 15	34 2 2 3 2 4	0 3 0 0					
Veißer Burgunder	86	12	2	ů					
Auxerrois	86 82	11 15	3 2	ī					
Kerner	75	20	4	i					
kerner Gewürztraminer									
	,								
Gewürztraminer Rotweinsorten: Blauer Trollinger	81	16 12	3	0					
Gewürztraminer Rotweinsorten:	81 85 94 63	16 13 6 26	3 2 0 10	0 - - 1					

Schwache = Schäden von 10 bis unter 25 % der Blüten, mittlere = Schäden von 25 bis unter 50 % der Blüten, starke = Schäden von 50 % der Blüten und darüber.
 Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Necker".