



Statistische Berichte Baden-Württemberg

Artikel-Nr. 3392 95001

Agrarwirtschaft 28/95

C II 4 - m 5/95 (Erscheint nur für Mai bis Oktober) Einzelpreis DM 2,40

30.06.1995



Wachstumstand der Reben in Baden-Württemberg Ende Mai 1995

1. Wachstumstand der Reben in Baden-Württemberg 1991 bis 1995

Weinbaubereich Anbaugebiet Land	Begutachtungsziffern 1) Ende Mai				
	1995	dagegen			
		1994	1993	1992	1991
Remstal-Stuttgart	2,3	2,3	2,2	2,3	4,2
Württembergisch Unterland	2,3	2,0	1,9	2,1	4,1
Kocher-Jagst-Tauber	3,0	2,1	2,4	2,1	4,1
Württemberg 2)	2,3	2,1	2,0	2,1	4,1
Badische Bergstraße/Kraichgau	2,6	2,4	2,2	2,7	4,1
Tauberfranken	3,0	2,2	2,3	2,6	3,8
Bodensee	2,4	2,4	2,0	2,3	2,7
Markgräflerland	2,5	2,4	2,4	2,3	3,5
Kaiserstuhl 3)	2,7	2,2	2,1	2,2	3,4
Tuniberg 3)	2,5	2,4	2,0	2,2	4,0
Breisgau	2,7	2,6	2,2	2,1	3,9
Ortenau	2,3	2,2	2,1	2,1	3,5
Baden	2,6	2,3	2,2	2,3	3,6
Baden-Württemberg	2,5	2,2	2,1	2,2	3,8

1) Noten: 1,0 = sehr gut - weit besser als normal, 2,0 = gut - besser als normal, 3,0 = mittel - normal, 4,0 = gering - schlechter als normal, 5,0 = sehr gering - weit schlechter als normal. - 2) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar". - 3) Bis 1990: Kaiserstuhl und Tuniberg ein gemeinsamer Bereich.

2. Witterung der letzten vier Wochen und Winterfeuchtigkeit in Baden-Württemberg 1995

Von den Berichterstattern beurteilten ... % die (den)

Winterfeuchtigkeit			Niederschläge			Temperaturverlauf		
zu gering	ausreichend	zu hoch	zu gering	ausreichend	zu hoch	ungünstig	normal	günstig

Württemberg

2 98 - 2 92 6 18 66 16

Baden

- 98 2 1 91 8 24 70 6

Baden-Württemberg

1 98 1 1 92 7 21 68 11

3. Schäden durch Winterfröste am Holz, Holzreife und Austrieb der Reben in Baden-Württemberg 1995

Weinbaubereich Anbaugebiet Land	Schäden durch Winterfröste an Holz und Knospen in % der Ertragsreblfläche				Die Holzreife bezeichneten ... % der Berichterstatter als		
	keine	schwache	mittlere	starke	schlecht	mittel	gut
Remstal-Stuttgart	100	0	-	-	-	23	77
Württembergisch Unterland	100	0	-	-	-	15	85
Kocher-Jagst-Tauber	100	0	-	-	-	36	64
Württemberg 1)	100	0	-	-	-	19	81
Badische Bergstraße/Kraichgau	100	0	-	-	-	28	72
Tauberfranken	98	-	2	-	-	-	-
Bodensee	100	0	-	-	-	27	73
Markgräflerland	100	0	0	-	-	32	68
Kaiserstuhl 2)	100	-	-	-	-	24	76
Tuniberg 2)	100	-	-	-	-	38	62
Breisgau	100	-	-	-	3	39	58
Ortenau	100	0	-	-	-	-	-
Baden	100	0	0	-	0	30	70
Baden-Württemberg	100	0	0	-	0	25	75

1) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar". - 2) Bis 1990: Kaiserstuhl und Tuniberg ein gemeinsamer Bereich.

4. Schäden durch Frühjahrsfröste an Laub und Trieben in Baden-Württemberg 1995

Weinbaubereich Anbaugebiet Land	Schäden durch Frühjahrsfröste an Laub und Trieben in % der Ertragsreblfläche				Den Austrieb der Reben bezeichneten ... % der Berichterstatter als		
	keine	schwache	mittlere	starke	schlecht	mittel	gut
Remstal-Stuttgart	100	0	0	0	-	12	88
Württembergisch Unterland	98	1	1	0	-	15	85
Kocher-Jagst-Tauber	64	16	13	7	-	36	64
Württemberg 1)	96	2	1	1	-	17	83
Badische Bergstraße/Kraichgau	99	1	-	-	3	38	59
Tauberfranken	54	8	20	18	-	32	68
Bodensee	83	4	2	11	-	13	87
Markgräflerland	92	5	2	1	-	24	76
Kaiserstuhl 2)	90	8	1	1	-	24	76
Tuniberg 2)	73	11	12	4	-	62	38
Breisgau	77	11	8	4	-	36	64
Ortenau	100	0	0	0	-	33	67
Baden	88	6	4	2	1	31	68
Baden-Württemberg	92	4	2	2	0	25	75

1) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar". - 2) Bis 1990: Kaiserstuhl und Tuniberg ein gemeinsamer Bereich.