

STATISTISCHE BERICHTE

Artikel-Nr. 3392 84001

Agrarwirtschaft 28/84

C II 4 - m 6/84 (Erscheint nur für Juni bis November)

26.6.84

Wachstumstand der Reben Anfang Juni 1984

1. Wachstumstand der Reben

Weinbaubereich Anbaugebiet	Anfang Juni 1984	Weinbaubereich Anbaugebiet Land	Anfang Juni 1984
	Begutachtungsziffer ¹⁾		Begutachtungsziffer ¹⁾
Remstal-Stuttgart	2,6	Kaiserstuhl-Tuniberg	2,8
Württembergisch Unterland	2,5	Breisgau	2,5
Kocher-Jagst-Tauber	2,9	Ortenau	2,4
Württemberg	2,6	Baden	2,5
dagegen 1983	2,4	dagegen 1983	2,8
1982	2,1	1982	2,3
1981	3,8	1981	2,9
1980	1,8	1980	1,9
Badische Bergstraße/Kraichgau	2,7	Baden-Württemberg	2,5
Badisches Frankenland	2,9	dagegen 1983	2,6
Bodensee	2,4	1982	2,2
Markgräflerland	2,7	1981	3,2
		1980	1,9

1) Noten: 1,0 = sehr gut = mehr als 3/4 Herbst, 2,0 = gut = mehr als 1/2 bis 3/4 Herbst, 3,0 = mittel = 1/2 Herbst, 4,0 = gering = 1/4 bis 1/2 Herbst, 5,0 = sehr gering = weniger als 1/4 Herbst.

2. Witterung der letzten vier Wochen und Winterfeuchtigkeit

Von den Berichterstattern beurteilten % die (den)

Winterfeuchtigkeit			Niederschläge			Temperaturverlauf		
zu gering	ausreichend	zu hoch	zu gering	ausreichend	zu hoch	ungünstig	normal	günstig

Württemberg

12 88 - 6 91 3 32 61 7

Baden

24 76 - 20 77 3 37 59 4

Baden-Württemberg

18 82 - 14 83 3 35 60 5

HERAUSGEGEBEN VOM STATISTISCHEN LANDESAMT BADEN-WÜRTTEMBERG

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet

3. Schäden durch Winterfröste am Holz, Holzreife und Austrieb der Reben Anfang Juni 1964

Weinbaubereich Anbaugebiet Land	Schäden durch Winterfröste an Holz und Knospen in % der Ertragsreblfläche				Die Holzreife bezeichneten % der Berichterstatter als		
	keine	schwach	mittlere	starke	schlecht	mittel	gut
Remstal-Stuttgart	100	-	-	-	-	13	87
Württembergisch Unterland	99	1	0	-	-	16	84
Kocher-Jagst-Tauber	97	3	-	-	8	44	48
Württemberg	99	1	0	-	1	20	79
Badische Bergstraße/Kraichgau	100	0	0	-	1	39	60
Badisches Frankenland	96	3	1	-	4	46	50
Bodensee	100	-	-	-	-	36	64
Markgräflerland	98	2	-	-	-	41	59
Kaiserstuhl-Tuniberg	99	1	-	-	-	31	69
Breisgau	99	1	-	-	-	57	43
Ortenau	99	1	-	-	-	24	76
Baden	99	1	0	-	1	39	60
Baden-Württemberg	99	1	0	-	1	31	68

4. Schäden durch Frühjahrsfröste an Laub und Trieben

Weinbaubereich Anbaugebiet Land	Schäden durch Frühjahrsfröste an Laub und Trieben in % der Ertragsreblfläche				Den Austrieb der Reben bezeichneten % der Berichterstatter als		
	keine	schwache	mittlere	starke	schlecht	mittel	gut
Remstal-Stuttgart	92	5	2	1	2	32	66
Württembergisch Unterland	90	7	2	1	1	28	71
Kocher-Jagst-Tauber	67	29	4	-	4	64	32
Württemberg	89	8	2	1	2	34	64
Badische Bergstraße/Kraichgau	96	3	1	-	5	41	54
Badisches Frankenland	58	11	28	3	14	58	28
Bodensee	100	-	-	-	-	50	50
Markgräflerland	99	1	-	-	5	73	22
Kaiserstuhl-Tuniberg	100	-	-	-	7	45	48
Breisgau	97	3	-	-	-	57	43
Ortenau	99	1	-	-	-	33	67
Baden	97	2	1	0	5	51	44
Baden-Württemberg	94	4	1	1	3	44	53