

# STATISTISCHE BERICHTE

Artikel-Nr. 3392 87003

Agrarwirtschaft 40/87

C II 4 - m 8/87 (Erscheint nur für Juni bis November)

26.8.87

## Wachstumstand der Reben Anfang August 1987

### 1. Wachstumstand der Reben

Weinbaubereich Anbaugebiet	1987		Weinbaubereich Anbaugebiet Land	1987	
	Anfang Juli	Anfang August		Anfang Juli	Anfang August
	Begutachtungsziffern <sup>1)</sup>			Begutachtungsziffern <sup>1)</sup>	
Remstal-Stuttgart	3,1	3,1	Kaiserstuhl-Tuniberg	2,9	2,7
Württembergisch Unterland	3,1	3,0	Breisgau	3,1	2,9
Kocher-Jagst-Tauber	3,2	2,9	Ortenau	3,1	3,2
Württemberg <sup>2)</sup>	3,1	3,0	Baden	3,0	2,9
dagegen 1986	2,2	2,3	dagegen 1986	2,3	2,2
1985	4,2	3,8	1985	3,8	3,4
1984	3,0	2,8	1984	2,8	2,7
1983	2,3	2,1	1983	2,7	2,4
Badische Bergstraße/Kraichgau	2,9	2,8	Baden-Württemberg	3,0	2,9
Badisches Frankenland	3,0	2,9	dagegen 1986	2,3	2,2
Bodensee	4,1	3,5	1985	4,0	3,6
Markgräflerland	3,1	2,8	1984	2,9	2,7
			1983	2,5	2,3

1) Noten: 1,0 = sehr gut = mehr als 3/4 Herbst, 2,0 = gut = mehr als 1/2 bis 3/4 Herbst, 3,0 = mittel = 1/2 Herbst, 4,0 = gering = 1/4 bis 1/2 Herbst, 5,0 = sehr gering = weniger als 1/4 Herbst. - 2) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar".

### 2. Witterung der letzten drei Wochen

Von den Berichterstattern beurteilten ... % die (den)											
Niederschläge			Temperaturverlauf			Sonnenscheindauer			Gesamtbeurteilung der Witterung		
als zu gering	ausreichend	zu hoch	als ungünstig	normal	günstig	als zu gering	genügend	reichlich	als schlecht	mittel	gut
Württemberg											
-	71	29	23	50	27	32	52	16	7	64	29
Baden											
-	76	24	27	51	22	35	54	11	9	62	29
Baden-Württemberg											
-	74	26	25	51	24	34	53	13	8	63	29

HERAUSGEGEBEN VOM STATISTISCHEN LANDESAMT BADEN-WÜRTTEMBERG

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet

## 3. Verrieselungsschäden 1987

Rebsorten	keine	schwache	mittlere	starke
	Schäden in % der Ertragsrebläche!)			
Württemberg				
Weißeinsorten:				
Müller-Thurgau	67	24	8	1
Riesling	48	26	21	5
Silvaner	74	20	6	-
Gutedel	-	-	-	-
Ruländer	69	22	7	2
Weißer Burgunder	77	23	-	-
Kerner	77	18	5	-
Gewürztraminer	76	19	5	-
Rotweinsorten:				
Blauer Trollinger	77	20	3	-
Blauer Spätburgunder	73	22	5	-
Portugieser	68	25	6	1
Lemberger	32	17	26	25
Schwarzriesling	68	27	5	-
Baden				
Weißeinsorten:				
Müller-Thurgau	70	23	6	1
Riesling	60	21	17	2
Silvaner	83	16	1	-
Gutedel	70	23	7	-
Ruländer	73	21	5	1
Weißer Burgunder	77	18	5	-
Auxerrois	68	26	6	-
Gewürztraminer	61	26	11	2
Rotweinsorten:				
Blauer Trollinger	74	26	-	-
Blauer Spätburgunder	70	20	9	1
Portugieser	79	16	3	2
Lemberger	66	21	13	-
Schwarzriesling	86	13	1	-
Baden-Württemberg				
Weißeinsorten:				
Müller-Thurgau	70	23	6	1
Riesling	52	24	20	4
Silvaner	79	18	3	-
Gutedel	70	23	7	-
Ruländer	73	21	5	1
Weißer Burgunder	77	18	5	-
Auxerrois	68	26	6	-
Kerner	77	18	5	-
Gewürztraminer	61	26	11	2
Rotweinsorten:				
Blauer Trollinger	77	20	3	-
Blauer Spätburgunder	70	20	9	1
Portugieser	69	24	6	1
Lemberger	32	17	26	25
Schwarzriesling	69	26	5	-

1) Schwache = Schäden von 10 bis unter 25 % der Blüten, mittlere = Schäden von 25 bis unter 50 % der Blüten, starke = Schäden von 50 % und darüber der Blüten.