

STATISTISCHE BERICHTE



Artikel-Nr. 3392 89001

Agrarwirtschaft 26/28

C II 4 - m 6/89 (Erscheint nur für Juni bis November)

30.6.89

Wachstumstand der Reben Anfang Juni 1989

1. Wachstumstand der Reben 1985 bis 1989

Anbaugebiet Weinbaubereich Land	Begutachtungsziffern ¹⁾ Anfang Juni				
	1989	dagegen			
		1988	1987	1986	1985
Württemberg ²⁾	2,1	2,1	3,2	2,5	4,3
Pemstal-Stuttgart	2,3	2,4	3,5	2,6	3,9
Württembergisch Unterland	2,0	2,1	3,2	2,4	4,4
Kocher-Jagst-Tauber	2,0	2,1	3,0	2,8	4,9
Baden	2,3	2,3	3,1	2,8	3,9
Badische Bergstraße/Kraichgau	2,4	2,5	3,0	2,5	4,1
Badisches Frankenland	2,4	2,5	2,8	2,9	4,9
Bodensee	2,5	2,2	4,2	2,5	4,4
Markgräflerland	2,2	2,6	3,2	2,9	3,9
Kaiserstuhl-Tuniberg	2,4	2,3	3,0	3,0	3,8
Breisgau	2,2	2,3	3,2	2,8	3,7
Ortenau	2,2	2,0	3,0	2,5	3,9
Baden-Württemberg	2,2	2,2	3,1	2,7	4,1

1) Noten: 1,0 = sehr gut = mehr als 3/4 Herbst, 2,0 = gut = mehr als 1/2 bis 4/4 Herbst, 3,0 = mittel = 1/2 Herbst, 4,0 = gering = 1/2 bis 1/2 Herbst, 5,0 = sehr gering = weniger als 1/4 Herbst. - 2) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar".

2. Witterung der letzten vier Wochen und Winterfeuchtigkeit Anfang Juni 1989

Von den Berichterstellern beurteilten ... % die (den)

Winterfeuchtigkeit			Niederschläge			Temperaturverlauf		
zu gering	ausreichend	zu hoch	zu gering	ausreichend	zu hoch	ungünstig	normal	günstig
Württemberg								
24	76	0	14	85	1	1	28	71
Baden								
29	71	0	10	89	1	4	46	50
Baden-Württemberg								
27	73	0	11	88	1	2	38	60

HERAUSGEGEBEN VOM STATISTISCHEN LANDESAMT BADEN-WÜRTTEMBERG

Postfach 10 60 33 · 7000 Stuttgart 10 · Telefon (0711) 6465-1 · Telex 722 815 stala d

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet

3. Schäden durch Winterfröste am Holz, Holzreife und Austrieb der Reben Anfang Juni 1989

Weinbaubereich Anbaugebiet Land	Schäden durch Winterfröste an Holz und Knospen in % der Ertragsrebläche				Die Holzreife bezeichneten % der Berichterstatter als		
	keine	schwache	mittlere	starke	schlecht	mittel	gut
Remstal-Stuttgart	99	1	0	-	-	25	75
Württembergisch Unterland	100	0	-	-	-	9	91
Kocher-Jagst-Tauber	99	1	-	-	-	17	83
Württemberg ¹⁾	99	1	-	-	-	14	86
Badische Bergstraße/Kraichgau	100	0	-	-	-	11	89
Badisches Frankenland	100	0	-	-	-	17	83
Bodensee	100	-	-	-	-	25	75
Markgräflerland	100	0	-	-	-	20	80
Kaiserstuhl-Tuniberg	100	-	-	-	-	28	72
Breisgau	100	0	-	-	-	42	58
Ortenau	99	1	-	-	-	37	63
Baden	100	0	-	-	-	24	76
Baden-Württemberg	99	1	0	-	-	19	81

1) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar".

4. Schäden durch Frühjahrsfröste an Laub und Trieben Anfang Juni 1989

Weinbaubereich Anbaugebiet Land	Schäden durch Frühjahrsfröste an Laub und Trieben in % der Ertragsrebläche				Den Austrieb der Reben bezeichneten % der Berichterstatter als		
	keine	schwache	mittlere	starke	schlecht	mittel	gut
Remstal-Stuttgart	97	3	-	-	-	20	80
Württembergisch Unterland	100	0	-	-	-	5	95
Kocher-Jagst-Tauber	99	1	-	-	-	13	87
Württemberg ¹⁾	99	1	-	-	-	9	91
Badische Bergstraße/Kraichgau	99	1	-	-	-	19	81
Badisches Frankenland	97	3	-	-	-	7	93
Bodensee	100	-	-	-	-	-	100
Markgräflerland	99	1	-	-	-	22	78
Kaiserstuhl-Tuniberg	100	-	-	-	-	17	83
Breisgau	100	0	-	-	3	40	57
Ortenau	100	0	-	-	-	19	81
Baden	99	1	-	-	0	20	80
Baden-Württemberg	99	1	-	-	0	15	85

1) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar".