

STATISTISCHE BERICHTE

C II 4

Agrardienst 27

28/6/71

Wachstumstand der Reben Anfang Juni 1971

Die Reben sind im allgemeinen recht gut über den Winter gekommen: im Landesdurchschnitt erlitten nur 3% der Bestände mittlere bis starke und 11% schwache Frostschäden an Holz und Knospen. Gebietsweise schlugen die Winterfröste gleichwohl empfindlich zu Buch, so im Tauber- und Maintal, im Oberen Neckartal sowie in der Ortenau und Bühlergegend; dabei erwies sich die Sorte Müller-Thurgau als besonders frostanfällig. Die wenigen Frühjahrsfröste um den 27. bis 29. April führten in 6% der Rebbestände zu schwachen, in weiteren 6% zu mittleren und starken Schäden an Laub und Trieben, und zwar hauptsächlich im Tauber- und Maintal, Neckar-, Kocher- und Jagsttal sowie im Zabergäu.

Der Austrieb war bei deutlichen regionalen Unterschieden zunächst recht ungleich, was auf Winterfröste, mangelnde Holzreife bzw. darauf zurückgeführt wird, daß die Rekordernte des Vorjahres die Rebstöcke überaus stark beansprucht hatte. Immerhin wurde im Landesmittel die Holzreife von 68%, der Austrieb von 53% der Sachverständigen als "gut" bezeichnet. Offenbar hat die sehr warme Witterung gegen Ende des Berichtszeitraums viel gut gemacht (Austrieb der sogenannten Beiaugen). Fast drei Viertel der Berichterstatter bezeichneten den Temperaturverlauf im Berichtsmonat als günstig. Besondere Wetterschäden, Krankheiten und Schädlinge traten nicht in nennenswertem Umfang auf. Allerdings wiegt der Mangel an Niederschlägen im Berichtsmonat in 73% der Berichtsbezirke umso stärker, als zwei Drittel der Bestände auch zu wenig Winterfeuchtigkeit aufwiesen. Die Gewitterregen Ende Mai/Anfang Juni dürften aber das Wasserdefizit inzwischen ziemlich ausgeglichen haben.

Im ganzen wurde der Wachstumstand der Reben Anfang Juni gleichwohl etwas besser als "gut bis mittel" (Begutachtungsziffer 2, 3) und damit genauso wie zur gleichen Zeit des Vorjahres und des Jahres 1969 beurteilt. Die Voraussetzungen für einen befriedigenden bis guten Weinherbst sind somit durchaus gegeben. Zwischen den einzelnen Anbaugebieten bestehen allerdings deutliche Unterschiede in der Beurteilung des Wachstumstands.

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet.

Schäden durch Winterfröste, Holzreife und Austrieb der Reben Anfang Juni 1971

Kreis Regierungsbezirk Land	Schäden durch Winterfröste an Holz und Knospen in % der Ertragsreifebläche				Die Holzreife			Den Austrieb der Reben		
					bezeichneten.....% der Berichterstatter als					
	keine	schwache	mittlere	starke	schlecht	mittel	gut	schlecht	mittel	gut
Stadtkreise										
Stuttgart	95	5	-	-	-	-	100	-	27	73
Heilbronn	80	15	5	-	-	75	25	-	50	50
Ulm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Landkreise										
Aalen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Backnang	97	3	-	-	-	50	50	-	33	67
Böblingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crailsheim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Esslingen	100	-	-	-	-	50	50	-	50	50
Göppingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Heidenheim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Heilbronn	85	10	3	2	-	22	78	3	40	57
Künzelsau	70	19	9	2	-	89	11	-	78	22
Leonberg	90	10	-	-	-	-	100	-	-	100
Ludwigsburg	82	11	5	2	3	27	70	-	45	55
Mergentheim	82	7	10	1	-	17	83	-	17	83
Nürtingen	54	35	8	3	-	29	71	-	43	57
Öhringen	83	13	2	2	-	58	42	-	53	47
Schwäbisch Gmünd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schwäbisch Hall	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ulm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vaihingen	86	9	4	1	-	27	73	-	41	59
Waiblingen	99	1	0	0	-	20	80	-	20	80
Nordwürttemberg	86	10	3	1	0	30	70	1	40	59
Stadtkreise										
Karlsruhe	90	10	-	-	-	-	100	-	-	100
Heidelberg	80	20	-	-	-	-	100	-	100	-
Mannheim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pforzheim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Landkreise										
Bruchsal	97	2	1	-	-	11	89	-	33	67
Buchen	93	7	-	-	-	50	50	-	50	50
Heidelberg	91	8	1	-	-	43	57	-	43	57
Karlsruhe	89	9	2	-	-	67	33	-	56	44
Mannheim	98	2	-	-	-	37	63	-	62	38
Mosbach	95	5	-	-	-	29	71	-	86	14
Pforzheim	98	2	-	-	-	17	83	-	67	33
Sinsheim	91	6	3	-	-	24	76	-	24	76
Tauberbischofsheim	75	10	13	2	-	39	61	-	70	30
Nordbaden	90	7	3	0	-	32	68	-	51	49

Noch: Schäden durch Winterfröste, Holzreife und Austrieb der Reben Anfang Juni 1971

Kreis Regierungsbezirk Land	Schäden durch Winterfröste an Holz und Knospen in % der Ertragsreblfläche				Die Holzreife			Den Austrieb der Reben		
					bezeichneten% der Berichterstatter als					
	keine	schwache	mittlere	starke	schlecht	mittel	gut	schlecht	mittel	gut
Stadtkreise										
Freiburg im Breisgau	100	-	-	-	-	-	100	-	100	-
Baden - Baden	-	100	-	-	-	-	100	-	-	100
Landkreise										
Bühl	70	30	0	0	-	56	44	6	50	44
Donaueschingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emmendingen	70	24	5	1	-	33	67	-	67	33
Freiburg	86	12	2	-	-	24	76	-	59	41
Hochschwarzwald	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kehl	80	20	-	-	-	-	100	-	-	100
Konstanz	73	27	-	-	-	25	75	-	75	25
Lahr	89	11	0	-	-	40	60	-	40	60
Lörrach	99	1	-	-	-	21	79	-	26	74
Müllheim	96	4	-	-	-	19	81	-	31	69
Offenburg	87	8	5	0	-	64	36	-	84	16
Restatt	100	-	-	-	-	100	-	-	100	-
Säckingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stockach	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Überlingen	100	-	-	-	-	33	67	-	33	67
Villingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Waldshut	90	10	-	-	-	33	67	-	-	100
Wolfach	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Südbaden	85	13	2	0	-	34	66	0	51	49
Landkreise										
Balingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biberach	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Calw	96	2	2	-	-	33	67	-	-	100
Ehingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Freudenstadt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hechingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Horb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Münsingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ravensburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reutlingen	85	5	10	-	-	-	100	-	50	50
Rottweil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saulgau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sigmaringen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tettngau	85	15	-	-	-	100	-	-	100	-
Tübingen	65	23	12	-	-	75	25	-	75	25
Tuttlingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wangen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Südwestfalen-Lippe										
Südwestfalen-Lippe	86	7	7	-	-	50	50	-	50	50
Baden-Württemberg										
Baden-Württemberg	86	11	2	1	0	32	68	1	46	53
Anfang Juni 1970	97	3	0	0	1	28	71	4	37	59

Wechstumsstand der Reben Anfang Juni 1971

Weinbaugebiet Regierungsbezirk Land	Anfang Juni 1967	Anfang Juni 1968	Anfang Juni 1969	Anfang Juni 1970	Anfang Juni 1971
	Begutachtungsziffern (Noten) 1)				
Oberes Neckartal	2,7	2,4	2,6	2,3	2,4
Unteres Neckartal	2,3	2,5	2,2	2,2	2,3
Remstal	2,1	2,1	2,1	2,3	1,9
Enstal	2,6	2,2	2,4	2,3	2,1
Zabergkü	2,3	2,4	2,2	2,3	2,4
Kocher- und Jagtetal	2,2	2,6	2,3	2,3	2,4
Tauber- und Jagtetal	2,6	1,9	2,2	1,9	2,1
Nordwürttemberg	2,3	2,4	2,2	2,2	2,3
Tauber- und Maintal	2,2	3,2	2,2	2,5	2,8
Neckar- und Jagtetal	2,5	3,6	2,3	2,4	2,9
Bergstraße	2,2	2,0	2,5	2,4	2,2
Kraichgau	2,2	2,0	2,4	2,4	2,2
Pfinz-, Enz- und Albtal	2,4	2,0	2,5	2,3	2,4
Nordbaden	2,2	2,2	2,4	2,4	2,3
Seegegend	2,0	1,8	2,0	1,9	2,0
Oberes Rheintal	3,5	2,2	2,0	1,4	2,0
Markgräflerland	2,1	2,3	2,3	2,5	2,2
Kaiserstuhl	1,9	2,0	2,4	2,3	2,4
Breisgau	2,1	1,9	2,3	2,3	2,2
Ortenau und Bühler- und Jagtetal	2,0	1,9	2,2	2,2	2,4
Südbaden	2,0	2,0	2,3	2,3	2,3
Oberes Neckartal	2,6	3,2	2,2	2,1	2,2
Enstal	2,0	2,5	2,2	3,0	2,0
Südwürttemberg-Hohenzollern	2,6	3,0	2,2	2,2	2,2
Baden-Württemberg	2,1	2,2	2,3	2,3	2,3

1) Noten: 1,0 = sehr gut = mehr als 3/4 Herbst, 2,0 = gut = mehr als 1/2 bis 3/4 Herbst, 3,0 = mittel = 1/2 Herbst, 4,0 = gering = 1/4 bis 1/2 Herbst, 5,0 = sehr gering = weniger als 1/4 Herbst.