

STATISTISCHE BERICHTE

Artikel-Nr. 3392 81003

Agrarwirtschaft 39/81

C II 4 - m 8/81 (Erscheint nur für Juni bis November)

11.8.81

Wachstumstand der Reben Anfang August 1981

1. Wachstumstand der Reben

Weinbaubereich Landschaft	1981		Weinbaubereich Weinbaugemeinde Land	1981	
	Anfang Juli	Anfang August		Anfang Juli	Anfang August
	Begrüchtungsziffern ¹⁾			Begrüchtungsziffern ¹⁾	
Remstal-Stuttgart	2,7	2,7	Kaiserstuhl-Tuniberg	2,5	2,7
Württembergisches Unterland	3,6	3,4	Breisgau	2,6	2,7
Kocher-Jagst-Tauber	4,2	3,8	Ortenau	2,5	2,6
Württemberg	3,5	3,3	Baden	2,7	2,8
dagegen 1980	2,5	3,2	dagegen 1980	2,7	3,8
1979	2,1	2,0	1979	2,2	2,1
1978	2,5	2,6	1978	2,7	3,0
1977	2,1	1,9	1977	2,3	2,2
Badische Bergstraße/Kraichgau	2,9	2,9	Baden-Württemberg	3,0	3,0
Badisches Frankenland	4,2	4,0	dagegen 1980	2,6	3,6
Bodensee	2,9	2,9	1979	2,2	2,1
Markgräflerland	2,9	3,0	1978	2,6	2,9
			1977	2,2	2,1

¹⁾ Skala: 1,0 = sehr gut, 2,0 = gut, 3,0 = mittelmäßig, 4,0 = schlecht, 5,0 = sehr schlecht. 1,0 = sehr geringe Weinreife, 2,0 = geringe Weinreife, 3,0 = mittelmäßige Weinreife, 4,0 = gute Weinreife, 5,0 = sehr gute Weinreife.

2. Witterung der letzten drei Wochen

Witterung der letzten drei Wochen (in Grad Celsius)											
Niederrhein			Oberrhein			Südwestdeutsche			Südostdeutsche		
1. bis 3. Woche	4. bis 6. Woche	7. bis 9. Woche	1. bis 3. Woche	4. bis 6. Woche	7. bis 9. Woche	1. bis 3. Woche	4. bis 6. Woche	7. bis 9. Woche	1. bis 3. Woche	4. bis 6. Woche	7. bis 9. Woche
Württemberg											
3	80	17	34	56	10	53	45	2	16	64	20
Baden											
2	63	35	48	44	8	65	35	0	21	60	19
Baden-Württemberg											
2	71	27	42	50	8	60	39	1	19	62	19

HERAUSGEGEBEN VOM STATISTISCHEN LANDESAMT BADEN-WÜRTTEMBERG

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet

3. Verrieselungsschäden

Rebsorten	keine	schwache	mittlere	starke
	Schäden in % der Ertragsreihfläche ¹⁾			

Württemberg

Weißweinsorten:

Müller-Thurgau	62	24	10	4
Riesling	53	22	18	7
Silvaner	62	26	9	3
Gutedel	44	24	15	17
Ruländer	63	25	10	2
Weißer Burgunder	95	5	-	-
Auxerrois	-	-	-	-
Kerner	74	19	6	1
Gewürztraminer	42	20	9	29

Rotweinsorten:

Blauer Trollinger	70	17	9	4
Blauer Spätburgunder	66	24	8	2
Portugieser	63	22	7	8
Lemberger	52	27	17	4
Schwarzriesling	67	22	9	2

Baden

Weißweinsorten:

Müller-Thurgau	77	16	5	2
Riesling	73	22	5	-
Silvaner	84	12	3	1
Gutedel	36	19	35	10
Ruländer	77	17	5	1
Weißer Burgunder	73	17	8	2
Auxerrois	77	12	9	2
Kerner	-	-	-	-
Gewürztraminer	62	16	13	9

Rotweinsorten:

Blauer Trollinger	58	26	3	13
Blauer Spätburgunder	80	17	3	-
Portugieser	73	16	6	5
Lemberger	60	26	11	3
Schwarzriesling	69	20	11	-

Baden-Württemberg

Weißweinsorten:

Müller-Thurgau	75	17	6	2
Riesling	59	22	14	5
Silvaner	73	19	6	2
Gutedel	36	19	35	10
Ruländer	77	17	5	1
Weißer Burgunder	73	17	8	2
Auxerrois	77	12	9	2
Kerner	74	19	6	1
Gewürztraminer	61	16	13	10

Rotweinsorten:

Blauer Trollinger	70	17	9	4
Blauer Spätburgunder	78	18	4	-
Portugieser	64	21	7	8
Lemberger	52	27	17	4
Schwarzriesling	67	22	9	2

1) Schwache = Schäden von 10 bis unter 25 % der Blüten, mittlere = Schäden von 25 bis unter 50 % der Blüten, starke = Schäden von 50 % und darüber der Blüten.