

Statistische Berichte

des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg

Stuttgart, Neckarstraße 18 B - Telefon 210 46

Agrardienst 21

C II 2

10. Juli 1956

Gute bis mittlere Gemüseernte

Das nasse und kalte Wetter im Juni verzögerte die Entwicklung des Gemüses. Zu Beginn des Monats gab es vereinzelt noch Frostschäden. In 32 Berichtsbezirken wurden bis zu 50 vH der Gemüsekulturen durch Hagel geschädigt. Starke Regenfälle verkrusteten den Boden; Erdbeeren und Kopfsalat erlitten Fäulnisschäden. Den Gurken, Tomaten und Bohnen mangelte es an Sonne. Von Pflanzenschädlingen traten stärker auf: Ackerschnecken, Blattläuse, Wühlmäuse, Werren und auch Kohlfiegen.

Die endgültige Ernteschätzung ergab bei Frühlkohlrabi, Frühjahrskopfsalat, Spargel und Rhabarber durchweg höhere Hektarerträge als im vorigen Jahr und im sechsjährigen Mittel. Auch die gesamte Ernte fiel bei den drei erstgenannten Gemüsearten zum Teil wesentlich größer aus als in den vergangenen Jahren. Die Rhabarberernte ist nur wenig höher als im Vorjahr und etwas kleiner als im mehrjährigen Mittel.

Wie nach den Wachstumsstandsnoten im Mai zu erwarten war, versprechen Frührotkohl, Grüne Pflückerbsen, Frühe Möhren, Buschbohnen und Dicke Bohnen gute Mittelernten. Frühweißkohl wird zwar höhere Hektarerträge als im bisherigen Durchschnitt bringen, infolge Anbaueinschränkung bleibt die Ernte jedoch voraussichtlich sowohl hinter der vorjährigen als auch hinter der Durchschnittsernte zurück. Bei Frühwirsingkohl und Frühblumenkohl ist etwa mit einer Mittelernte zu rechnen. Winterzwiebeln erlitten durch den Frost starken Schaden, so daß voraussichtlich nur etwa ein Fünftel des mehrjährigen Durchschnitts erzielt wird. Die zweite Schätzung der Erdbeerernte ergab gegenüber der ersten noch etwas größere Hektarerträge, die das sechsjährige Mittel fast erreichen. Die Ernte wird infolge starker Anbauerweiterung das Mittel um etwa 70 vH überschreiten.

Der Wachstumsstand der übrigen Gemüsearten ist gut bis mittel, bei Bohnen, Gurken, Tomaten sowie Späten Möhren besser als zur gleichen Zeit des Vorjahres und nur bei Steckspeisezwiebeln wenig schlechter. Gebietlich sind keine wesentlichen Unterschiede in der Entwicklung der Gemüsearten zu beobachten.

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet.

Erntevorschätzung von Gemüse Ende Juni 1956

Gebiet	Frühweißkohl			Frührotkohl			Frühwirsingkohl			Frühblumenkohl			Grüne Pflückerbsen		
	Anbau- fläche ha	Ertrag		Anbau- fläche ha	Ertrag		Anbau- fläche ha	Ertrag		Anbau- fläche ha	Ertrag		Anbau- fläche ha	Ertrag	
		je ha dz	ins- gesamt dz												
Nordwürttemberg	45,7	286,7	13 100	29,3	251,0	7 354	27,6	198,8	5 488	54,4	171,3	9 316	155,8	128,6	20 029
Nordbaden	21,6	267,4	5 776	15,7	264,7	4 156	14,9	210,1	3 130	28,1	167,2	4 697	361,1	102,7	37 097
Südbaden	22,1	272,9	6 032	18,8	259,8	4 885	17,1	204,0	3 489	32,9	181,5	5 971	65,0	82,4	5 359
Südwestfalen - Hohenzollern	7,6	254,7	1 936	9,8	246,1	2 412	7,9	202,9	1 603	10,7	171,4	1 834	17,9	82,1	1 470
Baden - Württemberg	97,0	276,7	26 844	73,6	255,5	18 807	67,5	203,1	13 710	126,1	173,0	21 818	599,8	106,6	63 955
endgültig 1955	119,4	295,8	35 322	66,7	272,4	18 168	69,8	225,4	15 731	117,6	188,9	22 209	786,5	98,4	77 426
Mittel 1950 / 55	116,2	264,5	30 735	69,4	230,9	16 021	71,7	192,5	13 803	137,2	162,8	22 332	652,4	90,5	59 016
darunter in den Gemüseanbaugebieten:															
Oberes Neckar- und Remstal (hauptsächlich Weißkohl 27,2 vH, Spinat 10,2 vH, Salat 7,1 vH)	32,4	283,7	9 192	13,2	252,7	3 336	14,7	194,5	2 859	28,7	167,9	4 820	19,3	81,0	1 564
Unteres Neckartal und Kraichgau (hauptsächlich Pflückerbsen 47,2 vH, Gurken 24,8 vH, Bohnen 5,8 vH)	4,1	293,2	1 202	3,3	227,9	752	2,7	197,8	534	8,0	163,5	1 308	264,1	114,6	30 271
Unteres Rheintal (hauptsächlich Spargel 22,7 vH, Gurken 15,0 vH, Pflückerbsen 7,9 vH)	18,1	268,4	4 858	13,7	262,9	3 602	12,6	213,6	2 691	23,2	173,4	4 024	120,2	110,6	13 293
Breisgau und Kaiserstuhl (hauptsächlich Spinat 11,0 vH, Möhren 10,7 vH, Bohnen 9,0 vH, Salat 8,9 vH)	5,4	330,2	1 783	3,3	308,5	1 018	3,0	255,7	767	5,6	161,4	904	3,7	93,8	347
Konstanz mit Insel Reichenau (hauptsächlich Salat 24,1 vH, Bohnen 7,2 vH, Spinat 7,2 vH, Tomaten 6,8 vH)	6,8	277,7	1 888	7,7	267,3	2 058	6,6	195,0	1 287	16,0	216,1	3 458	2,9	87,0	252
Oberes Gäugebiet (hauptsächlich Weißkohl 53,9 vH)	4,0	227,5	910	0,9	208,9	188	1,4	206,4	289	2,3	110,9	255	3,3	84,5	279
Nördl. Oberrhein- und Oberes Gäugebiet (hauptsächlich Bohnen 38,9 vH, Erd- beeren 24,4 vH, Pflückerbsen 16,7 vH)	1,2	236,7	284	4,2	226,7	952	1,5	193,3	290	1,8	148,9	268	41,4	79,9	3 306

Der Wachstumsstand von Gemüse Ende Juni 1956

Regionenbezirke	Mittel- früher und Spätblu- menkohl	Kopfsalat (Sommer- und Herbstsalat)	Späte Möhren (Gelbe Rüben)	Zwiebeln (Früh- jahrs- aussaat)	Steck- speise- zwiebeln	Buschbohnen (einschl. Wachsbohnen)	Stangenbohnen (auch Prunk- oder Feuer- bohnen einschl. Wachsbohnen)	Gurken	Tomaten
Land	Noten (Begutachtungsziffern) : 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering								
Nordwürttemberg	2,4	2,3	2,3	2,5	2,3	2,7	2,6	2,8	2,7
Nordbaden	2,4	2,2	2,5	2,6	2,4	2,4	2,4	2,8	2,6
Südbaden	2,2	2,4	2,2	2,3	2,4	2,6	2,4	3,2	2,5
Südwestfalen-Hohenzollern	2,6	2,3	2,5	2,6	2,2	3,2	3,1	2,6	3,1
Baden - Württemberg	2,4	2,3	2,4	2,5	2,3	2,6	2,6	2,8	2,6
Ende Juni 1955	2,4	2,3	2,5	2,5	2,2	3,2	2,9	3,3	2,9
Ende Juni 1954	2,7	2,4	2,3	2,3	2,2	2,7	2,7	2,7	2,4

noch: Erntevorschätzung von Gemüse Ende Juni 1956

Gebiet	Winterzwiebeln (Herbstaussaat)			Frühe Möhren (Karotten)			Dicke Bohnen (Sau-, Puffbohnen)			Buschbohnen			Erdbeeren (vorj.u.ältere Pflanz.)		
	Ernte- fläche ¹⁾ ha	Ertrag		Anbau- fläche ha	Ertrag		Anbau- fläche ha	Ertrag		Anbau- fläche ha	Ertrag		Anbau- fläche ha	Ertrag	
		je ha dz	ins- gesamt dz		je ha dz	ins- gesamt dz		je ha dz	ins- gesamt dz		je ha dz	ins- gesamt dz		je ha dz	ins- gesamt dz
Nordwürttemberg	3,6	122,5	441	46,9	180,0	8 440	0,3	80,0	24	36,5	98,8	3 608	166,9	58,7	9 790
Nordbaden	2,1	129,5	272	25,2	195,5	4 927	4,0	83,3	333	82,3	98,7	8 122	75,1	54,9	4 124
Südbaden	0,4	122,5	49	37,6	209,8	7 888	1,0	103,0	103	175,6	97,4	17 097	194,6	57,1	11 115
Südwestfalen - Hohenzollern	0,2	110,0	22	11,9	198,3	2 360	0,6	93,3	56	15,3	83,4	1 276	64,6	56,7	3 661
Baden - Württemberg	6,3	124,4	784	121,6	194,2	23 615	5,9	87,5	516	309,7	97,2	30 103	501,2	57,2	28 690
endgültig 1955	13,0	160,4	2 085	109,8	197,0	21 627	7,3	91,6	669	306,7	103,5	31 742	403,4	63,9	25 764
Mittel 1950 / 55	29,6	145,5	4 308	123,4	182,1	22 468	5,2	68,7	357	311,5	90,3	28 142	291,1	58,0	16 870
darunter in den Gemüseanbaugebieten:															
<u>Oberes Neckar- und Remstal</u> (hauptsächlich Weißkohl 27,2 vH, Spinat 10,2 vH, Salat 7,1 vH)	2,2	120,0	264	22,1	178,8	3 951	0,2	50,0	10	13,0	94,0	1 222	123,6	58,2	7 196
<u>Unteres Neckartal und Kraichgau</u> (hauptsächlich Pflückerbsen 47,2 vH, Gurken 24,8 vH, Bohnen 5,8 vH)	0,7	108,6	76	8,6	154,9	1 332	0,1	76,3	8	25,7	100,6	2 586	23,2	72,2	1 674
<u>Unteres Rheintal</u> (hauptsächlich Spargel 22,7 vH, Gurken 15,0 vH, Pflückerbsen 7,9 vH)	2,0	131,0	262	17,6	211,5	3 723	3,9	83,3	325	50,7	100,0	5 071	66,3	55,4	3 674
<u>Breisgau und Kaiserstuhl</u> (hauptsächlich Spinat 11,0 vH, Möhren 10,7 vH, Bohnen 9,0 vH, Salat 8,9 vH)	0,0	.	.	15,1	256,2	3 869	0,7	98,6	69	16,9	101,7	1 718	16,9	51,1	863
<u>Konstanz mit Insel Reichenau</u> (hauptsächlich Salat 24,1 vH, Bohnen 7,2 vH, Spinat 7,2 vH, Tomaten 6,8 vH)	0,0	.	.	7,9	149,0	1 177	0,1	96,2	10	27,3	97,7	2 667	2,9	52,1	151
<u>Oberes Gäugebiet</u> (hauptsächlich Weißkohl 53,9 vH)	0,0	.	.	2,2	216,4	476	0,2	100,0	20	2,5	67,2	168	1,6	46,3	74
<u>Nördl. Oberrhein- und Oberes Gäugebiet</u> (hauptsächlich Bohnen 38,9 vH, Erd- beeren 24,4 vH, Pflückerbsen 16,7 vH)	0,0	.	.	2,0	213,5	427	0,0	.	.	102,9	96,0	9 877	122,1	59,4	7 251

1) Endgültiger Anbau 1955 für Ernte 1956 unter Berücksichtigung der Auswinterung
Sonstige Flächen aus: Voraussichtlicher Gemüseanbau 1956.

noch: Der Wachstumsstand von Gemüse Ende Juni 1956

Gemüseanbaugebiete	Mittel- früher und Spätblu- menkohl	Kopfsalat (Sommer- und Herbstsalat)	Späte Möhren (Gelbe Rüben)	Zwiebeln (Früh- jahrs- aussaat)	Steck- speise- zwiebeln	Buschbohnen (einschl. Wachsbohnen)	Stangenbohnen (auch Prunk- oder Feuer- bohnen einschl. Wachsbohnen)	Gurken	Tomaten
Noten (Begutachtungsziffern) : 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering									
Oberes Neckar- und Remstal	2,3	2,3	2,3	2,5	2,4	2,7	2,6	3,0	2,7
Unteres Neckartal u. Kraichgau	2,3	2,2	2,3	2,2	2,0	2,3	2,4	2,5	2,4
Unteres Rheintal	2,5	2,1	2,4	2,5	2,4	2,5	2,4	3,0	2,6
Breisgau und Kaiserstuhl	1,9	2,6	2,2	2,7	2,7	2,3	2,2	2,9	2,6
Konstanz mit Insel Reichenau	2,5	2,6	2,4	2,1	2,5	3,1	3,0	3,1	2,4
Oberes Gäugebiet	3,0	2,6	3,6	2,6	2,3	3,2	3,1	3,3	3,0
Nördliches Oberrhein- und Oberes Gäugebiet	2,0	2,0	2,2	2,1	2,2	2,5	3,0	3,9	2,6

Endgültige Ernteschätzung von Gemüse Ende Juni 1956

Gebiet	Frühkohlrabi			Frühjahrskopfsalat			Spargel			Rhabarber		
	Anbau- fläche ¹⁾ ha	Ertrag		Anbau- fläche ¹⁾ ha	Ertrag		Anbau- fläche ²⁾ ha	Ertrag		Anbau- fläche ³⁾ ha	Ertrag	
		je ha dz	ins- gesamt dz									
Nordwürttemberg	26,7	196,6	5 248	98,3	203,9	20 041	2,5	26,0	65	51,2	288,0	14 746
Nordbaden	15,2	160,8	2 444	56,9	162,6	9 253	709,9	30,6	21 749	16,8	269,4	4 526
Südbaden	29,9	200,1	5 983	57,7	210,3	12 137	9,3	46,5	432	10,0	222,4	2 224
Südwestfalen - Hohenzollern	6,9	182,9	1 262	21,5	182,1	3 916	0,3	25,0	8	4,6	253,9	1 168
Baden - Württemberg	78,7	189,8	14 937	234,4	193,5	45 347	722,0	30,8	22 254	82,6	274,4	22 664
dagegen Mai 1956	78,7	185,1	14 567	234,4	189,5	44 412	722,0	30,9	22 288	82,6	282,1	23 304
endgültig 1955	69,3	184,3	12 772	184,4	193,0	35 592	665,8	27,1	18 062	82,6	270,1	22 312
Mittel 1950 / 55	69,4	160,8	11 161	198,2 ⁴⁾	168,8	33 456	451,4	26,6	12 010	90,7	261,4	23 709
darunter in den Gemüseanbaugebieten:												
<u>Oberes Neckar- und Remstal</u> (hauptsächlich Weißkohl 27,2 vH, Spinat 10,2 vH, Salat 7,1 vH)	14,2	198,3	2 816	58,0	205,2	11 899	1,5	26,5	40	40,2	283,4	11 393
<u>Unteres Neckartal und Kraichgau</u> (hauptsächlich Pflückerbsen 47,2 vH, Gurken 24,8 vH, Bohnen 5,8 vH)	2,4	160,8	386	13,8	173,5	2 394	-	-	-	2,3	274,3	631
<u>Unteres Rheintal</u> (hauptsächlich Spargel 22,7 vH, Gurken 15,0 vH, Pflückerbsen 7,9 vH)	13,6	163,5	2 223	48,5	165,4	8 023	708,9	30,6	21 683	15,2	273,0	4 149
<u>Breisgau und Kaiserstuhl</u> (hauptsächlich Spinat 11,0 vH, Möhren 10,7 vH, Bohnen 9,0 vH, Salat 8,9 vH)	5,5	188,0	1 034	10,8	175,3	1 893	3,3	54,5	180	2,3	242,2	557
<u>Konstanz mit Insel Reichenau</u> (hauptsächlich Salat 24,1 vH, Bohnen 7,2 vH, Spinat 7,2 vH, Tomaten 6,8 vH)	15,9	224,0	3 562	22,6	266,2	6 016	-	-	-	0,7	347,6	243
<u>Oberes Gäugebiet</u> (hauptsächlich Weißkohl 53,9 vH)	0,8	162,5	130	4,6	210,4	968	0,0	.	.	0,4	265,0	106
<u>Nördl. Oberrhein- und Oberes Gäugebiet</u> (hauptsächlich Bohnen 38,9 vH, Erd- beeren 24,4 vH, Pflückerbsen 16,7 vH)	1,3	166,2	216	4,7	168,5	792	4,8	40,0	192	0,6	201,7	121

1) Anbauflächen vom Frühjahr 1956. 2) Anbauabsicht 1956. 3) Endgültiger Anbau 1955. 4) Mittel 1951 / 55.

Niederschläge und Temperaturverlauf im Berichtszeitraum Ende Mai bis Ende Juni 1956

Regierungsbezirke Land	Von 100 Gemüseberichterstattem meldeten Berichterstatte					
	die Niederschläge als			den Temperaturverlauf als		
	zu gering	aus- reichend	zu hoch	zu warm	normal	zu kalt
Nordwürttemberg	1	52	47	-	21	79
Nordbaden	-	59	41	-	27	73
Südbaden	2	61	37	-	22	78
Südwestfalen - Hohenzollern	-	35	65	-	11	89
Baden - Württemberg	1	52	47	-	21	79