Statistische Berichte

des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg

Stuttgart, Konrad-Adenauer-Straße 18 B

Agrardienst 24

C II 4 20. Juni 1968

Der Wachstumstand der Reben Anfang Juni 1968

Die Reben sind erfreulich gut über den Winter gekommen; es entstanden nur bei 7% der Ertragsrebfläche mittlere bzw. starke Frostschäden an Holz und Knospen, während 86% der Bestände überhaupt keine Beeinträchtigungen erfuhren. Soweit Winterfrostschäden auftraten, waren insbesondere die Kreise Heilbronn, Künzelsau und Tauberbischofsheim betroffen. Auch die durch Frühjahrsfröste an Laub und Trieben verursachten Schäden halten sich, aufs ganze gesehen, in relativ engen Grenzen. Die wenigen Frostnächte im Mai wurden in vielen Kernweinbaugemeinden durch Beheizung überstanden, so daß nur vereinzelt ganze Bestände oder Weinbaulagen stärker geschädigt wurden.

Die Winterfeuchtigkeit und die Niederschläge im Monat Mai wurden von den Weinbausachverständigen des Statistischen Landesamts allgemein als ausreichend angesehen; den Temperaturverlauf hielten allerdings nur 53% der Sachverständigen für normal, aber 37% für ungünstig. Die Pflegearbeiten konnten gleichwohl in 84% der Bestände vollständig durchgeführt werden. Der Befall mit Pflanzenkrankheiten und -schädlingen beschränkte sich dank der intensiven Bekämpfungsmaßnahmen bisher auf vereinzelte Bestände.

Trotz einer allgemein guten Holzreife konnte der Austrieb der Reben nicht überall voll befriedigen: nur knapp sechs Zehntel der Sachverständigen bezeichneten den Austrieb der Reben als "gut", vier Zehntel dagegen als "mittelmäßig", wobei vor allem in den württembergischen Weinbaugebieten die Erwartungen nicht ganz erfüllt wurden. Der Wachstumstand der Reben ist demgemäß auch in Nordwürttemberg und Nordbaden nicht ganz so gut wie in den südlichen Anbaugebieten. Gleichwohl bleibt er im ganzen nur geringfügig hinter dem Stand zur gleichen Zeit des Vorjahres zurück. Die Aussichten auf einen guten Weinherbst sind demnach trotz der etwas ungünstigen feuchtkühlen Witterung im Mai immer noch gegeben. Auch die in einzelnen Gemeinden bisher durch Hagelschläge aufgetretenen Ausfälle werden sich auf die voraussichtliche Landesernte wohl kaum auswirken.

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet.

Schäden durch Winterfröste; Holzreife und Austrieb der Reben Anfang Juni 1968

Kreis Regierungsbezirk Land	Schäden durch Winterfröste an Holz und Knospen in % der Ertragsrebfläche				Die Holzreife			Den Austrieb der Reben		
					bezeichneten ..... % der Berichterstatter als					
	keine	schwache	mittlere	starke	schlecht	mittel	gut	schlecht	mittel	gut
Stadtkreise										
Stuttgart	98	2	-	-	-	-	100	-	20	80
Heilbronn	7	37	35	21	-	67	33	-	100	-
Ulm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Landkreise										
Aalen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Backnang	92	6	1	1	-	29	71	-	43	57
Böblingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crailsheim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Esslingen	100	-	-	-	-	50	50	-	50	50
Göppingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Heidenheim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Heilbronn	66	14	11	9	-	44	56	-	59	41
Künzelsau	30	16	23	31	-	78	22	11	78	11
Leonberg	85	15	-	-	-	-	100	-	50	50
Ludwigsburg	88	8	2	2	-	50	50	-	50	50
Mergentheim	78	9	9	4	-	12	88	-	25	75
Nürtingen	81	10	7	2	-	43	57	-	57	43
Öhringen	78	11	7	4	-	37	63	5	42	53
Schwäbisch Gmünd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schwäbisch Hall	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ulm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vaihingen	97	3	-	-	-	17	83	-	22	78
Waiblingen	94	5	1	-	-	24	76	-	89	11
Nordwürttemberg	75	11	8	6	-	36	64	1	49	50
Stadtkreise										
Karlsruhe	85	15	-	-	-	-	100	-	-	100
Heidelberg	100	-	-	-	-	-	100	-	-	100
Mannheim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pforzheim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Landkreise										
Bruchsal	94	4	1	1	-	35	65	-	29	71
Buchen	2	3	10	85	67	33	-	100	-	-
Heidelberg	94	5	1	-	-	31	69	-	15	85
Karlsruhe	96	4	-	-	-	33	67	-	56	44
Mannheim	100	-	-	-	-	12	88	-	-	100
Mosbach	68	11	21	-	-	40	60	20	80	-
Pforzheim	99	1	-	-	-	17	83	-	33	67
Sinsheim	69	21	5	5	11	33	56	6	50	44
Tauberbischofsheim	34	17	24	25	-	52	48	27	59	14
Nordbaden	81	8	5	6	4	33	63	10	39	51

Noch: Schäden durch Winterfröste; Holzreife und Austrieb der Reben Anfang Juni 1968

Kreis Regierungsbezirk Land	Schäden durch Winterfröste an Holz und Knospen in % der Ertragsrebfläche				Die Holzreife			Den Austrieb der Reben		
					bezeichneten ..... % der Berichterstatter als					
	keine	schwache	mittlere	starke	schlecht	mittel	gut	schlecht	mittel	gut
Stadtkreise										
Freiburg im Breisgau	100	-	-	-	-	-	100	-	-	100
Baden - Baden	100	-	-	-	-	-	100	-	-	100
Landkreise										
Bühl	95	5	-	-	-	20	80	-	40	60
Donaueschingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emmendingen	98	2	-	-	-	15	85	-	30	70
Freiburg	99	1	-	-	-	2	98	-	12	88
Hochschwarzwald	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kehl	100	-	-	-	-	-	100	-	-	100
Konstanz	95	5	-	-	-	-	100	-	25	75
Lahr	98	2	-	-	-	29	71	-	12	88
Lörrach	99	1	-	-	-	25	75	5	45	50
Müllheim	97	3	-	-	-	28	72	-	33	67
Offenburg	98	2	-	-	-	15	85	-	15	85
Rastatt	100	-	-	-	-	-	100	-	100	-
Säckingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stockach	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Überlingen	95	5	-	-	-	-	100	-	40	60
Villingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Waldshut	77	10	10	3	-	33	67	-	100	-
Wolfach	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Südbaden	98	2	0	0	-	16	84	1	27	72
Landkreise										
Balingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biberach	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Calw	97	3	-	-	-	67	33	-	67	33
Ehingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Freudenstadt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hechingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Horb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Münsingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ravensburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reutlingen	65	25	10	-	-	50	50	-	100	-
Rottweil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saulgau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sigmaringen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tettnang	100	-	-	-	-	100	-	-	100	-
Tübingen	90	8	2	-	-	20	80	-	20	80
Tuttlingen	50	50	-	-	-	100	-	-	100	-
Wangen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Südwürttemberg-Hohenz.	78	18	4	-	-	50	50	-	58	42
Baden - Württemberg	86	7	4	3	1	29	70	3	39	58
Anfang Juni 1967	98	2	0	0	0	34	66	1	34	65

Wachstumstand der Reben Anfang Juni 1968

Weinbaugebiet Regierungsbezirk Land	Anfang Juni 1965	Anfang Juni 1966	Anfang Juni 1967	Anfang Juni 1968	Durchführung der Pflegearbeiten in %	
	Begutachtungsziffern (Noten) 1)				vollständig	unvollständig
Oberes Neckartal	2,1	2,5	2,7	2,4	86	14
Unteres Neckartal	2,2	2,4	2,3	2,5	98	2
Remstal	2,1	2,3	2,1	2,1	88	12
Enztal	2,1	2,6	2,6	2,2	96	4
Zabergäu	2,5	2,2	2,3	2,4	96	4
Kocher- und Jagsttal	2,3	2,4	2,2	2,6	83	17
Taubergegend	1,8	2,3	2,6	1,9	88	12
Nordwürttemberg	2,2	2,4	2,3	2,4	94	6
Tauber- und Maintal	2,2	2,6	2,2	3,2	87	13
Neckar- und Jagsttal	2,6	2,5	2,5	3,6	89	11
Bergstraße	2,3	2,5	2,2	2,0	87	13
Kraichgau	2,4	2,4	2,2	2,0	82	18
Pfinz-, Enz- und Albtal	2,1	2,4	2,4	2,0	100	-
Nordbaden	2,3	2,5	2,2	2,2	87	13
Seegegend	2,0	2,4	2,0	1,8	100	-
Oberes Rheintal	2,0	2,1	3,5	2,2	67	33
Markgärflerland	2,0	2,7	2,1	2,3	60	40
Kaiserstuhl	2,2	2,4	1,9	2,0	67	33
Breisgau	2,1	2,5	2,1	1,9	66	34
Ortenau und Bühlergegend	2,0	2,1	2,0	1,9	85	15
Südbaden	2,1	2,4	2,0	2,0	71	29
Oberes Neckartal	2,8	2,6	2,6	3,2	86	14
Enztal	2,0	2,0	2,0	2,5	100	-
Bodenseegebiet: (Tettnang, Bruderhof-Hohentwiel)	2,9	2,9	2,9	2,0	50	50
Südwürttemberg - Hohenzollern	2,7	2,6	2,6	3,0	83	17
Baden - Württemberg	2,2	2,4	2,1	2,2	84	16

1) Noten: 1,0 = sehr gut = mehr als 3/4 Herbst, 2,0 = gut = mehr als 1/2 bis 3/4 Herbst, 3,0 = mittel = 1/2 Herbst, 4,0 = gering = 1/4 bis 1/2 Herbst, 5,0 = sehr gering = weniger als 1/4 Herbst.