

Statistische Berichte

des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg

Stuttgart, Neckarstraße 18B

Agrardienst 46

C II 2

20. Oktober 1960

Die Gemüseernte Ende September 1960

Das Wetter im September war verhältnismäßig kühl und feucht. Gegenüber dem Vormonat war verstärktes Auftreten von Pflanzenkrankheiten zu bemerken. Besonders hervorzuheben sind: Braunfäule an Tomaten, Virus bei Gurken, Blattflecken an Sellerie und Spargelrost.

Bei der endgültigen Ernteschätzung wurden mit Ausnahme von Sommer- und Herbstkopfsalat sowie von Einlegegurken allgemein höhere Hektarerträge als bei der Vorschätzung festgestellt. Diese Erträge liegen jedoch nur bei Herbstweißkohl, Zwiebeln, Buschbohnen und Schälgurken über dem sechsjährigen Mittel.

Bei unveränderter Anbaufläche ist die Ernte an Herbstweißkohl mit 228 600 dz um fast 8 vH größer als voriges Jahr aber um annähernd 2 vH kleiner als im Durchschnitt 1954/59. Auch die übrigen endgültig geschätzten Gemüsearten weisen Mehrernten auf, doch wird das mehrjährige Mittel nur bei Sommer- und Herbstkopfsalat, Buschbohnen, Einlege- und Schälgurken übertroffen.

Die Vorschätzung der Herbst- und Wintergemüsearten ergab mit Ausnahme von Blumenkohl, Winterendivien und Tomaten durchweg höhere Hektarerträge als vor Jahresfrist und auch die Ernten übertreffen die Ergebnisse vom Vorjahr; nur Endivien und Tomaten liegen darunter. Die Durchschnitte der Jahre 1954/59 werden mit Ausnahme von Rosenkohl und Endivien durchweg überschritten, und zwar um 2,4 vH (Späte Möhren) bis 94,5 vH (Dauerweißkohl).

Niederschläge und Temperaturverlauf im Berichtszeitraum Ende August bis Ende September 1960

Gebiet	Von 100 Gemüseberichterstattem meldeten Berichterstatte					
	die Niederschläge als			den Temperaturverlauf als		
	zu gering	ausreichend	zu hoch	zu warm	normal	zu kalt
Nordwürttemberg	14	77	9	5	81	14
Nordbaden	16	75	9	5	81	14
Südbaden	-	62	38	-	55	45
Südwestfalen - Hohenzollern	1	63	36	-	56	44
Baden - Württemberg	10	71	19	3	72	25

Erntevorschätzung von Gemüse Ende September 1960 in Baden - Württemberg

Gemüsearten	Mittel 1954 / 59			endgültig 1959			September 1959			September 1960		
	Anbau- fläche ha	Ertrag		Anbau- fläche ha	Ertrag		Anbau- fläche ha	Ertrag		Anbau- fläche ha	Ertrag	
		je ha dz	ins- gesamt dz									
Dauerweißkohl	85,7	344,9	29 562	125,0	323,4	40 425	125,0	330,2	41 275	166,7	345,0	57 512
Dauerrotkohl	61,5	294,8	18 130	75,3	264,6	19 924	75,3	249,0	18 750	92,3	295,1	27 238
Dauerwirsing	46,1	257,5	11 872	46,7	235,4	10 993	46,7	239,7	11 194	49,6	251,8	12 489
Grünkohl	16,9	145,6	2 460	15,2	123,2	1 873	15,2	143,8	2 186	22,5	159,9	3 598
Rosenkohl (nur Röschen)	241,7	107,6	26 000	225,0	97,7	21 983	225,0	100,5	22 613	220,9	104,1	22 996
Mittelfrüher und Spätblumenkohl	149,2	192,7	28 758	161,1	205,0	33 026	161,1	195,4	31 479	187,7	192,2	36 076
Spätkohlrabi	34,4	189,6	6 521	41,6	171,5	7 134	41,6	172,3	7 168	44,1	181,7	8 013
Winterendivien	136,4	199,3	27 178	122,8	206,9	25 407	122,8	209,0	25 665	108,6	184,2	20 004
Feldsalat	195,3	71,0	13 873	198,7	57,1	11 346	198,7	63,5	12 617	196,7	73,6	14 477
Herbstspinat	171,2	127,9	21 890	191,8	106,0	20 331	191,8	113,2	21 712	255,6	136,5	34 889
Späte Möhren	163,4	263,7	43 087	148,9	219,6	32 698	148,9	220,5	32 832	173,2	254,7	44 114
Rote Rüben	78,2	272,1	21 275	80,5	244,2	19 658	80,5	248,3	19 988	99,7	259,1	25 832
Sellerie	143,2	217,2	31 096	140,2	200,4	28 096	140,2	197,8	27 732	156,6	224,7	35 188
Porree (Lauch)	136,9	190,0	26 012	151,1	181,2	27 379	151,1	179,7	27 153	164,6	197,3	32 476
Tomaten	180,1	264,8	47 686	172,7	319,5	55 178	172,7	312,4	53 951	169,5	311,1	52 731

1) Anbaufläche nach der Erhebung vom Juli 1960.

Endgültige Ernteschätzung von Gemüse Ende September 1960 in Baden - Württemberg

Gemüsearten	Mittel 1954 / 59			endgültig 1959			August 1960			September 1960		
	Anbau- fläche ha	Ertrag		Anbau- fläche ha	Ertrag		Anbau- fläche ha	Ertrag		Anbau- fläche ha	Ertrag	
		je ha dz	ins- gesamt dz									
Herbstweißkohl	581,6	399,7	232 459	550,0	385,6	212 080	570,1	369,1	210 424	550,2	415,5	228 608
Herbstrotkohl	80,9	290,4	23 497	76,6	271,1	20 766	87,0	283,8	24 691	75,1	286,6	21 524
Herbstwirsing	71,4	245,5	17 532	69,0	228,6	15 773	78,5	242,7	19 052	66,0	243,3	16 058
Sommer- und Herbstkopfsalat	237,8	145,5	34 611	248,5	144,8	35 983	327,5	137,7	45 097	297,1	137,2	40 762
Zwiebeln (Frühjahrsaussaat)	123,9	179,9	22 289	91,6	187,9	17 212	113,8	168,9	19 221	106,8	181,1	19 341
Buschbohnen (einschl. Wachsbohnen)	358,2	101,1	36 220	400,4	93,9	37 598	424,3	113,1	47 988	425,2	113,2	48 133
Einlegegurken	733,2	145,0	106 282	674,6	119,6	80 682	679,1	137,2	93 173	808,3	133,4	107 827
Schälgurken	161,6	194,9	31 499	193,3	187,1	36 166	224,6	175,7	39 462	190,1	205,5	39 066

1) Anbaufläche nach der Erhebung vom Juli 1960.