


# STATISTISCHE BERICHTE



*Shr*  
7. 3. 2009 2693

Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

Arb.-Nr. VIII/3/24

Erschienen am 8. April 1954

Signatur
281
3A7IIb

Erkrankungen an aktiver Tuberkulose  
im Bundesgebiet und in West-Berlin  
im 4. Vierteljahr 1953

(3636) V

Nachdruck - auch auszugsweise-  
nur mit Quellenangabe gestattet.

## I n h a l t

	Seite
A. Vorbemerkungen	3
B. <u>Tabellen</u>	
1. Neuerkrankungen an aktiver Tuberkulose im Bundesgebiet und in West-Berlin im 4. Vierteljahr 1953	4
2. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten im Bundesgebiet und in West-Berlin im 4. Vierteljahr 1953	5
3. Neuerkrankungen und Bestand an aktiver Tuberkulose im Bundesgebiet und in West-Berlin (auf 10 000 der Bevölkerung)	6
4. Die Sterbefälle an Tuberkulose der Atmungsorgane und Tuberkulose anderer Organe einschließlich Miliartuberkulose (auf 10 000 der Bevölkerung)	7

Erkrankungen an aktiver Tuberkulose  
im Bundesgebiet und in West-Berlin  
im 4. Vierteljahr 1953

Vorbemerkungen

Ab 1953 ist es möglich, nicht nur den Bestand, sondern auch die Neuzugänge der an Tuberkulose Erkrankten für das gesamte Bundesgebiet anzugeben.

Bezüglich grundsätzlicher Fragen verweisen wir auf die vorausgegangenen Statistischen Berichte. Es sei weiterhin noch bemerkt, daß es sich bei den mitgeteilten Zahlen, solange die Untersuchungen auf freiwilliger Basis erfolgen, immer nur um die erfaßten Erkrankungen handelt und damit um die untersten Werte. Bei der Beurteilung der Tuberkulose-Morbidität muß auch beachtet werden, daß durch die Statistik der Neuerkrankungen nur die Neuzugänge (erstmalig Erkrankte) erfaßt werden, nicht aber die Besserungen oder Verschlechterungen (Verschiebungen zwischen den Gruppen).

Um das Bild über die Tuberkulose im Bundesgebiet und in West-Berlin abzurunden, werden in der Anlage auch die Tuberkulosesterbeziffern der vier Vierteljahre 1953 und zum Vergleich die der entsprechenden Vierteljahre 1952 aufgrund der standesamtlichen Meldungen beigelegt.

Neuerkrankungen<sup>1)</sup> an aktiver Tuberkulose  
im Bundesgebiet und in West-Berlin  
im 4. Vierteljahr 1953

Land	Tuberkulose der Atmungsorgane				insgesamt	Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
	ansteckend (offen)		insgesamt	nichtansteckend (aktiv geschlossen)			
	mit Bazillennachweis	ohne Bazillennachweis					
<u>Grundzahlen</u>							
Schleswig-Holstein	274	115	389	1 098	1 487	221	1 708
Hamburg	155	114	269	1 125	1 394	121	1 515
Niedersachsen	644	222	866	2 073	2 939	401	3 340
Bremen	48	40	88	219	307	78	385
Nordrhein-Westfalen	1 746	334	2 080	4 455	6 535	879	7 414
Hessen	360	113	473	960	1 433	286	1 719
Rheinland-Pfalz	256	112	368	655	1 023	257	1 280
Baden-Württemberg	604	153	757	2 304	3 061	516	3 577
Bayern	806	307	1 113	2 034	3 147	500	3 647
Bundesgebiet	4 893	1 510	6 403	14 923	21 326	3 259	24 585
West-Berlin	365	232	597	1 134	1 731	145	1 876

Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr

Schleswig-Holstein	4,54	1,91	6,45	18,22	24,66	3,66	28,33
Hamburg	3,53	2,59	6,12	25,57	31,69	2,75	34,44
Niedersachsen	3,80	1,31	5,12	12,25	17,36	2,37	19,73
Bremen	3,10	2,57	5,67	14,12	19,78	5,03	24,81
Nordrhein-Westfalen	4,80	0,95	5,72	12,25	17,96	2,42	20,38
Hessen	3,14	0,99	4,13	8,39	12,52	2,50	15,02
Rheinland-Pfalz	3,11	1,36	4,47	7,95	12,41	3,12	15,53
Baden-Württemberg	3,45	0,88	4,33	13,17	2,87	2,95	20,45
Bayern	3,44	0,22	0,38	8,67	13,41	2,13	15,55
Bundesgebiet	3,89	1,20	5,08	11,85	16,94	2,59	19,52
West-Berlin	6,48	4,12	10,60	20,14	30,74	2,57	33,32

1) Nur Neuzugänge, keine Zugänge aus anderen Gruppen.

Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten

im Bundesgebiet und in West-Berlin

am 31.12.1953

(Vorläufiges Ergebnis)

Land	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
	angesteckt (offen)			nichtangesteckt (aktiv geschlossen)	insgesamt		
	mit Bazillennachweis	ohne Bazillennachweis	insgesamt				
	<u>Grundzahlen</u>						
Schleswig-Holstein	5 014	3 024	8 038	20 528	28 566	3 988	32 554
Hamburg	4 774	2 667	7 441	18 517	25 958	2 376	28 334
Niedersachsen	16 102	3 645	19 747	33 095	52 842	7 769	60 611
Bremen	1 489	1 199	2 688	5 630	8 318	1 388	9 706
Nordrhein-Westfalen	30 261	11 534	41 795	84 739	126 534	23 803	150 337
Hessen	7 887	1 757	9 644	17 999	27 643	6 101	33 744
Rheinland-Pfalz	5 673	3 267	8 940	14 439	23 379	5 605	28 984
Baden-Württemberg	12 784	4 142	16 926	38 011	54 937	8 658	63 595
Bayern	16 493	6 786	23 279	32 518	55 797	7 851	63 648
Bundesgebiet	100 477	38 021	138 498	265 476	403 974	67 539	471 513
West-Berlin <sup>1)</sup>	.	.	.	.	.	.	.

Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung

Schleswig-Holstein	21,38	12,90	34,28	87,55	121,83	17,01	138,84
Hamburg	27,71	15,48	43,19	107,48	150,67	13,79	164,46
Niedersachsen	24,38	5,52	29,90	50,10	80,00	11,76	91,76
Bremen	24,49	19,72	44,22	92,61	136,83	22,83	159,66
Nordrhein-Westfalen	21,21	8,08	29,29	59,39	88,68	16,68	105,36
Hessen	17,61	3,92	21,54	40,19	61,73	13,62	75,36
Rheinland-Pfalz	17,59	10,13	27,72	44,77	72,49	17,38	89,87
Baden-Württemberg	18,63	6,04	24,66	55,38	80,05	12,62	92,66
Bayern	18,00	7,41	25,41	35,49	60,90	8,57	69,47
Bundesgebiet	20,39	7,72	28,11	53,87	81,98	13,71	95,68
West-Berlin <sup>1)</sup>	.	.	.	.	.	.	.

1) Zur Zeit können Angaben nicht gemacht werden, da Überprüfung des Bestandes an Erkrankten durch Nachuntersuchung erfolgt.

Neuerkrankungen und Bestand an aktiver Tuberkulose  
im Bundesgebiet und in West-Berlin

Gebiet	Berichtszeit	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
		ansteckend (offen)			nichtansteckend (aktiv geschlossen)	insgesamt		
		mit Bazillennachweis	ohne Bazillennachweis	insgesamt				
<u>Neuerkrankungen<sup>1)</sup></u> <u>auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr</u>								
Bundesgebiet								
1952	1. Vierteljahr	5,09	1,88	6,97	14,59	21,56	3,44	25,00
	2. Vierteljahr	5,05	1,81	6,86	14,90	21,76	3,70	25,46
	3. Vierteljahr	4,66	1,64	6,30	13,76	20,06	3,03	23,09
	4. Vierteljahr	4,06	1,46	5,52	11,97	17,49	2,82	20,31
1953	1. Vierteljahr	4,79	1,57	6,36	13,10	19,46	3,23	22,63
	2. Vierteljahr	4,81	1,78	6,59	13,74	20,33	3,28	23,62
	3. Vierteljahr	4,43	1,46	5,89	12,86	18,74	3,02	21,75
	4. Vierteljahr	3,89	1,20	5,09	11,85	16,94	2,59	19,52
West-Berlin								
1952	1. Vierteljahr	6,75	7,21	13,96	19,98	33,94	2,85	36,79
	2. Vierteljahr	7,32	7,71	15,03	19,08	34,11	2,97	37,08
	3. Vierteljahr	7,46	5,83	13,29	17,94	31,23	2,54	33,77
	4. Vierteljahr	7,40	4,82	12,23	18,44	30,68	2,50	33,17
1953	1. Vierteljahr	8,14	5,56	13,70	21,15	34,84	2,88	37,72
	2. Vierteljahr	8,33	6,77	15,10	22,16	37,26	2,60	39,85
	3. Vierteljahr	7,32	4,71	12,02	21,10	33,12	2,08	35,20
	4. Vierteljahr	6,48	4,12	10,60	20,14	30,74	2,57	33,32
<u>Bestand<sup>2)</sup></u> <u>auf 10 000 der Bevölkerung</u>								
Bundesgebiet								
1952	1. Vierteljahr	19,70	9,28	28,99	55,69	84,68	14,42	99,10
	2. Vierteljahr	20,03	9,15	29,18	56,07	85,25	14,56	99,82
	3. Vierteljahr	20,46	9,08	29,53	56,37	85,90	14,54	100,44
	4. Vierteljahr	20,34	8,65	28,99	54,42	83,41	14,00	97,42
1953	1. Vierteljahr	20,40	8,47	28,86	54,08	82,95	13,98	96,92
	2. Vierteljahr	20,56	8,51	29,07	54,36	83,42	14,05	97,47
	3. Vierteljahr	20,70	8,38	29,08	54,64	83,72	14,06	97,79
	4. Vierteljahr	20,39	7,72	28,11	53,87	81,98	13,71	95,68

1) Nur Neuzugänge, keine Zugänge aus anderen Gruppen.- 2) Bestand am Ende des Vierteljahres. Bestandsmeldungen von West-Berlin können z.Zt. nicht gemacht werden, da Überprüfung des Bestandes an Erkrankten durch Nachuntersuchungen erfolgt.

Sterbefälle an Tuberkulose der Atmungsorgane  
in den Ländern des Bundesgebietes und in West-Berlin  
(auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr)  
vorläufiges Ergebnis der standesamtlichen Meldungen

Land	1952				1953			
	1.Vj.	2.Vj.	3.Vj.	4.Vj.	1.Vj.	2.Vj.	3.Vj.	4.Vj.
Schleswig-Holstein	3,8	2,7	1,5	2,1	2,3	1,6	1,4	2,0
Hamburg	3,5	2,7	1,4	1,9	2,5	1,9	1,9	2,1
Niedersachsen	3,4	2,6	1,4	1,6	2,2	1,5	1,5	1,5
Bremen	3,1	2,4	1,9	1,9	3,2	1,8	1,6	1,6
Nordrhein-Westfalen	3,5	2,6	1,6	1,9	2,6	1,7	1,7	1,9
Hessen	2,7	1,9	1,6	1,8	2,4	1,3	1,0	1,5
Rheinland-Pfalz	3,3	2,4	1,6	1,5	2,8	1,7	1,5	1,7
Baden-Württemberg	2,6	2,2	1,5	1,4	2,1	1,4	1,2	1,5
Bayern	3,4	2,9	1,7	1,9	2,6	1,9	1,6	1,9
Bundesgebiet	3,3	2,5	1,6	1,8	2,5	1,6	1,5	1,8
West-Berlin	5,6	4,1	2,8	2,6	3,8	2,4	2,3	3,3

Sterbefälle an Tuberkulose anderer Organe  
(einschl. Miliartuberkulose)  
in den Ländern des Bundesgebietes und in West-Berlin  
(auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr)  
vorläufiges Ergebnis der standesamtlichen Meldungen

Land	1952				1953			
	1.Vj.	2.Vj.	3.Vj.	4.Vj.	1.Vj.	2.Vj.	3.Vj.	4.Vj.
Schleswig-Holstein	0,6	0,5	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,2
Hamburg	0,3	0,3	0,2	0,1	0,3	0,2	0,3	0,1
Niedersachsen	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2	0,3	0,2	0,3
Bremen	0,8	0,7	0,9	0,2	0,3	0,3	0,1	0,3
Nordrhein-Westfalen	0,5	0,5	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2
Hessen	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2
Rheinland-Pfalz	0,6	0,5	0,4	0,4	0,3	0,5	0,3	0,3
Baden-Württemberg	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3
Bayern	0,5	0,4	0,4	0,3	0,3	0,4	0,3	0,3
Bundesgebiet	0,5	0,5	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2
West-Berlin	0,5	0,2	0,2	0,3	0,4	0,4	0,2	0,3