

STATISTISCHE BERICHTE




Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

2643

Arb.-Nr. VIII/3/26

Erschienen am 7. September 1954

Die Tuberkulose im Jahr 1953
im Bundesgebiet und West-Berlin



Nachdruck — auch auszugsweise — nur mit Quellenangabe gestattet

Inhalt

	Seite
A. Text	
Die Tuberkulose im Jahr 1953	3
B. Tabellen	
1. Neuerkrankungen und Bestand an aktiver Tuberkulose im Bundesgebiet und in West-Berlin	5
2. Neuerkrankungen und Bestand an aktiver Tuberkulose in den Ländern des Bundes- gebietes	6
3. Sterbefälle an Tuberkulose (nach standes- amtlichen Meldungen)	6
4. Tuberkulose-Sterblichkeit in europäischen und außereuropäischen Ländern in verschie- denen Jahren seit 1913	7

Die Tuberkulose im Jahr 1953

Als Ausgangsmaterial für Untersuchungen über die Entwicklung der Tuberkulose im Jahre 1953 stehen im Bundesgebiet die Statistik der Tbc-Fürsorgestellten für die Erkrankungen und die Todesursachenstatistik für die Sterbefälle zur Verfügung.

Erkrankungen an Tuberkulose

Auf Grund der Meldepflicht für übertragbare Krankheiten erfassen die Tbc-Fürsorgestellten der Gesundheitsämter Personen mit tuberkulösen Erkrankungen und weisen die Neuzugänge und den Bestand der Erkrankten nach. Allerdings ist eine vollständige Erfassung aller Erkrankten durch die Tbc-Fürsorgestellten kaum möglich; die Ergebnisse der Tuberkulose-Morbiditätsstatistik dürfen daher nur als unterste Werte der Erkrankungshäufigkeit angesehen werden.

Um Mißverständnisse bei der Beurteilung der Ergebnisse über die Neuzugänge zu vermeiden, sind noch einige Vorbemerkungen erforderlich. Als Neuzugänge sollen eigentlich nur Personen, die erstmalig an Tuberkulose erkrankt sind, gezählt werden. Da von den Untersuchten aus den verschiedensten Gründen frühere tuberkulöse Erkrankungen nicht immer angegeben werden und u. a. bei Wohnungswechsel der Erkrankten Verwechslungen zwischen erstmalig Erkrankten und erstmalig in der Tbc-Fürsorgestelle Zugewandenen auftreten können, sind Fehler bei der Erfassung der Neuzugänge kaum zu vermeiden. Ferner muß darauf hingewiesen werden, daß die Zahl der Neuzugänge an Tuberkulösen im Anschluß an Reihenröntgendurchleuchtungen im allgemeinen ansteigt und daher zeitliche und örtliche Vergleiche der Ergebnisse nur bedingt möglich sind.


Neuzugänge an aktiver Tuberkulose im Bundesgebiet nach Alter und Geschlecht

Geschlecht Alter	Ansteckende Tbc der Atmungsorgane		Nichtansteck. Tbc der Atmungsorgane			Tuberkulose anderer Organe			
	1953	1952 ¹⁾	1953	1952 ¹⁾		1953	1952 ¹⁾		
	Anzahl	auf 10 000	Anzahl	auf 10 000		Anzahl	auf 10 000		
Kinder 0 bis unter 15 Jahre	614	0,6	0,6	22 552	20,2	21,4	3 628	3,3	3,6
Männer 15 Jahre und älter	18 702	10,8	11,5	21 981	12,7	13,6	4 685	2,7	2,8
Frauen 15 Jahre und älter	10 038	4,9	5,3	18 767	9,1	9,7	6 591	3,2	3,4
Insgesamt	29 364	6,0	6,4	63 300	12,9	13,8	14 884	3,0	3,2

¹⁾ Ohne Reg.-Bez. Südwürttemberg-Hohenzollern.

Bei den Neuzugängen hat sich im Jahre 1953 der Rückgang der Erkrankungsziffern fortgesetzt¹⁾. Im Vergleich zu den Ergebnissen des Jahres 1952 betrug die Senkung bei den drei Tuberkulosearten jeweils rund 6 vH.

Bei der Aufgliederung der Neuzugänge nach Alter und Geschlecht ist der Rückgang der Erkrankungsziffern gegenüber dem Vorjahr in fast allen Gruppen erkennbar. Lediglich bei den unter 15 Jahre alten Kindern hat sich nichts geändert.



Da Angaben über den Bestand an Tuberkulösen aufschlußreicher sind als die über Neuzugänge und sich außerdem Erhebungsfehler bei der Feststellung des Bestandes weniger auswirken als bei den Neuzugängen, werden für die Beurteilung der Erkrankungshäufigkeit an Tuberkulose in erster Linie die Ergebnisse des Bestandes herangezogen. Die Bestandsziffer der an ansteckender Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten war in der Nachkriegszeit bis auf 29,2 auf 10 000 der Bevölkerung (im Jahre 1951 angestiegen und ging erstmalig im Jahre 1952 mit 29,0 geringfügig zurück¹⁾). Das Ergebnis für das Jahr 1953 zeigte mit 28,1 im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls einen Rückgang. Die Bestandsziffer der Erkrankten an nichtansteckender Tuberkulose der Atmungsorgane im Jahre 1953 betrug 53,9 auf 10 000 (1952: 54,4) und die der an Tuberkulose anderer Organe 13,7 (1952: 14,0). Die seit Kriegsende zu beobachtende

¹⁾ Vgl. auch Abschnitt „Statistische Monatszahlen“, S. 334*.

Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten im Bundesgebiet

Art der Tuberkulose	1953		1952	1951	1950
	Anzahl	auf 10000 der Bevölkerung			
Ansteckende Tuberkulose der Atmungsorgane	138 488	28,1	29,0	29,2	28,6
Nichtansteckende Tuberkulose der Atmungsorgane	265 478	53,9	54,4	56,6	59,8
Tuberkulose anderer Organe	87 539	13,7	14,0	15,1	15,6

Abnahme der Bestandsziffern dieser beiden letzteren Tuberkulosearten hielt also auch im Jahre 1953 weiterhin an. Dieser Rückgang aller Tuberkuloseerkrankungsziffern darf aber nicht dazu führen, die Bekämpfung dieser Volksseuche einzuschränken, denn nach wie vor stellen im Bundesgebiet die rund 139 000 (in West-Berlin zusätzlich 12 000) an ansteckender Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten einen Gefahrenherd dar.

Die Aufgliederung des Bestandes der an aktiver Tuberkulose Erkrankten nach Geschlecht und Alter zeigte in den verschiedenen Gruppen eine unterschiedliche Entwicklung. Die Bestandsziffern der an ansteckender Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten sind 1953 gegenüber 1952 sowohl bei den Kindern als auch bei den über 15 Jahre alten Männern und Frauen zurückgegangen. Eine andere Entwicklung wiesen dagegen die Bestandsziffern der an nichtansteckender Tuberkulose der Atmungsorgane Erkrankten auf.

Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten im Bundesgebiet¹⁾ am Ende des Jahres nach Alter und Geschlecht

Geschlecht Alter	Ansteckende Tbc der Atmungsorgane		Nichtansteck. Tbc der Atmungsorgane		Tuberkulose anderer Organe				
	1953	1952	1953	1952	1953	1952			
	Anzahl	auf 10000	Anzahl	auf 10000	Anzahl	auf 10000			
Kinder 0 bis unter 15 Jahre	1 147	1,5	1,7	38 905	51,2	55,3	9 127	12,0	12,6
Männer 15 Jahre und älter	57 082	49,0	50,0	66 855	57,5	57,5	13 873	11,9	12,3
Frauen 15 Jahre und älter	31 053	22,2	23,7	56 460	40,4	40,1	18 360	13,1	13,2


¹⁾ Ohne Hamburg und Nordrhein-Westfalen.

Während bei den Kindern im Jahre 1953 die Bestandsziffer mit 51,2 gegenüber 1952 mit 55,3 einen deutlichen Rückgang zeigte, trat bei den über 15 Jahre alten Männern mit 57,5 keine Änderung ein, und bei den über 15 Jahre alten Frauen ist mit 40,4 gegenüber 40,1 sogar ein geringer Anstieg fest-

stellbar. Die Bestandsziffern der Erkrankten an Tuberkulose anderer Organe sind im Jahre 1953 bei den Kindern und bei den über 15 Jahre alten Männern und Frauen ebenso wie in den Vorjahren weiterhin abgesunken.

Sterbefälle an Tuberkulose

Der starke Rückgang der Sterblichkeit an Tuberkulose²⁾, und zwar sowohl an Tuberkulose der Atmungsorgane als auch der an Tuberkulose anderer Organe ist aus dem folgenden Schaubild deutlich zu erkennen. 1953 betrug im Bundesgebiet nach den vorläufigen Ergebnissen die Sterbeziffer an Tuberkulose der Atmungsorgane 1,8 auf 10 000 der Bevölkerung und ist gegenüber 1952 (2,3) um rund 20 vH gesunken. Auch die Sterbeziffer an Tuberkulose anderer Organe ist 1953 mit 0,3 auf 10 000 der Bevölkerung gegenüber 1952 (0,4) um 25 vH zurückgegangen.



Wie bereits früher betont, entwickelten sich die Erkrankungs- und die Sterbeziffern an Tuberkulose in den letzten Jahren uneinheitlich. Die bis 1951 ansteigende Erkrankungsziffer an ansteckender Tuberkulose der Atmungsorgane ging seit 1952 nur geringfügig zurück, während die Sterbeziffer an Tuberkulose der Atmungsorgane einen wesentlich höheren Rückgang aufwies. Dies ist dadurch zu erklären, daß eine große Zahl der Erkrankten an ansteckender Tuberkulose der Atmungsorgane, die früher nach kurzer Zeit durch Tod aus dem Bestand ausgeschieden wäre, jetzt lebend darin verbleibt; und der Rückgang des Bestandes wird daher ganz erheblich hinausgezögert.

²⁾ Vgl. auch Abschnitt „Statistische Monatszahlen“ S. 335*.

Neuerkrankungen und Bestand an aktiver Tuberkulose im Bundesgebiet und in West-Berlin

Zeit Land	Tuberkulose der Atmungsorgane				insgesamt	Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
	ansteckend (offen)		insgesamt	nicht-ansteckend (aktiv geschlossen)			
	mit Bazillen- nachweis	ohne Bazillen- nachweis					
Neuerkrankungen ¹⁾ an aktiver Tuberkulose							
Bundesgebiet							
1949 ²⁾	23 183	10 950	34 133	92 197	126 330	20 671	147 001
1950 ³⁾	23 227	10 105	33 332	73 204	106 536	16 392	122 928
1951 ⁴⁾	23 294	9 182	32 476	68 824	101 300	16 246	117 546
1952 ⁵⁾	22 275	8 006	30 281	65 195	95 476	15 321	110 797
1953 ⁵⁾	21 983	7 371	29 354	63 300	92 654	14 884	107 538
nach Ländern (1953)⁵⁾							
Schleswig-Holstein	1 177	545	1 722	4 593	6 315	995	7 300
Hamburg	796	448	1 244	4 406	5 652	472	6 124
Niedersachsen	2 931	1 275	4 206	9 794	14 000	1 699	15 699
Bremen	241	130	371	937	1 308	316	1 623
Nordrhein-Westfalen	7 484	1 763	9 247	18 030	27 277	4 143	31 420
Hessen	1 596	593	2 189	4 260	6 449	1 555	8 004
Rheinland-Pfalz	1 442	670	2 112	3 157	5 269	1 233	6 502
Baden-Württemberg	2 576	667	3 243	9 756	12 999	2 054	15 053
Bayern	3 738	1 260	5 018	8 367	13 365	2 218	15 603
West-Berlin							
1949	1 744	2 360	4 104	8 276	12 380	1 175	13 555
1950	1 644	1 725	3 369	5 667	9 036	675	9 711
1951	1 643	1 615	3 258	4 623	7 881	626	8 506
1952	1 569	1 385	2 954	4 090	7 044	589	7 633
1953	1 672	1 168	2 840	4 675	7 515	560	8 075
Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung							
Bundesgebiet							
1949 ²⁾	5,19	2,45	7,65	20,65	28,30	4,63	32,93
1950 ³⁾	5,00	2,18	7,18	15,76	22,94	3,55	26,47
1951 ⁴⁾	4,97	1,96	6,93	14,69	21,62	3,47	25,09
1952 ⁵⁾	4,71	1,69	6,41	13,79	20,20	3,24	23,44
1953 ⁵⁾	4,49	1,50	5,99	12,92	18,92	3,04	21,95
nach Ländern (1953)⁵⁾							
Schleswig-Holstein	4,93	2,29	7,22	19,26	26,48	4,13	30,61
Hamburg	4,68	2,63	7,31	25,84	33,15	2,77	35,92
Niedersachsen	4,42	1,92	6,35	14,78	21,12	2,86	23,99
Bremen	4,01	2,16	6,18	15,60	21,77	2,94	27,02
Nordrhein-Westfalen	5,32	1,25	6,57	12,62	19,39	2,94	22,33
Hessen	3,58	1,33	4,92	9,57	14,48	3,49	17,97
Rheinland-Pfalz	4,51	2,03	6,60	9,97	16,47	3,85	20,32
Baden-Württemberg	3,80	0,98	4,79	14,41	19,19	3,05	22,24
Bayern	4,08	1,40	5,47	9,12	14,60	2,42	17,02
West-Berlin							
1949	8,29	11,21	19,50	39,32	58,82	5,58	64,40
1950	7,69	8,07	15,75	26,50	42,25	3,16	45,40
1951	7,56	7,43	15,00	21,28	36,28	2,68	38,16
1952	7,23	6,38	13,62	18,95	32,47	2,71	35,18
1953	7,56	5,28	12,84	21,74	33,99	2,53	36,52
Bestand ⁶⁾ der an aktiver Tuberkulose Erkrankten							
Bundesgebiet							
1949	83 757 ^{a)}	47 773 ^{a)}	131 530 ^{a)}	314 411 ^{b)}	439 834 ^{c)}	77 316 ^{b)}	516 056 ^{c)}
1950	89 575	47 683	137 258	236 397	422 655	74 518	498 173
1951	94 555	46 490	141 045	273 345	414 390	73 157	487 547
1952	99 061	42 157	141 218	265 082	406 300	68 405	474 705
1953	100 477	38 021	138 498	265 476	403 974	67 539	471 513
nach Ländern (1953)							
Schleswig-Holstein	5 014	3 024	8 038	20 520	28 566	3 968	32 534
Hamburg	4 774	2 667	7 441	18 517	25 958	2 376	28 334
Niedersachsen	16 102	3 645	19 747	33 095	52 842	7 769	60 611
Bremen	1 189	1 199	2 688	5 630	8 318	1 388	9 706
Nordrhein-Westfalen	30 261	11 534	41 795	84 739	126 534	23 803	150 337
Hessen	7 887	1 757	9 644	17 999	27 643	6 101	33 744
Rheinland-Pfalz	5 673	3 267	8 940	14 438	23 379	5 605	28 984
Baden-Württemberg	12 784	4 142	16 926	38 011	54 937	8 658	63 595
Bayern	16 493	6 786	23 279	32 518	55 797	7 857	63 654
West-Berlin							
1949	8 222	5 920	14 142	25 258	39 400	5 599	44 999
1950	8 562	4 968	13 578	21 296	34 874	4 512	39 186
1951	8 786	4 246	13 031	20 306	33 337	3 373	37 030
1952	9 222	3 120	12 342	19 614	31 956	3 221	35 177
1953	9 843	2 190	12 033	19 049	31 082	2 593	33 675
Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung							
Bundesgebiet							
1949	17,70 ^{a)}	10,09 ^{a)}	27,79 ^{a)}	66,56 ^{b)}	95,16 ^{c)}	15,10 ^{b)}	111,65 ^{c)}
1950	18,69	9,95	26,65	59,77	88,42	15,55	103,97
1951	19,29	9,55	26,24	56,51	85,75	15,10	100,86
1952 ⁵⁾	20,34	8,65	26,99	54,42	83,41	14,04	97,46
1953 ⁵⁾	20,39	7,72	26,11	53,87	81,98	13,71	95,68
nach Ländern (1953)							
Schleswig-Holstein	21,38	12,30	34,28	87,55	121,83	17,01	138,84
Hamburg	27,71	15,48	43,19	107,48	150,67	13,79	164,46
Niedersachsen	24,38	5,52	29,90	50,10	80,00	11,76	91,76
Bremen	24,49	19,72	44,22	92,61	136,83	22,97	159,68
Nordrhein-Westfalen	21,21	8,08	29,29	59,39	88,68	16,06	105,36
Hessen	17,61	3,92	21,54	40,19	61,73	13,62	75,36
Rheinland-Pfalz	17,59	10,13	27,72	44,77	72,48	17,38	89,87
Baden-Württemberg	18,63	6,04	24,66	55,38	80,95	12,62	92,66
Bayern	18,00	7,41	25,41	35,49	60,90	8,57	69,47
West-Berlin							
1949	38,72	27,88	56,59	118,93	185,53	26,32	211,85
1950	38,90	23,19	52,09	98,84	160,93	20,94	181,87
1951	40,44	19,55	59,99	83,48	145,46	17,03	170,46
1952	42,17	14,27	56,43	89,68	146,11	14,73	160,84
1953	44,78	9,96	54,73	86,67	141,41	11,80	153,21

1) Nur Neuzugänge, keine Zugänge aus anderen Gruppen.- 2) Ohne Reg.-Bez. Südbaden, Südwürttemberg-Hohenzollern und Lindau.- 3) Ohne Reg.-Bez. Südwürttemberg-Hohenzollern und Lindau.- 4) Ohne Reg.-Bez. Südwürttemberg-Hohenzollern.- 5) Vorläufiges Ergebnis.- 6) Bestand am Ende des Jahres.- a) Ohne Kreis Reutlingen.- b) Ohne Kreis Reutlingen und Sigmaringen.- c) Ohne Reg.-Bez. Südwürttemberg-Hohenzollern und Lindau.

**Neuerkrankungen und Bestand an aktiver Tuberkulose in den Ländern des Bundesgebietes
auf 10 000 der Bevölkerung**

Land	Neuzugänge 1)					Bestand 3)				
	1949	1950	1951	1952	1953 2)	1949	1950	1951	1952	1953 2)
ansteckende Tbc. der Atmungsorgane										
Bundesgebiet	7,5 ^{a)}	7,1 ^{b)}	6,9 ^{b)}	6,4 ^{c)}	6,0	27,8 ^{d)}	28,7	29,2	29,0	28,1
Schleswig-Holstein	9,4	9,2	8,9	7,9	7,2	30,8	32,9	33,9	34,9	34,3
Hamburg	10,3	9,5	8,3	8,7	7,3	36,6	39,2	41,7	43,6	43,2
Niedersachsen	9,0	9,5	8,9	7,7	6,3	29,9	32,3	33,9	33,0	29,9
Bremen	8,3	7,5	7,0	5,4	6,2	34,6	39,0	42,3	42,2	44,2
Nordrhein-Westfalen	8,1	7,4	7,1	6,7	6,6	30,5	30,5	30,8	30,6	29,3
Hessen	6,3	5,9	5,2	5,3	4,9	21,8	23,2	22,2	22,3	21,5
Rheinland-Pfalz	7,3	7,4 ^{b)}	7,4 ^{b)}	7,0	6,6	24,1	26,1	26,3	27,4	27,7
Baden-Württemberg	6,7 ^{a)}	7,4 ^{b)}	5,6 ^{b)}	4,8 ^{c)}	4,8	26,7 ^{d)}	25,2	25,4	25,1	24,7
Bayern	6,1	6,0	6,0	5,6	5,5	24,4	25,4	26,1	25,2	25,4
nichtansteckende Tbc. der Atmungsorgane										
Bundesgebiet	20,3 ^{a)}	15,6 ^{b)}	14,7 ^{b)}	13,8 ^{c)}	12,9	66,6 ^{a)}	59,8	56,6	54,4	53,9
Schleswig-Holstein	34,7	26,8	26,1	25,6	19,3	115,4	98,7	92,8	90,2	87,6
Hamburg	44,1	31,5	28,1	29,3	25,8	126,6	115,9	115,6	107,2	107,5
Niedersachsen	22,3	31,5	19,1	16,6	14,8	68,2	61,7	58,8	53,2	50,1
Bremen	35,6	33,2	22,6	19,8	15,6	99,3	108,3	99,8	94,9	92,6
Nordrhein-Westfalen	21,1	14,5	13,4	12,9	12,8	75,7	67,9	61,6	59,2	59,4
Hessen	13,9	11,0	9,3	9,7	9,6	48,0	41,5	40,4	39,6	40,2
Rheinland-Pfalz	16,6	11,8 ^{b)}	11,6 ^{b)}	9,7 ^{c)}	9,9	54,5 ^{a)}	51,7	48,8	43,9	44,8
Baden-Württemberg	20,0 ^{a)}	20,1 ^{b)}	15,0 ^{b)}	13,7 ^{c)}	14,4	55,6 ^{a)}	51,6	52,2	54,8	55,4
Bayern	14,7	12,0	10,8	10,1	9,1	46,0	40,0	37,6	36,9	35,5
Tbc. anderer Organe										
Bundesgebiet	4,5 ^{a)}	3,5 ^{b)}	3,5 ^{b)}	3,2 ^{c)}	3,0	16,4 ^{e)}	15,6	15,1	14,0	13,7
Schleswig-Holstein	5,4	4,5	4,5	4,1	4,1	17,5	16,7	16,5	16,9	17,0
Hamburg	4,4	3,1	3,1	3,1	2,8	19,9	18,1	16,9	13,9	13,8
Niedersachsen	5,4	3,1	3,7	3,3	2,9	15,7	15,7	15,4	13,5	11,8
Bremen	7,3	6,3	5,7	6,4	5,2	22,4	22,2	19,3	21,6	22,8
Nordrhein-Westfalen	4,9	3,5	3,4	3,2	2,9	20,5	19,1	18,1	17,1	16,7
Hessen	4,4	3,9	3,8	3,4	3,5	14,3	13,9	13,9	13,4	13,6
Rheinland-Pfalz	6,5	4,6 ^{b)}	4,5 ^{b)}	4,0	3,9	20,9	20,6	18,3	17,5	17,4
Baden-Württemberg	4,2 ^{a)}	4,5 ^{b)}	3,6 ^{b)}	3,2 ^{c)}	3,0	14,9 ^{e)}	14,2	15,1	12,8	12,6
Bayern	3,1	2,4	2,4	2,5	2,4	10,3	9,2	9,1	8,6	8,6

1) Nur Neuzugänge, keine Zugänge aus anderen Gruppen. - 2) Vorläufiges Ergebnis. - 3) Bestand am Ende des Jahres. - a) Ohne die Reg.-Bez. Südbaden, Südwürttemberg-Hohenzollern und Lindau. - b) Ohne Reg.-Bez. Südwürttemberg-Hohenzollern und Lindau. - c) Ohne Reg.-Bez. Südwürttemberg-Hohenzollern. - d) Ohne Kreis Reutlingen. - e) Ohne Kreis Reutlingen und Biberach.

**Sterbefälle an Tuberkulose (nach standesamtlichen Meldungen)
auf 10 000 der Bevölkerung**

Land	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe				
	1949	1950	1951	1952	1953 1)	1949	1950	1951	1952	1953 1)
Bundesgebiet	4,2	3,3	3,1	2,3	1,8	0,8	0,7	0,6	0,4	0,3
Schleswig-Holstein	4,2	3,1	3,2	2,5	1,8	0,8	0,7	0,6	0,4	0,2
Hamburg	4,6	3,6	3,3	2,3	2,1	0,6	0,3	0,3	0,2	0,2
Niedersachsen	4,2	3,1	3,0	2,3	1,7	1,0	0,8	0,6	0,5	0,3
Bremen	5,1	3,5	3,2	2,3	2,1	0,6	0,8	0,6	0,6	0,2
Nordrhein-Westfalen	4,5	3,7	3,4	2,4	2,0	0,8	0,7	0,6	0,4	0,3
Hessen	3,6	2,8	2,7	2,0	1,6	0,8	0,6	0,5	0,4	0,3
Rheinland-Pfalz	4,2	3,1	3,1	2,2	1,9	1,1	0,8	0,7	0,5	0,3
Baden-Württemberg	3,8	2,8	2,6	1,9	1,6	0,8	0,7	0,7	0,5	0,3
Bayern	4,0	3,4	3,3	2,6	2,0	0,7	0,6	0,6	0,4	0,3

1) Vorläufiges Ergebnis.

**Tuberkulose-Sterblichkeit in europäischen und außereuropäischen Ländern
in verschiedenen Jahren seit 1913**

Verhältniszahlen auf 10000 der Bevölkerung

Land ¹⁾	1913	1921	1925	1929	1933	1937	1938
Europäische Länder:							
Belgien	12,0	11,1	10,1	9,7	7,9	7,1	6,8
Dänemark	.	9,6	9,2	7,4	5,8	4,4	4,1
Deutschland ²⁾	14,3	13,6	10,6	8,7	7,3	6,9	6,2
Finnland	26,1	22,5	24,9	25,0	20,0	20,0	19,9
Frankreich	21,4	19,2	15,9	16,7	13,1	11,9	11,7
Großbritannien							
England u. Wales	13,4	11,3	10,4	9,6)		6,8	6,2
Schottland	16,9	11,8	11,0	9,4)	8,2	7,4	6,9
Nordirland	.	17,8	16,7	12,9	11,5	9,8	9,2
Irland (Eire)	.	15,6	15,7	13,2	11,7	12,3	10,9
Italien	14,9	14,2	15,0	12,2	9,9	8,6	8,0
Niederlande	14,2	12,7	9,9	8,6	6,0	4,8	4,5
Norwegen	22,1	19,7	18,8	15,8	12,1	9,8	8,8
Österreich	28,1	21,6	17,1	15,0	.	10,0	9,9
Portugal	12,4	.	.	20,0	17,6	15,1	15,3
Schweden	18,5	15,6	14,6	13,0	10,3	8,6	8,2
Schweiz	20,1	16,4	15,2	13,2	10,6	8,7	8,2
Spanien	15,2	15,6	15,3	13,6	11,7	12,0	12,9
Außereurop. Länder:							
Australien	.	6,8	.	.	4,4	4,0	3,8
Chile	.	24,0	.	.	.	25,3	26,2
Japan	.	21,3	.	.	18,8	20,6	21,1
Kanada	.	7,5	.	.	6,5	6,0	5,5
Südafrikan. Union ⁵⁾	.	5,8	.	.	3,7	3,6	3,8
USA	14,4	9,9	8,5	7,5	6,0	5,4	4,9
	1946	1947	1948	1949	1950	1951	1952
Europäische Länder:							
Belgien	6,5	6,3	5,5	4,9	4,3	3,8	.
Dänemark	3,2	3,0	2,5	1,9	1,4	1,3	1,1
Deutschland ²⁾	8,3	7,3	6,7	5,0	3,9	3,7	2,7
Finnland	17,8	16,7	15,6	13,0	9,2	8,4	5,7
Frankreich	8,8	8,1	7,6	6,8	5,8	6,0	4,3
Großbritannien							
England u. Wales	5,5	5,5	5,0	4,5	3,6	3,1	2,4
Schottland	7,9	8,0	7,6	6,7	5,3	4,3	3,2
Nordirland	8,3	7,3	6,9	5,9	4,8	4,5	3,0
Irland (Eire)	11,4	12,4	10,4	8,9	7,9	7,1	5,4
Italien	8,4	7,7	6,2	4,9	4,3	4,1	.
Niederlande	4,7	3,7	2,8	2,4	1,9	1,6	1,2
Norwegen	6,4	5,6	5,2	3,8	2,9	2,4	.
Österreich	11,0	9,3	8,8	6,8	5,4	5,2	4,5
Portugal	15,7	15,3	14,8	14,9	14,2	13,1	9,6
Schweden	5,5	5,1	4,2	2,9	2,2	.	.
Schweiz	7,6	6,7	5,2	4,2	3,5	3,5	2,5
Spanien	11,9	12,4	11,4	11,4	10,4	.	.
Außereurop. Länder:							
Australien	3,2	3,0	2,8	2,5	2,0	1,7	.
Chile	23,6	22,4	22,6	20,2	15,9	15,2	.
Japan	26,1	18,6	17,8	16,9	14,6	11,1	.
Kanada ⁶⁾	4,7	4,3	3,7	3,0	2,5	2,4	.
Südafrikan. Union ⁵⁾	3,1	3,1	3,0	2,5	2,3	2,0	.
USA	3,6	3,4	3,0	2,8	2,7	2,0	1,6

¹⁾ Nach dem jeweiligen Gebietsstand. - ²⁾ 1939 einschl. Österreich und Sudetenland; ab 1946 Bundesrepublik (1946 u. 1947 ohne Rheinland-Pfalz und Reg.-Bez. Südbaden). - ³⁾ Nur Tbc der Atmungsorgane und Miliartbc. - ⁴⁾ Ohne Miliartbc. - ⁵⁾ Nur weiße Bevölkerung; 1951 nur europäische Bevölkerung. - ⁶⁾ 1951 ausschl. Yukon- u. Nordwestgebiete.