

STATISTISCHE BERICHTE



18. MRZ 2008


SRn

ZG 43

Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

Arb.-Nr. VIII/3/27

Erschienen am 25. September 1954



Erkrankungen an aktiver Tuberkulose
im Bundesgebiet und in West-Berlin
im 2. Vierteljahr 1954

(4120) V

Nachdruck - auch auszugsweise -
nur mit Quellenangabe gestattet.

Inhalt

| | Seite |
|--|-------|
| A. Vorbemerkungen | 3 |
| B. <u>Tabellen</u> | |
| 1. Neuerkrankungen an aktiver Tuberkulose im Bundesgebiet und in West-Berlin im 2. Vierteljahr 1954 | 4 |
| 2. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten im Bundesgebiet und in West-Berlin im 2. Vierteljahr 1954 | 5 |
| 3. Neuerkrankungen und Bestand an aktiver Tuberkulose im Bundesgebiet und in West-Berlin (auf 10 000 der Bevölkerung) | 6 |
| 4. Die Sterbefälle an Tuberkulose der Atmungsorgane und Tuberkulose anderer Organe einschließlich Milartuberkulose (auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr) | 7 |

Erkrankungen an aktiver Tuberkulose
im Bundesgebiet und in West-Berlin
im 2. Vierteljahr 1954

Vorbemerkungen

Bezüglich grundsätzlicher Fragen verweisen wir auf die vorausgegangenen Statistischen Berichte. Es sei weiterhin noch bemerkt, daß es sich bei den mitgeteilten Zahlen, solange die Untersuchungen auf freiwilliger Basis erfolgen, immer nur um die e r f a s s t e n Erkrankungen handelt und damit um die untersten Werte. Bei der Beurteilung der Tuberkulose-Morbidität muß auch beachtet werden, daß durch die Statistik der Neuerkrankungen nur die Neuzugänge (erstmalig Erkrankte) erfaßt werden, nicht aber die Besserungen oder Verschlechterungen (Verschiebungen zwischen den Gruppen).

Um das Bild über die Tuberkulose im Bundesgebiet und in West-Berlin abzurunden, werden in der Anlage auch die Tuberkulosesterbeziffern des 1. und 2. Vierteljahres 1954 und zum Vergleich diejenigen der 4 Vierteljahre 1953 auf Grund der standesamtlichen Meldungen beigelegt.

Neuerkrankungen ¹⁾ an aktiver Tuberkulose
im Bundesgebiet und in West-Berlin
im 2. Vierteljahr 1954

| L a n d | Tuberkulose der Atmungsorgane | | | | | Tuberkulose anderer Organe | Tuberkulose aller Formen insgesamt |
|---------------------|---|----------------------------|-----------|--|-----------|----------------------------------|---|
| | ansteckend (offen) | | | nichtan- steckend (aktiv ge- schlossen) | insgesamt | | |
| | mit Bazil- lennachweis | ohne Bazil- lennachweis | insgesamt | | | | |
| | <u>Grundzahlen</u> | | | | | | |
| Schleswig-Holstein | 289 | 114 | 403 | 1 022 | 1 425 | 204 | 1 629 |
| Hamburg | 226 | 91 | 317 | 1 159 | 1 476 | 109 | 1 585 |
| Niedersachsen | 718 | 239 | 957 | 2 255 | 3 212 | 532 | 3 744 |
| Bremen | 51 | 33 | 84 | 191 | 275 | 69 | 344 |
| Nordrhein-Westfalen | 1 729 | 316 | 2 045 | 3 981 | 6 026 | 890 | 6 916 |
| Hessen | 320 | 132 | 452 | 993 | 1 445 | 335 | 1 780 |
| Rheinland-Pfalz | 359 | 135 | 494 | 853 | 1 347 | 302 | 1 649 |
| Baden-Württemberg | 587 | 152 | 739 | 2 218 | 2 957 | 501 | 3 458 |
| Bayern | 877 | 208 | 1 085 | 2 139 | 3 224 | 496 | 3 720 |
| Bundesgebiet | 5 156 | 1 420 | 6 576 | 14 811 | 21 387 | 3 438 | 24 825 |
| West-Berlin | 366 | 233 | 599 | 1 100 | 1 699 | 147 | 1 846 |
| | <u>Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr</u> | | | | | | |
| Schleswig-Holstein | 4,91 | 1,94 | 6,86 | 17,38 | 24,24 | 3,47 | 27,70 |
| Hamburg | 5,18 | 2,09 | 7,27 | 26,57 | 33,84 | 2,50 | 36,34 |
| Niedersachsen | 4,32 | 1,44 | 5,75 | 13,56 | 19,31 | 3,20 | 22,51 |
| Bremen | 3,29 | 2,14 | 5,43 | 12,36 | 17,78 | 4,47 | 22,25 |
| Nordrhein-Westfalen | 4,78 | 0,87 | 5,65 | 11,00 | 16,65 | 2,46 | 19,10 |
| Hessen | 2,83 | 1,17 | 3,99 | 8,77 | 12,76 | 2,96 | 15,72 |
| Rheinland-Pfalz | 4,40 | 1,66 | 6,05 | 10,45 | 16,50 | 3,70 | 20,20 |
| Baden-Württemberg | 3,37 | 0,87 | 4,25 | 12,74 | 16,99 | 2,88 | 19,87 |
| Bayern | 3,80 | 0,90 | 4,70 | 9,26 | 13,96 | 2,15 | 16,11 |
| Bundesgebiet | 4,14 | 1,14 | 5,28 | 11,89 | 17,16 | 2,76 | 19,92 |
| West-Berlin | 6,63 | 4,22 | 10,85 | 19,92 | 30,77 | 2,66 | 33,43 |

¹⁾ Nur Neuzugänge, keine Zugänge aus anderen Gruppen.

Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten
im Bundesgebiet und in West-Berlin

am 30.6.1954

| Land | Tuberkulose der Atmungsorgane | | | | | Tuberkulose anderer Organe | Tuberkulose aller Formen insgesamt |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|----------------------------|------------------------------------|
| | ansteckend (offen) | | | nichtansteckend (aktiv geschlossen) | insgesamt | | |
| | mit Bazillennachweis | ohne Bazillennachweis | insgesamt | | | | |
| | <u>Grundzahlen</u> | | | | | | |
| Schleswig-Holstein | 4 980 | 3 079 | 8 059 | 19 804 | 27 863 | 3 951 | 31 814 |
| Hamburg | 4 759 | 2 568 | 7 327 | 18 889 | 26 216 | 2 413 | 28 629 |
| Niedersachsen | 15 938 | 2 907 | 18 845 | 33 705 | 52 550 | 7 725 | 60 275 |
| Erzmeten | 1 400 | 1 249 | 2 649 | 5 417 | 8 066 | 1 379 | 9 445 |
| Nordrhein-Westfalen | 30 286 | 10 147 | 40 433 | 84 771 | 125 204 | 23 427 | 148 631 |
| Hessen | 7 553 | 1 588 | 9 141 | 17 728 | 26 869 | 5 785 | 32 654 |
| Rheinland-Pfalz | 5 760 | 3 179 | 8 939 | 15 023 | 23 962 | 5 678 | 29 640 |
| Baden-Württemberg | 12 818 | 3 798 | 16 616 | 37 835 | 54 451 | 8 588 | 63 039 |
| Bayern | 16 659 | 5 556 | 22 215 | 33 233 | 55 448 | 7 938 | 63 386 |
| Bundesgebiet | 100 153 | 34 071 | 134 224 | 266 405 | 400 629 | 66 884 | 467 513 |
| West-Berlin | 9 700 | 2 053 | 11 753 | 19 266 | 31 019 | 2 451 | 33 470 |

| | <u>Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung</u> | | | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|--------|--------|-------|--------|
| Schleswig-Holstein | 21,38 | 13,22 | 34,60 | 85,03 | 119,63 | 16,96 | 136,59 |
| Hamburg | 27,46 | 14,82 | 42,27 | 108,98 | 151,26 | 13,92 | 165,18 |
| Niedersachsen | 24,17 | 4,41 | 28,58 | 51,11 | 79,69 | 11,71 | 91,40 |
| Erzmeten | 22,78 | 20,33 | 43,11 | 88,15 | 131,26 | 22,44 | 153,70 |
| Nordrhein-Westfalen | 21,05 | 7,05 | 28,10 | 58,92 | 87,02 | 16,28 | 103,31 |
| Hessen | 16,80 | 3,53 | 20,33 | 39,44 | 59,77 | 12,87 | 72,64 |
| Rheinland-Pfalz | 17,76 | 9,80 | 27,55 | 46,31 | 73,86 | 17,50 | 91,37 |
| Baden-Württemberg | 18,54 | 5,49 | 24,03 | 54,72 | 78,75 | 12,42 | 91,17 |
| Bayern | 18,18 | 6,06 | 24,25 | 36,27 | 60,51 | 8,66 | 69,18 |
| Bundesgebiet | 20,24 | 6,89 | 27,13 | 53,85 | 80,98 | 13,52 | 94,50 |
| West-Berlin | 44,27 | 9,37 | 53,64 | 97,93 | 141,57 | 11,19 | 152,75 |

Neuerkrankungen und Bestand an aktiver Tuberkulose
im Bundesgebiet und in West-Berlin
(vorläufiges Ergebnis)

| Gebiet Berichtszeit | Tuberkulose der Atmungsorgane | | | | | Tuberkulose anderer Organe | Tuberkulose aller Formen insgesamt | |
|---|-------------------------------|----------------------------|-----------|--|-----------|----------------------------------|---|-------|
| | ansteckend (offen) | | | nichtan- steckend (aktiv ge- schlossen) | insgesamt | | | |
| | mit Bazil- lennachweis | ohne Bazil- lennachweis | insgesamt | | | | | |
| <u>Neuerkrankungen ¹⁾</u> auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr | | | | | | | | |
| Bundesgebiet | | | | | | | | |
| 1953 | 1. Vierteljahr | 4,79 | 1,57 | 6,36 | 13,10 | 19,46 | 3,23 | 22,69 |
| | 2. Vierteljahr | 4,81 | 1,78 | 6,59 | 13,74 | 20,33 | 3,28 | 23,62 |
| | 3. Vierteljahr | 4,43 | 1,46 | 5,89 | 12,86 | 18,74 | 3,02 | 21,75 |
| | 4. Vierteljahr | 3,89 | 1,20 | 5,08 | 11,85 | 16,94 | 2,59 | 19,52 |
| 1954 | 1. Vierteljahr | 4,34 | 1,16 | 5,50 | 12,23 | 17,73 | 2,92 | 20,65 |
| | 2. Vierteljahr | 4,14 | 1,14 | 5,28 | 11,89 | 17,16 | 2,76 | 19,92 |
| West-Berlin | | | | | | | | |
| 1953 | 1. Vierteljahr | 8,14 | 5,56 | 13,70 | 21,15 | 34,84 | 2,88 | 37,72 |
| | 2. Vierteljahr | 8,33 | 6,77 | 15,10 | 22,16 | 37,26 | 2,60 | 39,85 |
| | 3. Vierteljahr | 7,32 | 4,71 | 12,02 | 21,10 | 33,12 | 2,08 | 35,20 |
| | 4. Vierteljahr | 6,48 | 4,12 | 10,60 | 20,14 | 30,74 | 2,57 | 33,32 |
| 1954 | 1. Vierteljahr | 7,37 | 4,20 | 11,57 | 22,81 | 34,38 | 2,50 | 36,87 |
| | 2. Vierteljahr | 6,63 | 4,22 | 10,85 | 19,92 | 30,77 | 2,66 | 33,43 |

| <u>Bestand ²⁾</u> auf 10 000 der Bevölkerung | | | | | | | | |
|--|----------------|-------|------|-------|-------|--------|-------|--------|
| Bundesgebiet | | | | | | | | |
| 1953 | 1. Vierteljahr | 20,40 | 8,47 | 28,86 | 54,08 | 82,95 | 13,98 | 96,92 |
| | 2. Vierteljahr | 20,56 | 8,51 | 29,07 | 54,36 | 83,42 | 14,05 | 97,47 |
| | 3. Vierteljahr | 20,70 | 8,38 | 29,08 | 54,64 | 83,72 | 14,06 | 97,79 |
| | 4. Vierteljahr | 20,39 | 7,72 | 28,11 | 53,87 | 81,98 | 13,71 | 95,68 |
| 1954 | 1. Vierteljahr | 20,18 | 7,19 | 27,36 | 53,57 | 80,93 | 13,49 | 94,42 |
| | 2. Vierteljahr | 20,24 | 6,89 | 27,13 | 53,85 | 80,98 | 13,52 | 94,50 |
| West-Berlin | | | | | | | | |
| 1954 | 1. Vierteljahr | 44,68 | 9,53 | 54,22 | 87,26 | 141,48 | 11,38 | 152,86 |
| | 2. Vierteljahr | 44,27 | 9,37 | 53,64 | 87,93 | 141,57 | 11,19 | 152,75 |

¹⁾ Nur Neuzugänge, keine Zugänge aus anderen Gruppen. - ²⁾ Bestand am Ende des Vierteljahres.

Sterbefälle an Tuberkulose der Atmungsorgane
in den Ländern des Bundesgebietes und in West-Berlin
 (auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr)
 vorläufiges Ergebnis der standesamtlichen Meldungen

| L a n d | 1953 | | | | 1954 | |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 1. Vj. | 2. Vj. | 3. Vj. | 4. Vj. | 1. Vj. | 2. Vj. |
| Schleswig-Holstein | 2,3 | 1,6 | 1,4 | 2,0 | 2,6 | 1,7 |
| Hamburg | 2,5 | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 2,5 | 1,8 |
| Niedersachsen | 2,2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 1,7 |
| Bremen | 3,2 | 1,8 | 1,6 | 1,6 | 2,5 | 1,7 |
| Nordrhein-Westfalen | 2,6 | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 2,2 | 1,8 |
| Hessen | 2,4 | 1,3 | 1,0 | 1,5 | 1,7 | 1,3 |
| Rheinland-Pfalz | 2,8 | 1,7 | 1,5 | 1,7 | 2,0 | 1,9 |
| Baden-Württemberg | 2,1 | 1,4 | 1,2 | 1,5 | 1,7 | 1,4 |
| Bayern | 2,6 | 1,9 | 1,6 | 1,9 | 2,1 | 2,1 |
| Bundesgebiet | 2,5 | 1,6 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 1,7 |
| West-Berlin | 3,8 | 2,4 | 2,3 | 3,3 | 3,6 | 2,7 |

Sterbefälle an Tuberkulose anderer Organe
(insbes. Miliartuberkulose)
in den Ländern des Bundesgebietes und in West-Berlin
 (auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr)
 vorläufiges Ergebnis der standesamtlichen Meldungen

| L a n d | 1953 | | | | 1954 | |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 1. Vj. | 2. Vj. | 3. Vj. | 4. Vj. | 1. Vj. | 2. Vj. |
| Schleswig-Holstein | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 |
| Hamburg | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
| Niedersachsen | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Bremen | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
| Nordrhein-Westfalen | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 |
| Hessen | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Rheinland-Pfalz | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
| Baden-Württemberg | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Bayern | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Bundesgebiet | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
| West-Berlin | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |