

18. MARZ 2009

San



STATISTISCHE BERICHTE

2643



Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

Arb.-Nr. VIII/3/37

Erschienen am 17. Dezember 1956

Signatur ZS 1
3A 7 II 6

Die Tuberkulose
im Bundesgebiet und in Berlin (West)
im 2. Vierteljahr 1956

(5914)

Nachdruck - auch auszugsweise -
nur mit Quellenangabe gestattet

I n h a l t

	Seite
A. Vorbemerkungen	3
B. <u>Tabellen</u>	
1. Neuzugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten im Bundesgebiet und in Berlin (West) im 2. Vierteljahr 1956 (Grund- und Verhältniszahlen)	4
2. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten im Bundesgebiet und in Berlin (West) am 30. 6. 1956 (Grund- und Verhältniszahlen)	5
3. Neuzugänge und Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten im Bundesgebiet und in Berlin (West) (auf 10 000 der Bevölkerung)	6
4. Sterbefälle an Tuberkulose der Atmungsorgane und Tuberkulose anderer Organe (auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr)	7
C. <u>Schaubild</u>	
Neuzugänge und Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten (auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr)	8
Sterbefälle an Tuberkulose (auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr)	8

Die Tuberkulose
im Bundesgebiet und in Berlin (West)
im 2. Vierteljahr 1956

Nach Abschluß des 2. Weltkrieges wurde in den Ländern des Bundesgebietes und in Berlin (West) die Tuberkulose-Morbiditätsstatistik neu aufgebaut. Auf Grund der Meldepflicht für übertragbare Krankheiten vom 1.12.1938 werden durch die Tuberkulose-Fürsorgestellen der Gesundheitsämter die an Tuberkulose erkrankten Personen erfaßt. Diese laufend ergänzten Angaben dienen auch der Auszählung der Neuzugänge und des Bestandes der Tuberkulösen. Als Neuzugänge werden erkrankte Personen ausgewiesen, die erstmalig von den Tuberkulose-Fürsorgestellen in dem jeweiligen Berichtszeitraum registriert worden sind. Der Bestand an Erkrankten wird jeweils am Ende des Berichtszeitraumes ausgezählt.

Da eine vollständige Erfassung aller Erkrankten durch die Tbc-Fürsorgestellen kaum möglich ist, dürfen die Ergebnisse der Tuberkulose-Morbiditätsstatistik nur als unterste Werte der Erkrankungshäufigkeit angesehen werden.

Um das Bild über die Tuberkulose im Bundesgebiet und in Berlin (West) abzurunden, werden in der Anlage auch die Tuberkulosesterbeziffern des 1. und 2. Vierteljahres 1956 und zum Vergleich die der vier Vierteljahre 1955 auf Grund der standesamtlichen Meldungen beigelegt.

Neuzugänge¹⁾ der an aktiver Tuberkulose Erkrankten

im Bundesgebiet und in Berlin (West)

im 2. Vierteljahr 1956

(Vorläufiges Ergebnis)

Land	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
	ansteckend (offen)			nicht ansteckend (aktiv geschlossen)	insgesamt		
	mit Bazillennachweis	ohne Bazillennachweis	insgesamt				
	Grundzahlen						
Schleswig-Holstein	209	102	311	834	1 145	184	1 329
Hamburg	180	101	281	1 018	1 299	119	1 418
Niedersachsen	586	172	758	1 938	2 696	476	3 172
Bremen	54	29	83	180	263	71	334
Nordrhein-Westfalen	1 593	255	1 848	3 813	5 661	878	6 539
Hessen	362	84	446	836	1 282	317	1 599
Rheinland-Pfalz	285	114	399	684	1 083	312	1 395
Baden-Württemberg	530	120	650	2 185	2 835	547	3 382
Bayern	856	290	1 146	2 354	3 500	441	3 941
Bundesgebiet	4 655	1 267	5 922	13 842	19 764	3 345	23 109
Berlin (West)	341	181	522	1 104	1 626	135	1 761

Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr

Schleswig-Holstein	3,7	1,8	5,5	14,7	20,2	3,2	23,5
Hamburg	4,0	2,3	6,3	22,8	29,1	2,7	31,8
Niedersachsen	3,6	1,1	4,6	11,9	16,5	2,9	19,4
Bremen	3,4	1,8	5,2	11,2	16,3	4,4	20,7
Nordrhein-Westfalen	4,3	0,7	5,0	10,2	15,2	2,4	17,5
Hessen	3,2	0,7	3,9	7,3	11,2	2,8	14,0
Rheinland-Pfalz	3,4	1,4	4,8	8,3	13,1	3,8	16,9
Baden-Württemberg	3,0	0,7	3,6	12,2	15,8	3,0	18,8
Bayern	3,7	1,3	5,0	10,3	15,3	1,9	17,2
Bundesgebiet	3,7	1,0	4,7	11,0	15,7	2,7	18,4
Berlin (West)	6,2	3,3	9,5	20,1	29,6	2,5	32,0

1) Nur Neuzugänge, keine Zugänge aus anderen Gruppen.

Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten
im Bundesgebiet und in Berlin (West)

30.6. 1956

Land	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
	ansteckend (offen)			nicht ansteckend (aktiv geschlossen)	insgesamt		
	mit Bazillennachweis	ohne Bazillennachweis	insgesamt				
	Grundzahlen						
Schleswig-Holstein	4 173	2 577	6 750	17 558	24 308	3 532	27 840
Hamburg	4 469	2 489	6 958	17 863	24 821	2 085	26 906
Niedersachsen	13 373	2 048	15 421	31 667	47 088	7 230	54 318
Bremen	1 373	1 158	2 531	5 282	7 813	1 264	9 077
Nordrhein-Westfalen	26 798	7 127	33 925	74 579	108 504	20 628	129 132
Hessen	6 767	1 068	7 835	15 583	23 418	5 418	28 836
Rheinland-Pfalz	5 750	3 038	8 788	15 824	24 612	5 615	30 227
Baden-Württemberg	11 209	2 304	13 513	32 732	46 245	7 820	54 065
Bayern	16 269	3 987	20 256	32 523	52 779	6 990	59 769
Bundesgebiet	90 181	25 796	115 977	243 611	359 588	60 582	420 170
Berlin (West)	9 311	1 084	10 395	21 333	31 728	2 360	34 088
	Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung						
Schleswig-Holstein	18,4	11,3	29,7	77,3	107,0	15,6	122,6
Hamburg	24,9	13,9	38,8	99,6	138,4	11,6	150,1
Niedersachsen	20,4	3,1	23,6	48,4	72,0	11,1	83,0
Bremen	21,2	17,8	39,0	81,4	120,4	19,5	139,9
Nordrhein-Westfalen	17,9	4,8	22,6	49,8	72,4	13,8	86,1
Hessen	14,7	2,3	17,0	33,9	50,9	11,8	62,6
Rheinland-Pfalz	17,3	9,1	26,4	47,6	74,0	16,9	90,9
Baden-Württemberg	15,5	3,2	18,7	45,3	63,9	10,8	74,8
Bayern	17,7	4,3	22,0	35,4	57,4	7,6	65,0
Bundesgebiet	17,8	5,1	22,9	48,1	71,1	12,0	83,0
Berlin (West)	42,2	4,9	47,2	96,8	143,9	10,7	154,6

Neuzugänge und Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten
im Bundesgebiet und in Berlin (West)
(Vorläufiges Ergebnis)

Gebiet Berichtszeit	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderere Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt	
	ansteckend (offen)			nicht- ansteckend (aktiv geschlossen)	insgesamt			
	mit Bazillen- nachweis	ohne Bazillen- nachweis	insgesamt					
Neuzugänge¹⁾								
auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr								
Bundesgebiet								
1955	1. Vierteljahr	4,0	1,1	5,1	10,9	16,0	2,9	18,9
	2. Vierteljahr	3,9	1,0	4,9	11,2	16,1	3,0	19,0
	3. Vierteljahr	3,7	1,2	4,9	10,5	15,4	2,6	18,1
	4. Vierteljahr	3,6	1,1	4,6	10,1	14,8	2,5	17,3
1956	1. Vierteljahr	3,4	1,0	4,4	10,3	14,7	2,5	17,2
	2. Vierteljahr	3,7	1,0	4,7	11,0	15,7	2,7	18,4
Berlin (West)								
1955	1. Vierteljahr	6,5	3,3	9,8	20,4	30,2	2,8	33,0
	2. Vierteljahr	6,1	3,8	9,9	18,8	28,7	2,7	31,4
	3. Vierteljahr	6,1	3,3	9,4	19,5	29,0	2,2	31,2
	4. Vierteljahr	6,0	3,3	9,2	20,0	29,2	2,5	31,8
1956	1. Vierteljahr	6,1	3,6	9,7	20,5	30,3	2,0	32,2
	2. Vierteljahr	6,2	3,3	9,5	20,1	29,6	2,5	32,0
Bestand²⁾								
auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr								
Bundesgebiet								
1955	1. Vierteljahr	19,2	5,8	25,0	51,1	76,1	12,6	88,7
	2. Vierteljahr	19,0	5,7	24,7	51,1	75,8	12,6	88,4
	3. Vierteljahr	18,9	5,6	24,6	50,8	75,3	12,6	88,0
	4. Vierteljahr	18,4	5,5	23,9	49,5	73,3	12,3	85,6
1956	1. Vierteljahr	18,0	5,3	23,4	48,7	71,9	12,0	83,9
	2. Vierteljahr	17,8	5,1	22,9	48,1	71,1	12,0	83,0
Berlin (West)								
1955	1. Vierteljahr	45,0	5,1	50,1	91,2	141,3	11,0	152,3
	2. Vierteljahr	44,8	5,2	50,0	92,2	142,2	11,0	153,2
	3. Vierteljahr	44,7	5,3	50,0	93,9	143,8	11,0	154,9
	4. Vierteljahr	43,9	5,0	48,8	95,6	144,4	11,1	155,4
1956	1. Vierteljahr	42,6	5,1	43,1	95,3	138,4	10,8	155,2
	2. Vierteljahr	42,2	4,9	47,2	96,8	143,9	10,7	154,6

1) Nur Neuzugänge, keine Zugänge aus anderen Gruppen.- 2) Bestand am Ende des jeweiligen Vierteljahres.

Sterbefälle an Tuberkulose der Atmungsorgane
in den Ländern des Bundesgebietes und in Berlin (West)
(standesamtliche Meldungen)

Auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr
(vorläufiges Ergebnis)

Land	1955				1956	
	1. Vj.	2. Vj.	3. Vj.	4. Vj.	1. Vj.	2. Vj.
Schleswig-Holstein	2,2	2,0	1,8	1,9	2,0	1,9
Hamburg	1,8	2,0	1,6	2,2	2,0	1,9
Niedersachsen	1,6	1,7	1,5	1,8	1,8	1,7
Bremen	2,6	2,2	1,5	1,8	1,5	1,7
Nordrhein-Westfalen	2,3	1,7	1,5	1,9	2,2	1,8
Hessen	1,8	1,3	1,2	1,4	1,5	1,4
Rheinland-Pfalz	1,8	1,5	1,4	1,8	1,6	1,9
Baden-Württemberg	1,8	1,4	1,2	1,6	1,8	1,5
Bayern	2,4	2,2	1,8	1,9	2,2	2,0
Bundesgebiet	2,1	1,7	1,5	1,8	2,0	1,8
Berlin (West)	3,6	3,0	2,9	3,2	2,8	2,5

Sterbefälle an Tuberkulose anderer Organe
(einschl. Miliartuberkulose)
in den Ländern des Bundesgebietes und in Berlin (West)
(standesamtliche Meldungen)


Auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr
(vorläufiges Ergebnis)

Land	1955				1956	
	1. Vj.	2. Vj.	3. Vj.	4. Vj.	1. Vj.	2. Vj.
Schleswig-Holstein	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2	0,3
Hamburg	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Niedersachsen	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2
Bremen	0,3	0,2	0,3	-	0,05	0,2
Nordrhein-Westfalen	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Hessen	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Rheinland-Pfalz	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2
Baden-Württemberg	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,2
Bayern	0,3	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2
Bundesgebiet	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
Berlin (West)	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3


NEUZUGÄNGE UND BESTAND DER AN AKTIVER TUBERKULOSE ERKRANKTEN

Auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr

NEUZUGÄNGE IM VIERTELJAHR




BESTAND AM ENDE DES JEWEILIGEN VIERTELJAHRES



STAT. BUNDESAMT 56-0247

STERBEFÄLLE AN TUBERKULOSE

Auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr



STAT. BUNDESAMT 56-0248