

STATISTISCHE BERICHTE



18. MRZ 2009 S84

L643



Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

Arb.-Nr. VIII/3/39

Erschienen am 24. April 1957

Die Tuberkulose

im Bundesgebiet und in Berlin (West)

im 4. Vierteljahr 1956

3 A 7 II b

(6181) V

Nachdruck - auch auszugsweise -
nur mit Quellenangabe gestattet.

I n h a l t

	Seite
A. Vorbemerkungen	3
B. <u>Tabellen</u>	
1. Neuzugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten im Bundesgebiet und in Berlin (West) im 4. Vierteljahr 1956 (Grund- und Verhältniszahlen)	4
2. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten im Bundesgebiet und in Berlin (West) am 31.12.1956 (Grund- und Verhältniszahlen)	5
3. Neuzugänge und Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten im Bundesgebiet und in Berlin (West) (auf 10 000 der Bevölkerung)	6
4. Sterbefälle an Tuberkulose der Atmungsorgane und Tuberkulose anderer Organe (auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr)	7
C. <u>Schaubild</u>	
Neuzugänge und Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten (auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr)	8
Sterbefälle an Tuberkulose (auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr)	8
Veröffentlichungen der Statistischen Landesämter über "Gesundheitswesen unter der Nr. A IV"	

Die Tuberkulose
im Bundesgebiet und in Berlin (West)
im 4. Vierteljahr 1956

Nach Abschluß des 2. Weltkrieges wurde in den Ländern des Bundesgebietes und in Berlin (West) die Tuberkulose-Morbiditätsstatistik neu aufgebaut. Auf Grund der Meldepflicht für übertragbare Krankheiten vom 1.12.1938 werden durch die Tuberkulose-Fürsorgestellten der Gesundheitsämter die an aktiver Tuberkulose erkrankten Personen erfaßt. Diese laufend ergänzten Angaben dienen auch der Auszählung der Neuzugänge und des Bestandes der Tuberkulösen. Als Neuzugänge werden erkrankte Personen ausgewiesen, die erstmalig von den Tuberkulose-Fürsorgestellten in dem jeweiligen Berichtszeitraum registriert worden sind. Der Bestand an Erkrankten wird jeweils am Ende des Berichtsraumes ausgezählt.

Da eine vollständige Erfassung aller Erkrankten durch die Tbc-Fürsorgestellten kaum möglich ist, dürfen die Ergebnisse der Tuberkulose-Morbiditätsstatistik nur als unterste Werte der Erkrankungshäufigkeit angesehen werden.

Um das Bild über die Tuberkulose im Bundesgebiet und in Berlin (West) abzurunden, werden in der Anlage auch die Tuberkulosesterbeziffern der vier Vierteljahre 1956 und zum Vergleich die der vier Vierteljahre 1955 auf Grund der standesamtlichen Meldungen beigelegt.

Neuzugänge¹⁾ der an aktiver Tuberkulose Erkrankten
im Bundesgebiet und in Berlin (West)
im 4. Vierteljahr 1956
(Vorläufiges Ergebnis)

L a n d	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
	ansteckend (offen)			nicht-ansteckend (aktiv geschlossen)	insgesamt		
	mit Bazillennachweis	ohne Bazillennachweis	insgesamt				
Grundzahlen							
Schleswig-Holstein	181	103	284	722	1 006	158	1 164
Hamburg	151	59	210	995	1 205	93	1 298
Niedersachsen	451	156	607	1 415	2 022	372	2 394
Bremen	24	22	46	146	192	54	246
Nordrhein-Westfalen	1 413	248	1 661	3 459	5 120	644	5 964
Hessen	294	90	384	626	1 010	240	1 250
Rheinland-Pfalz	231	113	344	584	928	204	1 132
Baden-Württemberg	432	124	556	1 947	2 503	412	2 915
Bayern	731	236	967	2 044	3 011	456	3 467
Bundesgebiet	3 908	1 151	5 059	11 938	16 997	2 833	19 830
Berlin (West)	273	122	395	958	1 353	131	1 484
Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr							
Schleswig-Holstein	3,2	1,8	5,0	12,6	17,6	2,8	20,3
Hamburg	3,3	1,3	4,7	22,0	26,7	2,1	28,8
Niedersachsen	2,7	0,9	3,7	8,6	12,3	2,3	14,5
Bremen	1,5	1,3	2,8	8,9	11,8	3,3	15,1
Nordrhein-Westfalen	3,7	0,7	4,4	9,2	13,6	2,2	15,8
Hessen	2,5	0,8	3,3	5,4	8,7	2,1	10,8
Rheinland-Pfalz	2,8	1,3	4,1	7,0	11,1	2,4	13,5
Baden-Württemberg	2,4	0,7	3,1	10,7	13,8	2,3	16,0
Bayern	3,2	1,0	4,2	8,8	13,0	2,0	15,0
Bundesgebiet	3,1	0,9	4,0	9,4	13,3	2,2	15,6
Berlin (West)	4,9	2,2	7,1	17,2	24,3	2,4	26,7

1) Nur Neuzugänge, keine Zugänge aus anderen Gruppen

Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten

im Bundesgebiet und in Berlin (West)

am 31.12.1956)

(Vorläufiges Ergebnis)

L a n d	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
	ansteckend (offen)			nicht- ansteckend (aktiv geschlossen)	insgesamt		
	mit Bazillen- nachweis	ohne Bazillen- nachweis	insgesamt				
	Grundzahlen						
Schleswig-Holstein	3 833	2 430	6 263	16 847	23 110	3 448	26 558
Hamburg	4 267	2 411	6 678	17 774	24 452	2 105	26 557
Niedersachsen	12 688	1 863	14 551	30 614	45 165	7 042	52 207
Bremen	1 262	1 080	2 342	5 188	7 530	1 220	8 750
Nordrhein-Westfalen	26 549	6 474	33 023	72 899	105 922	20 227	126 149
Hessen	6 686	963	7 649	15 132	22 781	5 321	28 102
Rheinland-Pfalz	5 688	3 007	8 695	15 771	24 466	5 542	30 008
Baden-Württemberg	10 940	2 090	13 030	32 119	45 149	7 778	52 927
Bayern	15 841	3 645	19 486	32 385	51 871	6 564	58 435
Bundesgebiet	87 754	23 963	111 717	238 729	350 446	59 247	409 693
Berlin (West)	8 907	913	9 820	21 875	31 695	2 376	34 071
	Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung						
Schleswig-Holstein	16,9	10,7	27,6	74,2	101,7	15,2	116,9
Hamburg	23,8	13,5	37,3	99,3	136,6	11,8	148,3
Niedersachsen	19,4	2,8	22,2	46,8	69,0	10,8	79,7
Bremen	19,5	16,7	36,2	80,1	116,3	18,8	135,2
Nordrhein-Westfalen	17,7	4,3	22,1	46,7	70,8	13,5	84,3
Hessen	14,5	2,1	16,6	32,9	49,5	11,6	61,1
Rheinland-Pfalz	17,1	9,0	26,2	47,4	73,6	16,7	90,3
Baden-Württemberg	15,2	2,9	18,1	44,6	62,6	10,8	73,4
Bayern	17,2	4,0	21,2	35,2	56,4	7,1	63,6
Bundesgebiet	17,4	4,7	22,1	47,2	69,3	11,7	81,1
Berlin (West)	40,4	4,1	44,5	99,2	143,7	10,8	154,4

Neuzugänge und Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten
im Bundesgebiet und in Berlin (West)
(Vorläufiges Ergebnis)

Gebiet Berichtszeit	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
	ansteckend (offen)			nicht- ansteckend (aktiv geschlossen)	insgesamt		
	mit Bazillen- nachweis	ohne Bazillen- nachweis	insgesamt				
<u>Neuzugänge ¹⁾</u>							
<u>auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr</u>							
<u>Bundesgebiet</u>							
1955 1. Vierteljahr	4,0	1,1	5,1	10,9	16,0	2,9	18,9
2. Vierteljahr	3,9	1,0	4,9	11,2	16,1	3,9	19,0
3. Vierteljahr	3,7	1,2	4,9	10,5	15,4	2,6	18,1
4. Vierteljahr	3,6	1,1	4,6	10,1	14,8	2,5	17,3
1956 1. Vierteljahr	3,4	1,0	4,4	10,3	14,7	2,5	17,2
2. Vierteljahr	3,7	1,0	4,7	11,0	15,7	2,7	18,4
3. Vierteljahr	3,3	1,0	4,2	9,7	14,0	2,5	16,5
4. Vierteljahr	3,1	0,9	4,0	9,4	13,3	2,2	15,6
<u>Berlin (West)</u>							
1955 1. Vierteljahr	6,5	3,3	9,8	20,4	30,2	2,8	33,0
2. Vierteljahr	6,1	3,8	9,9	18,8	28,7	2,7	31,4
3. Vierteljahr	6,1	3,3	9,4	19,5	29,0	2,2	31,2
4. Vierteljahr	6,0	3,3	9,2	20,0	29,2	2,5	31,8
1956 1. Vierteljahr	6,1	3,6	9,7	20,5	30,3	2,0	32,2
2. Vierteljahr	6,2	3,3	9,5	20,1	29,6	2,5	32,0
3. Vierteljahr	5,7	3,0	8,7	17,7	26,4	2,5	28,9
4. Vierteljahr	4,9	2,2	7,1	17,2	24,3	2,4	26,7
<u>Bestand ²⁾</u>							
<u>auf 10 000 der Bevölkerung</u>							
<u>Bundesgebiet</u>							
1955 1. Vierteljahr	19,2	5,8	25,0	51,1	76,1	12,6	88,7
2. Vierteljahr	19,0	5,7	24,7	51,1	75,8	12,6	88,4
3. Vierteljahr	18,9	5,6	24,6	50,8	75,3	12,6	88,0
4. Vierteljahr	18,4	5,5	23,9	49,5	73,3	12,3	85,6
1956 1. Vierteljahr	18,0	5,3	23,4	48,7	71,9	12,0	83,9
2. Vierteljahr	17,8	5,1	22,9	48,1	71,1	12,0	83,0
3. Vierteljahr	17,7	5,0	22,7	48,0	70,6	12,0	82,7
4. Vierteljahr	14,4	4,7	22,1	47,2	69,3	11,7	81,1
<u>Berlin (West)</u>							
1955 1. Vierteljahr	45,0	5,1	50,1	91,2	141,3	11,0	152,3
2. Vierteljahr	44,8	5,2	50,0	92,2	142,2	11,0	153,2
3. Vierteljahr	44,7	5,3	50,0	93,9	143,8	11,0	154,9
4. Vierteljahr	43,9	5,0	48,8	95,6	144,4	11,1	155,4
1956 1. Vierteljahr	42,6	5,1	43,1	95,3	138,4	10,8	155,2
2. Vierteljahr	42,2	4,9	47,2	96,8	143,9	10,7	154,6
3. Vierteljahr	41,8	4,8	46,6	98,2	144,8	10,8	155,6
4. Vierteljahr	40,4	4,1	44,5	99,2	143,7	10,8	154,4

1) nur Neuzugänge, keine Zugänge aus anderen Gruppen. - 2) Bestand am Ende des jeweiligen Vierteljahres.

Sterbefälle an Tuberkulose der Atmungsorgane
in den Ländern des Bundesgebietes und in Berlin (West)
 (standesamtliche Meldungen)

Auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr
 (Vorläufiges Ergebnis)

Land	1955				1956			
	1. Vj.	2. Vj.	3. Vj.	4. Vj.	1. Vj.	2. Vj.	3. Vj.	4. Vj.
Schleswig-Holstein	2,2	2,0	1,8	1,9	2,0	1,9	1,9	1,6
Hamburg	1,8	2,0	1,6	2,2	2,0	1,9	1,8	1,5
Niedersachsen	1,6	1,7	1,5	1,8	1,8	1,7	1,5	1,5
Bremen	2,6	2,2	1,5	1,8	1,5	1,7	0,7	1,8
Nordrhein-Westfalen	2,3	1,7	1,5	1,9	2,2	1,8	1,6	1,7
Hessen	1,8	1,3	1,2	1,4	1,5	1,4	1,1	1,4
Rheinland-Pfalz	1,8	1,5	1,4	1,8	1,6	1,9	1,4	1,5
Baden-Württemberg	1,8	1,4	1,2	1,6	1,8	1,5	1,2	1,3
Bayern	2,4	2,2	1,8	1,9	2,2	2,0	1,8	1,7
Bundesgebiet	2,1	1,7	1,5	1,8	2,0	1,8	1,5	1,6
Berlin (West)	3,6	3,0	2,9	3,2	2,8	2,5	2,6	3,0

Sterbefälle an Tuberkulose anderer Organe
 (einschl. Miliartuberkulose)
 in den Ländern des Bundesgebietes und in Berlin (West)
 (standesamtliche Meldungen)


Auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr
 (Vorläufiges Ergebnis)

Land	1955				1956			
	1. Vj.	2. Vj.	3. Vj.	4. Vj.	1. Vj.	2. Vj.	3. Vj.	4. Vj.
Schleswig-Holstein	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2
Hamburg	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2
Niedersachsen	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2
Bremen	0,3	0,2	0,3	-	0,05	0,2	0,1	0,1
Nordrhein-Westfalen	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Hessen	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Rheinland-Pfalz	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2
Baden-Württemberg	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2
Bayern	0,3	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2
Bundesgebiet	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Berlin (West)	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2


NEUZUGÄNGE UND BESTAND DER AN AKTIVER TUBERKULOSE ERKRANKTEN

Auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr

NEUZUGÄNGE IM VIERTELJAHR




BESTAND AM ENDE DES JEWEILIGEN VIERTELJAHRES



STAT. BUNDESAMT 56-0249

STERBEFÄLLE AN TUBERKULOSE

Auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr



STAT. BUNDESAMT 56-0249