

# STATISTISCHE BERICHTE



18. MRZ. 2009

ZG 43 SR



Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

Arb.-Nr. VIII/3/47

Erschienen am 24. September 1958

Signatur ZE 1
3 A 7 II 6

Die Tuberkulose  
im Bundesgebiet, im Saarland und in Berlin (West)  
im 2. Vierteljahr 1958

(7242) V

Nachdruck - auch auszugsweise -  
nur mit Quellenangabe gestattet.

## I n h a l t

	Seite
Vorbemerkungen	3
 <u>Tabellen</u>	
1. Neuzugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten im Bundesgebiet, im Saarland und in Berlin (West) im 2. Vierteljahr 1958 (Grund- und Verhältniszahlen)	4
2. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten im Bundesgebiet, im Saarland und in Berlin (West) am 30. 6. 1958 (Grund- und Verhältniszahlen)	5
3. Neuzugänge und Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten im Bundesgebiet, im Saarland und in Berlin (West) (auf 100 000 der Bevölkerung)	6
4. Sterbefälle an Tuberkulose der Atmungsorgane und Tuberkulose anderer Organe (auf 100 000 der Bevölkerung und 1 Jahr)	7

Veröffentlichungen der Statistischen Landesämter  
über "Gesundheitswesen unter der Nr. A IV"

Die Tuberkulose  
im Bundesgebiet, im Saarland und in Berlin (West)  
im 2. Vierteljahr 1958

Nach Abschluß des 2. Weltkrieges wurde in den Ländern des Bundesgebietes und in Berlin (West) die Tuberkulose-Morbiditätsstatistik neu aufgebaut. Auf Grund der Meldepflicht für übertragbare Krankheiten vom 1. 12. 1938 werden durch die Tuberkulose-Fürsorgestellen der Gesundheitsämter die an aktiver Tuberkulose erkrankten Personen erfaßt. Diese laufend ergänzten Angaben dienen auch der Auszählung der **N e u z u g ä n g e** und des **B e s t a n d e s** der Tuberkulösen. Als Neuzugänge werden erkrankte Personen ausgewiesen, die erstmalig von den Tuberkulose-Fürsorgestellen in dem jeweiligen Berichtszeitraum registriert worden sind. Der Bestand an Erkrankten wird jeweils am Ende des Berichtszeitraumes ausgezählt.

Da eine vollständige Erfassung aller Erkrankten durch die Tbc-Fürsorgestellen kaum möglich ist, dürfen die Ergebnisse der Tuberkulose-Morbiditätsstatistik nur als unterste Werte der Erkrankungshäufigkeit angesehen werden.

Um das Bild über die Tuberkulose im Bundesgebiet und in Berlin (West) abzurunden, werden in der Anlage auch die Tuberkulosesterbeziffern des 1. und 2. Vierteljahres 1958 und zum Vergleich die der vier Vierteljahre 1957 auf Grund der standesamtlichen Meldungen beigelegt.

Neuzugänge<sup>1)</sup> der an aktiver Tuberkulose Erkrankten  
im Bundesgebiet, im Saarland und in Berlin (West)  
im 2. Vierteljahr 1958  
(Vorläufiges Ergebnis)

Land	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
	ansteckend (offen)			nichtan- steckend (aktiv ge- schlossen)	insgesamt		
	mit Bazil- lennachweis	ohne Bazil- lennachweis	insgesamt				
Grundzahlen							
Schleswig-Holstein	176	66	242	697	939	176	1 115
Hamburg	208	70	278	869	1 147	104	1 251
Niedersachsen	483	135	618	1 403	2 021	392	2 413
Bremen	42	15	57	126	183	47	230
Nordrhein-Westfalen	1 394	280	1 674	3 049	4 723	772	5 495
Hessen	270	80	350	706	1 056	299	1 355
Rheinland-Pfalz	251	98	349	645	994	270	1 264
Baden-Württemberg	468	89	557	1 805	2 362	471	2 833
Bayern	740	274	1 014	2 159	3 173	410	3 583
Bundesgebiet ohne Saarland	4 032	1 107	5 139	11 459	16 598	2 941	19 539
Saarland	97	36	133	228	361	82	443
Bundesgebiet einschl. Saarland	4 129	1 143	5 272	11 687	16 959	3 023	19 982
Berlin (West)	266	117	383	883	1 266	101	1 367

Verhältniszahlen auf 100 000 der Bevölkerung und 1 Jahr

Schleswig-Holstein	31,1	11,7	42,8	123,4	166,2	31,1	197,3
Hamburg	46,5	15,6	62,1	194,2	256,3	23,2	279,6
Niedersachsen	29,8	8,3	38,1	86,6	124,7	24,2	148,9
Bremen	25,2	9,0	34,2	75,6	109,8	28,2	138,0
Nordrhein-Westfalen	36,6	7,3	43,9	80,0	123,9	20,3	144,1
Hessen	23,5	7,0	30,4	61,3	91,7	26,0	117,7
Rheinland-Pfalz	30,2	11,8	42,0	77,7	119,8	32,5	152,3
Baden-Württemberg	25,6	4,9	30,4	98,6	129,0	25,7	154,7
Bayern	32,2	11,9	44,1	93,9	138,0	17,8	155,8
Bundesgebiet ohne Saarland	31,7	8,7	40,4	90,1	130,5	23,1	153,6
Saarland	37,9	14,1	51,9	89,0	140,9	32,0	172,9
Bundesgebiet einschl. Saarland	31,8	8,8	40,6	90,0	130,7	23,3	153,9
Berlin (West)	48,0	21,1	69,1	159,3	228,4	18,2	246,7

1) Nur Neuzugänge, keine Zugänge aus anderen Gruppen.

Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten  
im Bundesgebiet, im Saarland und in Berlin (West)  
 am 30. 6. 1958

(Vorläufiges Ergebnis)

Land	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
	ansteckend (offen)			nichtansteckend (aktiv geschlossen)	insgesamt		
	mit Bazillennachweis	ohne Bazillennachweis	insgesamt				
Grundzahlen							
Schleswig-Holstein	3 502	2 168	5 670	15 496	21 166	3 247	24 413
Hamburg	4 053	1 849	5 902	17 677	23 579	2 024	25 603
Niedersachsen	11 142	1 685	12 827	26 884	39 711	6 662	46 373
Bremen	1 207	803	2 010	4 825	6 835	1 050	7 885
Nordrhein-Westfalen	25 115	5 621	30 736	67 984	98 720	19 268	117 988
Hessen	6 215	867	7 082	13 495	20 577	4 635	25 212
Rheinland-Pfalz	5 289	2 714	8 003	15 180	23 183	4 877	28 060
Baden-Württemberg	9 955	1 674	11 629	27 843	39 472	6 962	46 434
Bayern	14 596	3 585	18 181	30 947	49 128	6 128	55 256
Bundesgebiet ohne Saarland	81 074	20 966	102 040	220 331	322 371	54 853	377 224
Saarland	1 391	807	2 198	3 706	5 904	896	6 800
Bundesgebiet einschl. Saarland	82 465	21 773	104 238	224 037	328 275	55 749	384 024
Berlin (West)	8 178	724	8 902	21 381	30 283	2 252	32 535
Verhältniszahlen auf 100 000 der Bevölkerung							
Schleswig-Holstein	154,4	95,6	249,9	683,1	933,0	143,1	1 076,2
Hamburg	225,6	102,9	328,5	983,9	1 312,4	112,7	1 425,0
Niedersachsen	171,3	25,9	197,2	413,4	610,6	102,4	713,1
Bremen	180,1	119,8	300,0	720,0	1 020,0	156,7	1 176,7
Nordrhein-Westfalen	163,9	36,7	200,6	443,8	644,4	125,8	770,1
Hessen	134,4	18,8	153,2	291,9	445,1	100,3	545,4
Rheinland-Pfalz	158,6	81,4	240,0	455,2	695,1	146,2	841,4
Baden-Württemberg	135,1	22,7	157,8	377,9	535,8	94,5	630,3
Bayern	158,1	38,8	196,9	335,1	532,0	66,4	598,3
Bundesgebiet ohne Saarland	158,6	41,0	199,6	431,0	630,6	107,3	737,9
Saarland	135,0	78,3	213,3	359,6	572,9	86,9	659,9
Bundesgebiet einschl. Saarland	158,1	41,8	199,9	429,6	629,5	106,9	736,4
Berlin (West)	367,7	32,6	400,3	961,5	1 361,8	101,3	1 463,0

Neuzugänge und Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten  
im Bundesgebiet, im Saarland und in Berlin (West)

(Vorläufige Ergebnisse)

Gebiet Berichtszeit	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
	ansteckend (offen)			nichtan- steckend (aktiv ge- schlossen)	insgesamt		
	mit Bazil- lennachweis	ohne Bazil- lennachweis	insgesamt				
<u>Neuzugänge <sup>1)</sup></u>							
<u>auf 100 000 der Bevölkerung und 1 Jahr</u>							
<u>Bundesgebiet ohne Saarland</u>							
1957 2. Vierteljahr	34,6	8,9	40,5	93,8	134,3	22,7	157,0
1958 2. Vierteljahr	31,7	8,7	40,4	90,1	130,5	23,1	153,6
<u>Saarland</u>							
1957 2. Vierteljahr	31,4	10,3	41,7	107,9	149,6	25,4	175,0
1958 2. Vierteljahr	37,9	14,1	51,9	89,0	140,9	32,0	172,9
<u>Berlin (West)</u>							
1957 2. Vierteljahr	54,3	23,1	77,4	153,5	230,9	27,6	258,5
1958 2. Vierteljahr	48,0	21,1	69,1	159,3	228,4	18,2	246,7
<u>Bestand <sup>2)</sup></u>							
<u>auf 100 000 der Bevölkerung</u>							
<u>Bundesgebiet ohne Saarland</u>							
1957 2. Vierteljahr	170,8	46,3	217,0	468,4	685,5	116,6	802,0
1958 2. Vierteljahr	158,6	41,0	199,6	431,0	630,6	107,3	737,9
<u>Saarland</u>							
1957 2. Vierteljahr	126,2	76,4	202,6	390,6	593,2	89,9	683,1
1958 2. Vierteljahr	135,0	78,3	213,3	359,6	572,9	86,9	659,9
<u>Berlin (West)</u>							
1957 2. Vierteljahr	389,4	37,9	427,3	972,3	1 399,6	104,9	1 504,5
1958 2. Vierteljahr	367,7	32,6	400,3	961,5	1 361,8	101,3	1 463,0

1) Nur Neuzugänge, keine Zugänge aus anderen Gruppen. - 2) Bestand am Ende des jeweiligen Vierteljahres.

**Sterbefälle an Tuberkulose der Atmungsorgane**  
**in den Ländern des Bundesgebietes, im Saarland und in Berlin (West)**  
 (standesamtliche Meldungen)  
 Auf 100 000 der Bevölkerung und 1 Jahr  
 (Vorläufiges Ergebnis)

Land	1957				1958	
	1. Vj.	2. Vj.	3. Vj.	4. Vj.	1. Vj.	2. Vj.
Schleswig-Holstein	21,8	19,6	16,0	19,8	22,9	17,9
Hamburg	18,9	16,5	12,7	20,0	26,1	16,8
Niedersachsen	16,1	13,2	13,9	17,4	17,4	13,8
Bremen	16,2	11,0	10,2	17,4	25,0	12,6
Nordrhein-Westfalen	18,9	15,4	16,0	20,2	19,8	14,0
Hessen	12,8	14,6	13,2	16,8	16,9	10,9
Rheinland-Pfalz	16,0	15,0	14,8	20,5	16,3	16,5
Baden-Württemberg	17,2	13,6	12,0	17,7	17,2	11,6
Bayern	19,4	19,0	17,0	23,6	22,1	17,1
Bundesgebiet ohne Saarland	17,7	15,6	14,9	19,7	19,8	14,3
Saarland	21,8	20,7	21,2	30,8	.	15,6
Bundesgebiet einschl. Saarland	17,8	15,7	15,0	20,0	.	14,3
Berlin (West)	29,4	22,9	20,7	28,5	26,8	18,6

**Sterbefälle an Tuberkulose anderer Organe**  
 (einschl. Miliartuberkulose)  
 in den Ländern des Bundesgebietes, im Saarland und in Berlin (West)  
 (standesamtliche Meldungen)  
 Auf 100 000 der Bevölkerung und 1 Jahr  
 (Vorläufiges Ergebnis)

Land	1957				1958	
	1. Vj.	2. Vj.	3. Vj.	4. Vj.	1. Vj.	2. Vj.
Schleswig-Holstein	2,5	1,4	2,5	1,6	1,8	1,4
Hamburg	1,6	2,5	1,4	1,8	1,3	1,1
Niedersachsen	1,4	1,8	1,8	1,0	1,4	1,5
Bremen	1,9	2,5	1,2	2,4	1,2	1,2
Nordrhein-Westfalen	1,7	1,7	1,1	1,4	1,8	1,6
Hessen	1,3	1,1	1,3	2,0	1,8	1,2
Rheinland-Pfalz	2,1	1,5	2,2	2,3	1,5	2,2
Baden-Württemberg	2,1	2,0	2,0	1,9	1,9	2,4
Bayern	1,9	1,9	1,8	1,9	1,6	1,5
Bundesgebiet ohne Saarland	1,8	1,7	1,5	1,6	1,7	1,7
Saarland	2,0	3,6	2,8	1,6	.	1,2
Bundesgebiet einschl. Saarland	1,8	1,8	1,5	1,6	.	1,6
Berlin (West)	3,0	1,6	2,3	1,4	0,7	1,4