

# STATISTISCHE BERICHTE

26 43



Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

Arb.-Nr. VIII/3/48

Erschienen am 26. Januar 1958

Signatur ZB 1
3 A 7 II b

Die Tuberkulose

im Bundesgebiet, im Saarland und in Berlin (West)

im 3. Vierteljahr 1958

(7473) V

Nachdruck - auch auszugsweise -  
nur mit Quellenangabe gestattet.

# Inhalt

	Seite
Vorbemerkungen	3
 <u>Tabellen</u>	
1. Neuzugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten im Bundesgebiet, im Saarland und in Berlin (West) im 3. Vierteljahr 1958 (Grund- und Verhältniszahlen)	4
2. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten im Bundesgebiet, im Saarland und in Berlin (West) am 30.9.1958 (Grund- und Verhältniszahlen)	5
3. Neuzugänge und Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten im Bundesgebiet, im Saarland und in Berlin (West) (auf 100 000 der Bevölkerung)	6
4. Sterbefälle an Tuberkulose der Atmungsorgane und Tuberkulose anderer Organe (auf 100 000 der Bevölkerung und 1 Jahr)	7

Veröffentlichungen der Statistischen Landesämter  
über "Gesundheitswesen" unter der Nr. A IV

Die Tuberkulose  
im Bundesgebiet, im Saarland und in Berlin (West)  
im 3. Vierteljahr 1958

Nach Abschluß des 2. Weltkrieges wurde in den Ländern des Bundesgebietes und in Berlin (West) die Tuberkulose-Morbiditätsstatistik neu aufgebaut. Auf Grund der Meldepflicht für Übertragbare Krankheiten vom 1. 12. 1938 werden durch die Tuberkulose-Fürsorgestellen der Gesundheitsämter die an aktiver Tuberkulose erkrankten Personen erfaßt. Diese laufend ergänzten Angaben dienen auch der Auszählung der N e u z u - g ä n g e und des B e s t a n d e s der Tuberkulösen. Als Neuzugänge werden erkrankte Personen ausgewiesen, die erstmalig von den Tuberkulose-Fürsorgestellen in dem jeweiligen Berichtszeitraum registriert worden sind. Der Bestand an Erkrankten wird jeweils am Ende des Berichtszeitraumes ausgezählt.

Da eine vollständige Erfassung aller Erkrankten durch die Tbc-Fürsorgestellen kaum möglich ist, dürfen die Ergebnisse der Tuberkulose-Morbiditätsstatistik nur als unterste Werte der Erkrankungshäufigkeit angesehen werden.

Um das Bild über die Tuberkulose im Bundesgebiet und in Berlin (West) abzurunden, werden in der Anlage auch die Tuberkulosesterbeziffern des 1., 2. und 3. Vierteljahres 1958 und zum Vergleich die der vier Vierteljahre 1957 auf Grund der standesamtlichen Meldungen beigelegt.

Neuzugänge<sup>1)</sup> der an aktiver Tuberkulose Erkrankten im Bundesgebiet

im Saarland und in Berlin (West)

im 3. Vierteljahr 1958

(Vorläufiges Ergebnis)

L a n d	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
	ansteckend (offen)			nichten- steckend (aktiv ge- schlossen)	insgesamt		
	mit Bazil- lennachweis	ohne Bazil- lennachweis	insgesamt				
Grundzahlen							
Schleswig-Holstein	183	97	280	635	915	152	1 067
Hamburg	212	67	279	938	1 217	103	1 320
Niedersachsen	510	137	647	1 233	1 880	358	2 238
Bremen	43	15	58	124	182	42	224
Nordrhein-Westfalen	1 364	253	1 617	3 175	4 792	763	5 555
Hessen	291	77	368	614	982	334	1 316
Rheinland-Pfalz	243	95	338	638	976	221	1 197
Baden-Württemberg	479	119	598	1 758	2 356	462	2 818
Bayern	648	239	887	1 936	2 823	405	3 229
Bundesgebiet ohne Saarland	3 973	1 099	5 072	11 051	16 123	2 841	18 964
Saarland	84	26	110	243	353	71	424
Bundesgebiet einschl. Saarland	4 057	1 125	5 182	11 294	16 476	2 912	19 388
Berlin (West)	328	133	461	942	1 403	127	1 530

Verhältniszahlen auf 100 000 der Bevölkerung und 1 Jahr

Schleswig-Holstein	32,0	16,9	48,9	110,9	159,8	26,6	186,4
Hamburg	46,8	14,8	61,5	206,9	268,4	22,7	291,1
Niedersachsen	31,1	8,4	39,4	75,2	114,6	21,8	136,4
Bremen	25,4	8,9	34,2	73,2	107,4	24,8	132,2
Nordrhein-Westfalen	35,2	6,5	41,8	82,0	123,8	19,7	143,5
Hessen	24,9	6,6	31,5	52,6	84,1	28,6	112,8
Rheinland-Pfalz	28,9	11,3	40,1	75,8	115,9	26,2	142,2
Baden-Württemberg	25,7	6,4	32,1	94,4	126,6	24,8	151,4
Bayern	27,8	10,3	38,1	83,1	121,2	17,4	138,5
Bundesgebiet	30,8	8,5	39,3	85,6	124,9	22,0	146,9
Saarland	32,3	10,0	42,2	93,3	135,5	27,3	162,8
Bundesgebiet einschl. Saarland	30,8	8,5	39,4	85,8	125,1	22,1	147,2
Berlin (West)	58,4	23,7	82,1	167,8	249,9	22,6	272,5

1) Nur Neuzugänge, keine Zugänge aus anderen Gruppen.

Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten im Bundesgebiet

im Saarland und in Berlin (West)

am 30. 9. 1958

(Vorläufiges Ergebnis)

Land	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
	ansteckend (offen)			nichtansteckend (aktiv geschlossen)	insgesamt		
	mit Bazillennachweis	ohne Bazillennachweis	insgesamt				
Grundzahlen							
Schleswig-Holstein	3 480	2 203	5 683	15 180	20 863	3 246	24 109
Hamburg	4 033	1 828	5 861	17 657	23 518	2 056	25 574
Niedersachsen	11 015	1 674	12 689	26 306	38 995	6 602	45 597
Bremen	1 199	749	1 948	4 729	6 677	1 028	7 705
Nordrhein-Westfalen	25 013	5 623	30 636	67 471	98 107	19 027	117 134
Hessen	6 222	858	7 080	13 142	20 222	4 659	24 881
Rheinland-Pfalz	5 302	2 690	7 992	15 174	23 166	4 846	28 012
Baden-Württemberg	9 899	1 637	11 535	27 311	38 846	6 809	45 655
Bayern	14 446	3 565	18 011	31 226	49 237	6 189	55 426
Bundesgebiet ohne Saarland	80 608	20 827	101 435	218 196	319 631	54 462	374 093
Saarland	1 403	796	2 199	3 705	5 904	919	6 823
Bundesgebiet einschl. Saarland	82 011	21 623	103 634	221 901	325 535	55 381	380 916
Berlin (West)	8 250	767	9 017	21 291	30 308	2 247	32 555
Verhältniszahlen auf 100 000 der Bevölkerung							
Schleswig-Holstein	153,1	96,9	249,9	667,6	917,6	142,8	1 060,3
Hamburg	223,9	101,5	325,4	980,2	1 305,6	114,1	1 419,8
Niedersachsen	169,1	25,7	194,8	403,9	598,7	101,4	700,1
Bremen	177,8	111,1	288,8	701,2	990,1	152,4	1 142,5
Nordrhein-Westfalen	162,5	36,5	199,0	438,2	637,2	123,6	760,8
Hessen	134,1	18,5	152,6	283,3	436,0	100,5	536,4
Rheinland-Pfalz	158,4	80,4	238,8	453,4	692,2	144,8	837,0
Baden-Württemberg	133,7	22,1	155,8	368,9	524,7	92,0	616,7
Bayern	156,1	38,5	194,6	337,4	531,9	66,9	598,8
Bundesgebiet ohne Saarland	157,1	40,6	197,7	425,3	623,0	106,2	729,2
Saarland	135,4	76,8	212,2	357,5	569,7	98,7	658,4
Bundesgebiet einschl. Saarland	156,7	41,3	198,0	424,0	622,0	105,8	727,8
Berlin (West)	370,2	34,4	404,6	955,4	1 360,0	100,8	1 460,8

Neuzugänge und Bestand an aktiver Tuberkulose Erkrankten  
im Bundesgebiet, im Saarland und in Berlin (est)  
 (Vorläufige Ergebnisse)

Gebiet Berichtszeit	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen Insgesamt
	ansteckend (offen)			nichtan- steckend (aktiv ge- schlossen)	Insgesamt		
	mit Bazil- lennachweis	ohne Bazil- lennachweis	Insgesamt				
<u>Neuzugänge <sup>1)</sup></u>							
auf 100 000 der Bevölkerung und 1 Jahr							
<u>Bundesgebiet ohne Saarland</u>							
1957 3. Vierteljahr	33,0	9,1	42,1	92,1	134,2	22,6	156,7
1958 3. Vierteljahr	30,8	8,5	39,3	85,6	124,9	22,0	146,9
<u>Saarland</u>							
1957 3. Vierteljahr	39,1	12,5	51,6	97,8	149,4	22,3	171,7
1958 3. Vierteljahr	32,3	10,0	42,2	93,3	135,5	27,3	162,8
<u>Berlin (est)</u>							
1957 3. Vierteljahr	51,4	23,2	74,6	154,8	229,4	20,0	250,3
1958 3. Vierteljahr	58,4	23,7	82,1	167,8	249,9	22,8	272,5
<u>Bestand <sup>2)</sup></u>							
auf 100 000 der Bevölkerung							
<u>Bundesgebiet ohne Saarland</u>							
1957 3. Vierteljahr	169,1	45,3	214,4	461,8	676,2	115,5	791,7
1958 3. Vierteljahr	157,1	40,6	197,7	425,3	623,0	106,2	729,2
<u>Saarland</u>							
1957 3. Vierteljahr	127,3	75,8	203,1	388,6	591,7	89,4	681,0
1958 3. Vierteljahr	135,4	76,8	212,2	357,5	569,7	88,7	658,4
<u>Berlin (est)</u>							
1957 3. Vierteljahr	383,4	37,3	420,6	965,8	1 386,4	103,7	1 490,1
1958 3. Vierteljahr	370,2	34,4	404,6	955,4	1 360,0	100,8	1 460,8

1) Nur Neuzugänge, keine Zugänge aus anderen Gruppen. • 2) Bestand am Ende des jeweiligen Vierteljahres.

Sterbefälle an Tuberkulose der Atmungsorgane  
in den Ländern des Bundesgebietes, im Saarland und in Berlin (West)  
 (standesamtliche Meldungen)  
 Auf 100 000 der Bevölkerung und 1 Jahr  
 (Vorläufiges Ergebnis)

Land	1957				1958		
	1. Vj.	2. Vj.	3. Vj.	4. Vj.	1. Vj.	2. Vj.	3. Vj.
Schleswig-Holstein	21,8	19,6	16,0	19,8	22,9	17,9	13,6
Hamburg	18,9	16,5	12,7	20,0	26,1	16,8	14,1
Niedersachsen	16,1	13,2	13,9	17,4	17,4	13,8	12,0
Bremen	16,2	11,0	10,2	17,4	25,0	12,6	12,4
Nordrhein-Westfalen	18,9	15,4	16,0	20,2	19,8	14,0	11,9
Hessen	12,8	14,6	13,2	16,8	16,9	10,9	9,5
Rheinland-Pfalz	16,0	15,0	14,8	20,5	16,5	16,5	12,9
Baden-Württemberg	17,2	13,6	12,0	17,7	17,2	11,6	11,2
Bayern	19,4	19,0	17,0	23,6	22,1	17,1	15,7
Bundesgebiet ohne Saarland	17,7	15,6	14,9	19,7	18,0	14,3	12,5
Saarland	21,8	20,7	21,2	30,9	24,2	15,6	16,1
Bundesgebiet einschl. Saarland	17,8	15,7	15,0	20,0	18,8	14,5	12,6
Berlin (West)	29,4	22,9	20,7	28,5	26,1	19,6	18,9

Sterbefälle an Tuberkulose anderer Organe  
 (einschl. Miliartuberkulose)  
 in den Ländern des Bundesgebietes, im Saarland und in Berlin (West)  
 (standesamtliche Meldungen)  
 Auf 100 000 der Bevölkerung und 1 Jahr  
 (Vorläufiges Ergebnis)

Land	1957				1958		
	1. Vj.	2. Vj.	3. Vj.	4. Vj.	1. Vj.	2. Vj.	3. Vj.
Schleswig-Holstein	2,5	1,4	2,5	1,6	1,8	1,4	1,6
Hamburg	1,6	2,5	1,4	1,8	1,3	1,1	1,5
Niedersachsen	1,4	1,8	1,8	1,0	1,4	1,5	1,8
Bremen	1,9	2,5	1,2	2,4	1,2	1,2	1,8
Nordrhein-Westfalen	1,7	1,7	1,1	1,4	1,8	1,6	1,3
Hessen	1,3	1,1	1,3	2,0	1,8	1,2	1,0
Rheinland-Pfalz	2,1	1,5	2,2	2,3	1,5	2,2	2,1
Baden-Württemberg	2,1	2,0	2,0	1,9	1,9	2,4	1,8
Bayern	1,9	1,9	1,8	1,9	1,6	1,5	1,9
Bundesgebiet ohne Saarland	1,8	1,7	1,5	1,6	1,7	1,7	1,6
Saarland	2,0	3,6	2,8	1,6	1,2	1,2	1,2
Bundesgebiet einschl. Saarland	1,8	1,8	1,5	1,6	1,7	1,6	1,6
Berlin (West)	3,0	1,6	2,3	1,4	0,7	1,4	1,6