


# STATISTISCHE BERICHTE



18. MRZ 2009


58m  
ZG 43



Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

Arb.-Nr. VIII/3/49

Erschienen am 22. April 1959



Die Tuberkulose  
im Bundesgebiet, im Saarland und in Berlin (West)  
im 4. Vierteljahr 1958

(7634) V

Nachdruck - auch auszugsweise -  
nur mit Quellenangabe gestattet.

# Inhalt

	Seite
Vorbemerkungen	3
 <u>Tabellen</u>	
1. Neuzugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten im Bundesgebiet, im Saarland und in Berlin (West) im 4. Vierteljahr 1958 (Grund- und Verhältniszahlen)	4
2. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten im Bundesgebiet, im Saarland und in Berlin (West) am 31.12.1958 (Grund- und Verhältniszahlen)	5
3. Neuzugänge und Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten im Bundesgebiet, im Saarland und in Berlin (West) (auf 100 000 der Bevölkerung)	6
4. Sterbefälle an Tuberkulose der Atmungsorgane und Tuberkulose anderer Organe (auf 100 000 der Bevölkerung und 1 Jahr)	7
 Veröffentlichungen der Statistischen Landesämter über "Gesundheitswesen" unter der Nr. A IV	

Die Tuberkulose  
im Bundesgebiet, im Saarland und in Berlin (West)  
im 4. Vierteljahr 1958

Nach Abschluß des 2. Weltkrieges wurde in den Ländern des Bundesgebietes und in Berlin (West) die Tuberkulose-Morbiditätsstatistik neu aufgebaut. Auf Grund der Meldepflicht für übertragbare Krankheiten vom 1.12.1938 werden durch die Tuberkulose-Fürsorgestellen der Gesundheitsämter die an aktiver Tuberkulose erkrankten Personen erfaßt. Diese laufend ergänzten Angaben dienen auch der Auszählung der **N e u z u - g ä n g e** und des **B e s t a n d e s** der Tuberkulösen. Als Neuzugänge werden erkrankte Personen ausgewiesen, die erstmalig von den Tuberkulose-Fürsorgestellen in dem jeweiligen Berichtszeitraum registriert worden sind. Der Bestand an Erkrankten wird jeweils am Ende des Berichtszeitraumes ausgezählt.

Da eine vollständige Erfassung aller Erkrankten durch die Tbc-Fürsorgestellen kaum möglich ist, dürfen die Ergebnisse der Tuberkulose-Morbiditätsstatistik nur als unterste Werte der Erkrankungshäufigkeit angesehen werden.

Um das Bild über die Tuberkulose im Bundesgebiet und in Berlin (West) abzurunden, werden in der Anlage auch die Tuberkulosesterbeziffern der vier Vierteljahre 1958 und zum Vergleich die der vier Vierteljahre 1957 auf Grund der standesamtlichen Meldungen beigelegt.

Neuzugänge<sup>1)</sup> der an aktiver Tuberkulose Erkrankten im Bundesgebiet

im Saarland und in Berlin (West)

im 4. Vierteljahr 1958

(Vorläufiges Ergebnis)

Land	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
	ansteckend (offen)			nichtansteckend (aktiv geschlossen)	insgesamt		
	mit Bazillennachweis	ohne Bazillennachweis	insgesamt				
Grundzahlen							
Schleswig-Holstein	162	76	238	712	950	147	1 097
Hamburg	208	102	310	925	1 235	114	1 349
Niedersachsen	433	118	551	1 310	1 861	305	2 166
Bremen	41	16	57	129	186	44	230
Nordrhein-Westfalen	1 337	270	1 607	3 023	4 630	740	5 370
Hessen	236	72	308	584	892	255	1 147
Rheinland-Pfalz	239	75	314	578	892	304	1 196
Baden-Württemberg	487	119	606	1 859	2 465	513	2 978
Bayern	650	340	990	2 084	3 074	405	3 479
Bundesgebiet ohne Saarland und Berlin	3 793	1 188	4 981	11 204	16 185	2 827	19 012
Saarland	81	35	116	239	355	78	433
Bundesgebiet einschl. Saarland (ohne Berlin)	3 874	1 223	5 097	11 443	16 540	2 905	19 445
Berlin (West)	278	106	384	809	1 193	92	1 285
Verhältniszahlen auf 100 000 der Bevölkerung und 1 Jahr							
Schleswig-Holstein	28,3	13,3	41,5	124,2	165,7	25,6	191,4
Hamburg	45,7	22,4	68,1	203,3	271,5	25,1	296,5
Niedersachsen	26,4	7,2	33,6	79,8	113,3	18,6	131,9
Bremen	24,1	9,4	33,4	75,7	109,1	25,8	135,0
Nordrhein-Westfalen	34,4	6,9	41,3	77,7	119,1	19,0	138,1
Hessen	20,2	6,1	26,3	49,9	76,2	21,8	97,9
Rheinland-Pfalz	28,3	8,9	37,2	68,4	105,6	36,0	141,6
Baden-Württemberg	26,0	6,4	32,4	99,4	131,8	27,4	159,2
Bayern	27,8	14,6	42,4	89,2	131,6	17,3	149,0
Bundesgebiet ohne Saarland und Berlin	29,3	9,2	38,5	86,5	125,0	21,8	146,8
Saarland	30,9	13,4	44,3	91,3	135,6	29,8	165,4
Bundesgebiet einschl. Saarland (ohne Berlin)	29,3	9,3	38,6	86,6	125,2	22,0	147,2
Berlin (West)	49,5	18,9	68,4	144,1	212,4	16,4	228,8

1) Nur Neuzugänge, keine Zugänge aus anderen Gruppen.

Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten im Bundesgebiet,

im Saarland und in Berlin (West)

am 31.12.1956

(Vorläufiges Ergebnis)

Land	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
	ansteckend (offen)			nichtansteckend (aktiv geschlossen)	insgesamt		
	mit Bazillennachweis	ohne Bazillennachweis	insgesamt				
	Grundzahlen						
Schleswig-Holstein	3 352	2 030	5 382	14 495	19 877	2 815	22 692
Hamburg	3 972	1 717	5 689	16 965	22 654	2 035	24 689
Niedersachsen	10 639	1 586	12 225	25 158	37 383	6 370	43 753
Bremen	1 154	691	1 845	4 638	6 483	991	7 474
Nordrhein-Westfalen	24 611	5 422	30 033	66 358	96 391	18 688	115 079
Hessen	6 016	822	6 838	12 950	19 788	4 499	24 287
Rheinland-Pfalz	5 116	2 547	7 663	14 591	22 254	4 505	26 759
Baden-Württemberg	9 698	1 551	11 249	26 446	37 695	6 488	44 183
Bayern	14 144	3 600	17 744	30 583	48 327	5 888	54 215
Bundesgebiet ohne Saarland und Berlin	78 702	19 966	98 668	212 184	310 852	52 279	363 131
Saarland	1 372	778	2 150	3 578	5 728	932	6 660
Bundesgebiet einschl. Saarland (ohne Berlin)	80 074	20 744	100 818	215 762	316 580	53 211	369 791
Berlin (West)	8 189	701	8 890	21 148	30 038	2 181	32 219
	Verhältniszahlen auf 100 000 der Bevölkerung						
Schleswig-Holstein	147,3	89,2	236,5	636,9	873,4	123,7	997,1
Hamburg	219,7	95,0	314,7	938,5	1 253,3	112,6	1 365,8
Niedersachsen	163,3	24,3	187,6	386,1	573,7	97,8	671,5
Bremen	170,3	102,0	272,3	684,6	956,9	146,3	1 103,2
Nordrhein-Westfalen	159,2	35,1	194,3	429,3	623,5	120,9	744,4
Hessen	129,3	17,7	147,0	278,4	425,4	96,7	522,1
Rheinland-Pfalz	152,5	75,9	228,4	434,9	663,4	134,3	797,7
Baden-Württemberg	130,5	20,9	151,3	355,8	507,1	87,3	594,4
Bayern	152,4	38,8	191,2	329,6	520,9	63,5	584,3
Bundesgebiet ohne Saarland und Berlin	153,0	38,8	191,8	412,4	604,2	101,6	705,8
Saarland	131,9	74,8	206,7	344,0	550,7	89,6	640,3
Bundesgebiet einschl. Saarland (ohne Berlin)	152,5	39,5	192,1	411,0	603,1	101,4	704,5
Berlin (West)	367,9	31,5	399,4	950,0	1 349,4	98,0	1 447,4

Neuzugänge und Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten  
im Bundesgebiet, im Saarland und in Berlin (West)

(Vorläufige Ergebnisse)

Gebiet Berichtszeit	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
	ansteckend (offen)			nichtan- steckend (aktiv ge- schlossen)	insgesamt		
	mit Bazil- lennachweis	ohne Bazil- lennachweis	insgesamt				

Neuzugänge<sup>1)</sup>

auf 100 000 der Bevölkerung und 1 Jahr

Bundesgebiet ohne Saarl. u. Berlin

1957 4. Vierteljahr	31,6	8,8	40,4	86,8	127,2	20,3	147,5
1958 4. Vierteljahr	29,3	9,2	38,5	86,5	125,0	21,8	146,8

Saarland

1957 4. Vierteljahr	42,5	12,1	54,6	104,9	159,4	21,8	183,3
1958 4. Vierteljahr	30,9	13,4	44,3	91,3	135,6	29,8	165,4

Berlin (West)

1957 4. Vierteljahr	46,5	20,1	66,6	153,0	219,6	20,1	239,7
1958 4. Vierteljahr	49,5	18,9	68,4	144,1	212,4	16,4	228,8

Bestand<sup>2)</sup>

auf 100 000 der Bevölkerung

Bundesgebiet ohne Saarl. u. Berlin

1957 4. Vierteljahr	163,0	42,7	205,7	445,5	651,2	110,3	761,6
1958 4. Vierteljahr	153,0	38,8	191,8	412,4	604,2	101,6	705,8

Saarland

1957 4. Vierteljahr	129,5	80,4	209,9	361,8	571,7	88,2	659,9
1958 4. Vierteljahr	131,9	74,8	206,7	344,0	550,7	89,6	640,3

Berlin (West)

1957 4. Vierteljahr	376,2	33,9	410,1	955,1	1 365,2	103,2	1 468,4
1958 4. Vierteljahr	367,9	31,5	399,4	950,0	1 349,4	98,0	1 447,4

1) Nur Neuzugänge, keine Zugänge aus anderen Gruppen. - 2) Bestand am Ende des jeweiligen Vierteljahres.

Sterbefälle an Tuberkulose der Atmungsorgane  
in den Ländern des Bundesgebietes, im Saarland und in Berlin (West)  
 (standesamtliche Meldungen)  
 Auf 100 000 der Bevölkerung und 1 Jahr  
 (Vorläufiges Ergebnis)

Land	1957				1958			
	1. Vj.	2. Vj.	3. Vj.	4. Vj.	1. Vj.	2. Vj.	3. Vj.	4. Vj.
Schleswig-Holstein	21,8	19,6	16,0	19,8	22,9	17,9	13,6	16,7
Hamburg	18,9	16,5	12,7	20,0	26,1	16,8	14,1	17,8
Niedersachsen	16,1	13,2	13,9	17,4	17,4	13,8	12,0	12,2
Bremen	16,2	11,0	10,2	17,4	25,0	12,6	12,4	11,7
Nordrhein-Westfalen	18,9	15,4	16,0	20,2	19,8	14,0	11,9	15,7
Hessen	12,8	14,6	13,2	16,8	16,9	10,9	9,5	12,1
Rheinland-Pfalz	16,0	15,0	14,8	20,5	16,3	16,5	12,9	16,6
Baden-Württemberg	17,2	13,6	12,0	17,7	17,2	11,6	11,2	13,6
Bayern	19,4	19,0	17,0	23,6	22,1	17,1	15,7	19,5
Bundesgebiet ohne Saarland und Berlin	17,7	15,6	14,9	19,7	19,8	14,3	12,5	15,5
Saarland	21,8	20,7	21,2	30,8	24,2	15,6	16,1	20,2
Bundesgebiet einschl. Saarland (ohne Berlin)	17,8	15,7	15,0	20,0	19,9	14,3	12,6	15,5
Berlin (West)	29,4	22,9	20,7	28,5	26,8	18,6	18,9	21,9

Sterbefälle an Tuberkulose anderer Organe  
 (einschl. Miliartuberkulose)  
 in den Ländern des Bundesgebietes, im Saarland und in Berlin (West)  
 (standesamtliche Meldungen)  
 Auf 100 000 der Bevölkerung und 1 Jahr  
 (Vorläufiges Ergebnis)

Land	1957				1958			
	1. Vj.	2. Vj.	3. Vj.	4. Vj.	1. Vj.	2. Vj.	3. Vj.	4. Vj.
Schleswig-Holstein	2,5	1,4	2,5	1,6	1,8	1,4	1,6	1,0
Hamburg	1,6	2,5	1,4	1,8	1,3	1,1	1,5	0,9
Niedersachsen	1,4	1,8	1,8	1,0	1,4	1,5	1,8	1,4
Bremen	1,9	2,5	1,2	2,4	1,2	1,2	1,8	1,2
Nordrhein-Westfalen	1,7	1,7	1,1	1,4	1,8	1,6	1,3	1,1
Hessen	1,3	1,1	1,3	2,0	1,8	1,2	1,0	0,9
Rheinland-Pfalz	2,1	1,5	2,2	2,3	1,5	2,2	2,1	1,3
Baden-Württemberg	2,1	2,0	2,0	1,9	1,9	2,4	1,8	1,7
Bayern	1,9	1,9	1,8	1,9	1,6	1,5	1,9	1,8
Bundesgebiet ohne Saarland und Berlin	1,8	1,7	1,5	1,6	1,7	1,7	1,6	1,3
Saarland	2,0	3,6	2,8	1,6	1,2	1,2	1,2	-
Bundesgebiet einschl. Saarland (ohne Berlin)	1,8	1,8	1,5	1,6	1,7	1,6	1,6	1,3
Berlin (West)	3,0	1,6	2,3	1,4	0,7	1,4	1,6	2,3