

Anzahl 2X

# STATISTISCHE BERICHTE



Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

---

Arb.-Nr. VIII/3/13

Erschienen am 4. Januar 1952

Erkrankungen an aktiver Tuberkulose  
im Bundesgebiet und West-Berlin  
im 3. Vierteljahr 1951

Ab 1951 ist es möglich, Zusammenstellungen über den Bestand an aktiven Tuberkuloseerkrankungen für das ganze Bundesgebiet zu geben.

Die Neuerkrankungen an aktiver Tuberkulose können jedoch nicht zu einem vollständigen Bundesergebnis zusammengestellt werden, da Württemberg-Hohenzollern sich mit seiner Meldelform über die Neuzugänge an aktiver Tuberkulose nicht den übrigen Ländern angeglichen hat.

Bezüglich grundsätzlicher Fragen verweisen wir auf die vorausgegangenen Statistischen Berichte. Es sei weiterhin noch bemerkt, daß es sich bei den mitgeteilten Zahlen, solange die Untersuchungen auf freiwilliger Basis erfolgen, immer nur um die erfaßten Erkrankungen handelt und damit um die untersten Werte. Bei Beurteilung der Tuberkulose-Morbidität muß auch beachtet werden, daß durch die Statistik der Neuerkrankungen nur die Neuzugänge (erstmalig Erkrankte) erfaßt werden, nicht aber die Besserungen oder Verschlechterungen (Verschiebungen zwischen den Gruppen).

Um das Bild über die Tuberkulose im Bundesgebiet und West-Berlin abzurunden, werden in der Anlage auch die Tuberkulose-Sterbeziffern des 3. Vierteljahres 1951 und zum Vergleich die des 1., 2. und 3. Vierteljahres 1950 sowie des 1. und 2. Vierteljahres 1951 auf Grund der standesamtlichen Meldungen beigelegt.

Neuerkrankungen<sup>1)</sup> an aktiver Tuberkulose  
im Bundesgebiet und West-Berlin

im 3. Vierteljahr 1951

Land	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
	ansteckend (offen)			nicht an- steckend (aktiv ge- schlossen)	insgesamt		
	mit Bazil- lennachweis	ohne Bazillen- nachweis	insgesamt				

Grundzahlen

Schleswig-Holstein	322	238	560	1 729	2 289	273	2 562
Hamburg	226	111	337	1 131	1 468	99	1 567
Niedersachsen	925	482	1 407	3 233	4 640	691	5 331
Nordrhein-Westfalen	1 886	485	2 371	4 801	7 172	1 238	8 410
Bremen	52	27	79	261	340	64	404
Hessen	420	141	561	1 046	1 607	434	2 041
Württemberg-Baden	346	149	495	1 540	2 035	357	2 392
Bayern	941	386	1 327	2 329	3 656	547	4 203
Rheinland-Pfalz	349	172	521	937	1 458	328	1 786
Baden	157	34	191	464	655	131	786
Württemberg-Hohenz. <sup>2)</sup>	.	.	236	.	.	97	.
Bundesgebiet <sup>3)</sup>	5 624	2 225	7 849	17 471	25 320	4 162	29 482
West-Berlin	371	389	760	1 094	1 854	155	2 009

Verhältniszahlen  
auf 10 000 der Bevölkerung

Schleswig-Holstein	5,1	3,7	8,8	27,2	36,1	4,3	40,4
Hamburg	5,5	2,7	8,1	27,3	35,4	2,4	37,8
Niedersachsen	5,4	2,8	8,3	19,0	27,3	4,1	31,4
Nordrhein-Westfalen	5,6	1,4	7,0	14,1	21,1	3,6	24,8
Bremen	3,6	1,9	5,4	18,0	23,5	4,4	27,9
Hessen	3,8	1,3	5,1	9,5	14,6	3,9	18,5
Württemberg-Baden	3,5	1,5	4,9	15,4	20,3	3,6	23,9
Bayern	4,1	1,7	5,8	10,1	15,9	2,4	18,2
Rheinland-Pfalz	4,5	2,2	6,7	12,1	18,8	4,2	23,0
Baden	4,5	1,0	5,5	13,4	18,8	3,8	22,6
Württemberg-Hohenz. <sup>2)</sup>	.	.	7,4	.	.	3,0	.
Bundesgebiet <sup>3)</sup>	4,8	1,9	6,6	14,8	21,4	3,5	24,9
West-Berlin	6,8	7,1	13,9	20,1	34,0	2,8	36,8

1) Nur Neuzugänge, keine Zugänge aus anderen Gruppen.- 2) Aus dem wöchentlichen Bericht über die Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten.- 3) Bundesgebietssumme, ohne die Ergebnisse von Württemberg-Hohenzollern.

**Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten  
im Bundesgebiet und West-Berlin  
am 30.9.1951**

Land	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
	ansteckend (offen)			nicht an- steckend. (aktiv ge- schlossen)	insgesamt		
	mit Bazil- lennachweis	ohne Bazil- lennachweis	insgesamt				
<b>Grundzahlen</b>							
Schleswig-Holstein	5 118	3 472	8 590	23 237	31 827	4 206	36 033
Hamburg	4 226	2 620	6 846	19 012	25 858	2 837	28 695
Niedersachsen	15 941	6 963	22 904	40 181	63 085	10 561	73 646
Nordrhein-Westfalen	28 276	13 513	41 789	86 333	128 122	25 204	153 326
Bremen	1 447	980	2 427	5 988	8 415	1 167	9 582
Hessen	8 078	2 043	10 121	17 593	27 714	6 218	33 932
Württemberg-Baden	7 252	4 302	11 554	23 356	34 910	5 952	40 862
Bayern	15 575	8 587	24 162	36 225	60 387	8 538	68 925
Rheinland-Pfalz	5 041	3 448	8 489	15 800	24 289	6 106	30 395
Baden	2 110	946	3 056	6 627	9 683	1 956	11 639
Württemberg-Hohenz.	1 726	752	2 478	4 609	7 087	1 791	8 878
Bundesgebiet	94 790	47 626	142 416	278 961	421 377	74 536	495 913
West-Berlin	8 714	4 564	13 278	20 512	33 790	3 937	37 727

	Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung						
	mit Bazil- lennachweis	ohne Bazil- lennachweis	insgesamt	nicht an- steckend. (aktiv ge- schlossen)	insgesamt	Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
Schleswig-Holstein	20,4	13,9	34,3	92,7	127,0	16,8	143,8
Hamburg	25,6	15,9	41,5	115,3	156,8	17,2	174,0
Niedersachsen	23,7	10,4	34,1	59,7	93,8	15,7	109,5
Nordrhein-Westfalen	20,9	10,0	30,9	63,8	94,8	18,6	113,4
Bremen	25,1	17,0	42,0	103,7	145,7	20,2	165,9
Hessen	18,4	4,7	23,1	40,1	63,2	14,2	77,4
Württemberg-Baden	18,2	10,8	29,0	58,7	87,7	15,0	102,7
Bayern	17,1	9,4	26,5	39,7	66,1	9,3	75,5
Rheinland-Pfalz	16,3	11,1	27,4	51,0	78,4	19,7	98,1
Baden	15,2	6,8	22,1	47,9	69,9	14,1	84,1
Württemberg-Hohenz.	13,6	5,9	19,5	36,3	55,8	14,1	69,9
Bundesgebiet	19,7	9,9	29,5	57,8	87,4	15,5	102,8
West-Berlin	40,2	21,0	61,2	94,6	155,8	18,2	174,0

Neuerkrankungen und Bestand an aktiver Tuberkulose  
im Bundesgebiet und West-Berlin  
1948 bis 1951

Berichtszeit	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
	ansteckend (offen)			nicht ansteckend (aktiv geschlossen)	insgesamt		
	mit Bazillennachweis	ohne Bazillennachweis	insgesamt				
Neuerkrankungen <sup>1)</sup> auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr							
Bundesgebiet							
1948 <sup>2)</sup>	5,9	3,1	9,0	30,2	39,2	5,7	44,9
1949 <sup>3)</sup>	5,1	2,4	7,5	20,4	28,0	4,6	32,6
1950 <sup>4)</sup>	5,0	2,2	7,2	15,8	23,0	3,5	26,5
1. Vierteljahr)	5,4	2,3	7,8	16,9	24,7	3,7	28,4
2. Vierteljahr) <sup>3)</sup>	5,3	2,3	7,7	16,8	24,5	3,8	28,2
3. Vierteljahr).	4,9	2,1	7,0	16,0	23,1	3,4	26,5
1951							
1. Vierteljahr)	5,1	2,0	7,1	14,8	22,0	3,4	25,3
2. Vierteljahr) <sup>4)</sup>	5,6	2,2	7,9	16,4	24,3	4,0	28,2
3. Vierteljahr)	4,8	1,9	6,6	14,8	21,4	3,5	24,9
West-Berlin							
1949	8,4	11,3	19,7	39,7	59,4	5,6	65,1
1950	7,7	8,1	15,8	26,5	42,3	3,2	45,4
1. Vierteljahr	7,6	9,3	16,9	31,7	48,7	3,0	51,7
2. Vierteljahr	8,5	8,4	16,9	28,4	45,3	3,1	48,4
3. Vierteljahr	7,4	7,8	15,2	24,7	39,9	3,0	42,9
1951							
1. Vierteljahr	7,8	7,9	15,7	21,3	37,0	2,8	39,9
2. Vierteljahr	8,8	7,9	16,7	24,7	41,4	3,1	44,5
3. Vierteljahr	6,8	7,1	13,9	20,1	34,0	2,8	36,8
Bestand <sup>5)</sup> auf 10 000 der Bevölkerung							
Bundesgebiet							
1948 <sup>2)</sup>	16,5	10,1	26,7	71,3	97,9	15,3	113,2
1949	17,5 <sup>a)</sup>	10,0 <sup>a)</sup>	27,5 <sup>a)</sup>	65,9 <sup>b)</sup>	94,2 <sup>c)</sup>	16,2 <sup>b)</sup>	110,5 <sup>c)</sup>
1950	18,8	10,0	28,9	60,2	89,0	15,7	104,7
1. Vierteljahr)	17,6	10,0	27,6	63,1	90,7	15,8	106,5
2. Vierteljahr) <sup>6)</sup>	18,1	10,1	28,2	62,4	90,6	15,8	106,4
3. Vierteljahr)	18,8	10,2	29,0	62,7	91,7	16,1	107,8
1951							
1. Vierteljahr	19,0	9,9	28,8	58,5	87,3	15,3	102,6
2. Vierteljahr	19,4	9,9	29,3	58,2	87,6	15,4	103,0
3. Vierteljahr	19,7	9,9	29,5	57,8	87,4	15,5	102,8
West-Berlin							
1949	39,2	28,2	67,4	120,4	187,7	26,6	214,4
1950	39,1	23,3	62,4	99,4	161,8	21,1	182,9
1. Vierteljahr	38,8	26,9	65,6	114,8	180,5	25,4	205,9
2. Vierteljahr	39,1	25,5	64,6	110,4	175,0	24,2	199,2
3. Vierteljahr	39,4	24,6	63,9	106,3	170,3	22,8	193,0
1951							
1. Vierteljahr	39,3	22,5	61,8	94,8	156,6	19,4	176,0
2. Vierteljahr	40,1	21,7	61,8	95,0	156,8	18,7	175,4
3. Vierteljahr	40,2	21,0	61,2	94,6	155,8	18,2	174,0

1) Nur Neuzugänge, keine Zugänge aus anderen Gruppen.- 2) Im Land Bremen nur der Stadtkreis enthalten; ohne Rheinland-Pfalz, Baden und Württemberg-Hohenzollern.- 3) Ohne Baden und Württemberg-Hohenzollern.- 4) Ohne Württemberg-Hohenzollern. - 5) Bestand am Ende des Jahres, bzw. Vierteljahres.- 6) Ohne Baden.  
a) Ohne Kreis Reutlingen. b) Ohne Kreis Reutlingen und Biberach. c) Ohne Württemberg-Hohenzollern.

Sterbefälle an Tuberkulose der Atmungsorgane  
in den Ländern des Bundesgebietes und West-Berlin  
(auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr)

vorläufiges Ergebnis der standesamtlichen Meldungen

Land	1950			1951		
	1. Vj.	2. Vj.	3. Vj.	1. Vj.	2. Vj.	3. Vj.
Schleswig-Holstein	3,3	3,1	2,5	3,5	3,0	2,9
Hamburg	4,5	3,5	3,2	3,6	3,3	2,9
Niedersachsen	3,4	3,3	2,6	3,6	3,0	2,8
Nordrhein-Westfalen	4,3	3,6	3,2	4,0	3,6	2,9
Bremen	3,6	3,6	3,3	3,4	3,7	2,8
Hessen	3,1	3,0	2,4	3,1	2,8	2,2
Württemberg-Baden	3,1	3,2	2,6	3,0	2,8	2,5
Bayern	3,5	3,3	2,9	3,5	3,4	2,7
Rheinland-Pfalz	3,5	3,0	2,6	4,0	3,1	2,5
Baden	3,4	2,9	1,8	2,6	3,1	2,6
Württemberg-Hohenzoll.	3,2	2,9	2,2	2,1	1,6	1,9
Bundesgebiet	3,7	3,3	2,8	3,6	3,2	2,7
West-Berlin	5,1	4,3	4,5	4,6	4,9	4,0

Sterbefälle an Tuberkulose anderer Organe  
(einschl. Miliartuberkulose)  
in den Ländern des Bundesgebietes und West-Berlin  
( auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr )

vorläufiges Ergebnis der standesamtlichen Meldungen

Land	1950			1951		
	1. Vj.	2. Vj.	3. Vj.	1. Vj.	2. Vj.	3. Vj.
Schleswig-Holstein	0,6	0,8	0,6	0,5	0,8	0,6
Hamburg	0,3	0,5	0,2	0,3	0,2	0,3
Niedersachsen	0,9	0,8	0,7	0,6	0,6	0,7
Nordrhein-Westfalen	0,7	0,8	0,6	0,6	0,6	0,6
Bremen	1,3	0,7	0,6	0,7	0,6	0,8
Hessen	0,6	0,6	0,6	0,5	0,4	0,4
Württemberg-Baden	0,6	0,7	0,5	0,7	0,6	0,5
Bayern	0,6	0,7	0,6	0,5	0,5	0,5
Rheinland-Pfalz	0,9	0,9	0,6	0,8	0,7	0,6
Baden	1,1	0,8	0,7	0,9	0,9	0,5
Württemberg-Hohenzoll.	0,9	0,8	0,8	0,6	1,0	0,7
Bundesgebiet	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6	0,5
West-Berlin	0,5	0,5	0,7	0,6	0,6	0,5