

STATISTISCHE BERICHTE



Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

Arb.-Nr. VIII/3/14

Erschienen am 25. März 1952

Erkrankungen an aktiver Tuberkulose
im Bundesgebiet und West - Berlin
im 4. Vierteljahr 1951

Ab 1951 ist es möglich, Zusammenstellungen über den Bestand an aktiven Tuberkuloseerkrankungen für das ganze Bundesgebiet zu geben.

Die Neuerkrankungen an aktiver Tuberkulose können jedoch nicht zu einem vollständigen Bundesergebnis zusammengestellt werden, da Württemberg-Hohenzollern sich mit seiner Meldform über die Neuzugänge an aktiver Tuberkulose nicht den übrigen Ländern angeglichen hat.

Bezüglich grundsätzlicher Fragen verweisen wir auf die vorausgegangenen Statistischen Berichte. Es sei weiterhin noch bemerkt, daß es sich bei den mitgeteilten Zahlen, solange die Untersuchungen auf freiwilliger Basis erfolgen, immer nur um die erfafte n Erkrankungen handelt und damit um die untersten Werte. Bei Beurteilung der Tuberkulose-Morbidität muß auch beachtet werden, daß durch die Statistik der Neuerkrankungen nur die Neuzugänge (erstmalig Erkrankte) erfaßt werden, nicht aber die Besserungen oder Verschlechterungen (Verschiebungen zwischen den Gruppen).

Um das Bild über die Tuberkulose im Bundesgebiet und West-Berlin abzurunden, werden in der Anlage auch die vierteljährlichen Tuberkulose-Sterbeziffern 1951 und zum Vergleich die entsprechenden des Jahres 1950 auf Grund der standesamtlichen Meldungen beigelegt.

Neuerkrankungen ¹⁾ an aktiver Tuberkulose

im Bundesgebiet und West-Berlin

im 4. Vierteljahr 1951

Land	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
	ansteckend (offen)			nicht ansteckend (aktiv geschlossen)	insgesamt		
	mit Bazillennachweis	ohne Bazillennachweis	insgesamt				

Grundzahlen

Schleswig-Holstein	337	167	504	1 451	1 955	196	2 151
Hamburg	220	110	330	1 106	1 436	160	1 596
Niedersachsen	829	412	1 241	2 853	4 094	514	4 608
Nordrhein-Westfalen	1 750	467	2 217	4 000	6 217	1 079	7 296
Bremen	63	46	109	275	384	66	450
Hessen	392	112	504	877	1 381	332	1 713
Württemberg-Baden	379	142	521	1 434	1 955	341	2 296
Bayern	874	375	1 249	2 175	3 424	553	3 977
Rheinland-Pfalz	302	166	468	715	1 183	276	1 459
Baden	124	33	157	362	519	117	636
Württemberg-Hohenzoll. ²⁾	.	.	185	.	.	85	.
Bundesgebiet ³⁾	5 270	2 030	7 300	15 248	22 548	3 634	26 182
West-Berlin	387	378	765	1 068	1 833	153	1 986

Verhältniszahlen

auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr

Schleswig-Holstein	5,4	2,7	8,0	23,0	31,0	3,1	34,2
Hamburg	5,3	2,6	7,9	26,5	34,4	3,8	38,3
Niedersachsen	4,9	2,4	7,3	16,9	24,2	3,0	27,2
Nordrhein-Westfalen	5,1	1,4	6,5	11,7	18,2	3,2	21,3
Bremen	4,3	3,1	7,5	18,8	26,3	4,5	30,8
Hessen	3,5	1,0	4,6	7,9	12,5	3,0	15,5
Württemberg-Baden	3,8	1,4	5,2	14,3	19,5	3,4	22,9
Bayern	3,8	1,6	5,4	9,5	14,9	2,4	17,3
Rheinland-Pfalz	3,9	2,1	6,0	9,1	15,1	3,5	18,6
Baden	3,5	0,9	4,4	10,3	14,8	3,3	18,2
Württemberg-Hohenzoll. ²⁾	.	.	5,3	.	.	2,7	.
Bundesgebiet ³⁾	4,3	1,7	6,0	12,5	18,5	3,0	21,5
West-Berlin	7,1	6,9	14,0	19,5	33,5	2,8	36,3

¹⁾ Nur Neuzugänge, keine Zugänge aus anderen Gruppen.- ²⁾ Aus dem wöchentlichen Bericht über die Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten.- ³⁾ Bundesgebietssumme, ohne die Ergebnisse von Württemberg-Hohenzollern.-

Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten
in Bundesgebiet und West-Berlin
am 31. 12. 1951

Land	Tuberkulose der Atemorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
	ansteckend (offen)			nicht an- steckend (aktiv ge- schlossen)	insgesamt		
	mit Bazi- lennachweis	ohne Bazi- lennachweis	insgesamt				
Grundzahlen							
Schleswig-Holstein	5 095	3 352	8 447	23 108	31 555	4 112	35 667
Hamburg	4 277	2 638	6 915	19 167	26 082	2 800	28 882
Niedersachsen	16 046	6 692	22 738	39 484	62 222	10 339	72 561
Nordrhein-Westfalen	28 391	13 493	41 884	83 753	125 637	24 655	150 292
Bremen	1 468	939	2 457	5 800	8 257	1 123	9 380
Hessen	7 785	1 962	9 747	17 767	27 514	6 117	33 631
Württemberg-Baden	7 270	4 284	11 554	22 921	34 475	5 813	40 288
Bayern	15 499	8 293	23 792	34 357	58 149	8 271	66 420
Rheinland-Pfalz	4 952	3 247	8 199	15 184	23 383	5 708	29 091
Baden	2 122	884	3 006	6 685	9 691	1 923	11 614
Württemberg-Hohenzollern	1 650	656	2 306	5 119	7 425	2 296	9 721
Bundesgebiet	94 555	46 490	141 045	273 345	414 390	73 157	487 547
West-Berlin	8 785	4 246	13 031	20 306	33 337	3 693	37 030

Verhältniszahlen
auf 10 000 der Bevölkerung

Schleswig-Holstein	20,5	13,5	34,0	92,9	126,9	16,5	143,4
Hamburg	25,8	15,9	41,7	115,6	157,3	16,9	174,2
Niedersachsen	23,9	10,0	33,9	58,8	92,7	15,4	108,1
Nordrhein-Westfalen	20,9	9,9	30,8	61,6	92,4	18,1	110,5
Bremen	25,3	11,0	42,3	99,8	142,1	19,3	161,4
Hessen	17,7	4,5	22,2	40,4	62,6	13,9	76,6
Württemberg-Baden	18,3	10,8	29,0	57,6	86,6	14,6	101,2
Bayern	17,0	9,1	26,1	37,7	63,8	9,1	72,8
Rheinland-Pfalz	15,9	10,4	26,4	48,8	75,2	18,3	93,5
Baden	15,3	6,4	21,6	48,0	69,6	13,8	83,5
Württemberg-Hohenzollern	13,0	5,2	18,1	40,2	58,3	15,0	76,3
Bundesgebiet	19,6	9,6	29,2	56,6	85,8	15,1	100,9
West-Berlin	40,4	19,5	60,0	93,5	153,5	17,0	170,5

Neuerkrankungen und Bestand an aktiver Tuberkulose
im Bundesgebiet und West - Berlin
1950 und 1951

Berichtszeit	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
	ansteckend (offen)			nicht ansteckend (geschlossene)	insgesamt		
	mit Bazillennachweis	ohne Bazillennachweis	insgesamt				
Neuerkrankungen ¹⁾ auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr							
Bundesgebiet 1950 ²⁾	5,0	2,2	7,2	15,8	23,0	3,5	26,5
1.Vierteljahr)	5,4	2,3	7,8	16,9	24,7	3,7	28,4
2.Vierteljahr) 3)	5,3	2,3	7,7	16,8	24,5	3,8	28,2
3.Vierteljahr)	4,9	2,1	7,0	16,0	23,1	3,4	26,5
4.Vierteljahr)	4,4	2,0	6,4	13,4	19,8	3,2	23,0
1951							
1.Vierteljahr)	5,1	2,0	7,1	14,8	22,0	3,4	25,3
2.Vierteljahr) 2)	5,6	2,2	7,9	16,4	24,3	4,0	28,2
3.Vierteljahr)	4,8	1,9	6,6	14,8	21,4	3,5	24,9
4.Vierteljahr)	4,3	1,7	6,0	12,5	16,5	3,0	21,5
West-Berlin							
1950	7,7	8,1	15,8	26,5	42,3	3,2	45,4
1.Vierteljahr	7,6	9,3	16,9	31,7	48,7	3,0	51,7
2.Vierteljahr	8,5	8,4	16,9	28,4	45,3	3,1	48,4
3.Vierteljahr	7,4	7,8	15,2	24,7	39,9	3,0	42,9
4.Vierteljahr	7,5	7,1	14,6	22,3	35,9	3,6	40,5
1951							
1.Vierteljahr	7,8	7,9	15,7	21,3	37,0	2,8	39,9
2.Vierteljahr	8,8	7,9	16,7	24,7	41,4	3,1	44,5
3.Vierteljahr	6,8	7,1	13,9	20,1	34,0	2,8	36,8
4.Vierteljahr	7,1	6,9	14,0	19,5	33,5	2,8	36,3
Bestand ⁴⁾ auf 10 000 der Bevölkerung							
Bundesgebiet 1950	18,8	10,0	28,9	60,2	89,0	15,7	104,7
1.Vierteljahr)	17,6	10,0	27,5	63,1	90,7	15,8	106,5
2.Vierteljahr) 5)	18,1	10,1	28,2	62,4	90,6	15,9	106,4
3.Vierteljahr)	18,8	10,2	29,0	62,7	91,7	16,1	107,8
4.Vierteljahr	18,8	10,0	28,9	60,2	89,0	15,7	104,7
1951							
1.Vierteljahr	19,0	9,9	28,8	63,5	87,3	15,3	102,6
2.Vierteljahr	19,4	9,9	29,3	68,2	87,6	15,4	103,0
3.Vierteljahr	19,7	9,9	29,5	67,8	87,4	15,5	102,8
4.Vierteljahr	19,8	9,6	29,2	65,5	85,8	15,1	100,9
West-Berlin							
1950	39,1	23,3	62,4	90,4	161,8	21,1	182,9
1.Vierteljahr	38,8	26,9	65,6	114,8	180,5	25,4	205,9
2.Vierteljahr	39,1	25,5	64,6	110,7	175,0	24,2	199,2
3.Vierteljahr	39,4	24,6	63,9	106,3	170,3	22,8	193,0
4.Vierteljahr	39,1	23,3	62,4	99,4	161,8	21,1	182,9
1951							
1.Vierteljahr	39,3	22,5	61,8	94,8	156,6	19,4	176,0
2.Vierteljahr	40,1	21,7	61,8	95,0	156,8	18,7	175,4
3.Vierteljahr	40,2	21,0	61,2	94,5	153,3	18,2	174,0
4.Vierteljahr	40,4	19,5	60,0	93,5	152,5	17,0	170,5

1) Nur Neuzugänge, keine Zugänge aus anderen Gruppen.- 2) Ohne Mittelberg-Hohenzollern 3) Ohne Baden und Württemberg-Hohenzollern.- 4) Bestand am Ende des Jahres, bzw. Vierteljahres.- 5) Ohne Baden.

Sterbefälle an Tuberkulose der Atmungsorgane

in den Ländern des Bundesgebietes und West-Berlin
(auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr)

vorläufiges Ergebnis der standesamtlichen Meldungen

Land	1950				1951			
	1.Vj.	2.Vj.	3.Vj.	4.Vj.	1.Vj.	2.Vj.	3.Vj.	4.Vj.
Schleswig-Holstein	3,3	3,1	2,5	3,5	3,5	3,0	2,9	3,4
Hamburg	4,5	3,5	3,2	3,3	3,6	3,3	2,9	3,1
Niedersachsen	3,4	3,3	2,6	3,0	3,6	3,0	2,8	2,7
Nordrhein-Westfalen	4,3	3,6	3,2	3,5	4,0	3,6	2,9	3,3
Bremen	3,6	3,6	3,3	3,3	3,4	3,7	2,8	3,1
Hessen	3,1	3,0	2,4	2,4	3,1	2,8	2,2	2,5
Württemberg-Baden	3,1	3,2	2,6	2,8	3,0	2,8	2,5	2,8
Bayern	3,5	3,3	2,9	3,2	3,5	3,4	2,7	3,0
Rheinland-Pfalz	3,5	3,0	2,6	3,2	4,0	3,1	2,5	3,1
Baden	3,4	2,9	1,8	2,5	2,6	3,1	2,6	2,5
Württemberg-Hohenzollern	3,2	2,9	2,2	2,0	2,1	1,6	1,9	2,2
Bundesgebiet	3,7	3,3	2,8	3,1	3,6	3,2	2,7	3,0
West-Berlin	5,1	4,3	4,5	5,1	4,6	4,9	4,0	4,4

Sterbefälle an Tuberkulose anderer Organe
(einschl. Miliartuberkulose)

in den Ländern des Bundesgebietes und West-Berlin
(auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr)

vorläufiges Ergebnis der standesamtlichen Meldungen

Land	1950				1951			
	1.Vj.	2.Vj.	3.Vj.	4.Vj.	1.Vj.	2.Vj.	3.Vj.	4.Vj.
Schleswig-Holstein	0,6	0,8	0,6	0,8	0,5	0,8	0,6	0,6
Hamburg	0,3	0,5	0,2	0,3	0,3	0,2	0,3	0,4
Niedersachsen	0,9	0,8	0,7	0,6	0,6	0,6	0,7	0,6
Nordrhein-Westfalen	0,7	0,8	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5
Bremen	1,3	0,7	0,6	0,8	0,7	0,6	0,8	0,4
Hessen	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,4	0,4	0,6
Württemberg-Baden	0,6	0,7	0,5	0,6	0,7	0,6	0,5	0,6
Bayern	0,6	0,7	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4
Rheinland-Pfalz	0,9	0,9	0,6	0,7	0,8	0,7	0,6	0,6
Baden	1,1	0,8	0,7	0,8	0,9	0,9	0,5	0,8
Württemberg-Hohenzollern	0,9	0,8	0,8	0,5	0,6	1,0	0,7	0,6
Bundesgebiet	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5
West-Berlin	0,5	0,5	0,7	0,6	0,6	0,6	0,5	0,3