

STATISTISCHE BERICHTE




Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

Arb.-Nr. III/4/310

Erschienen am 3. Januar 1961

Ernteschätzung von Futterpflanzen

Anfang Oktober 1960



Weitere Ergebnisse, z.T. in tieferer regionaler Gliederung,
in den Veröffentlichungen aller Statistischen Landesämter
unter der Nr. C II 1.

Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit Quellenangabe gestattet.

Über Anbau und Ernte von Futterpflanzen werden mehrere *) Statistische Berichte veröffentlicht, deren Fertigstellung sich in diesem Jahr infolge der mit der Landwirtschaftszählung verbundenen Bodennutzungserhebung verzögert hat. Nach Vorliegen der endgültigen Ergebnisse über den diesjährigen Anbau einiger Futterpflanzen im Hauptfruchtbau läßt sich ersehen, daß der Futterbau 1960 z. T. wesentlich gegenüber dem Vorjahr erweitert worden ist. So ist die Anbaufläche von Serradella, Esparsette und dgl. im Bundesgebiet von rund 8 000 auf rund 17 000 ha, d. h. um 124 vH vergrößert worden und ist auch um die Hälfte größer als im langjährigen Durchschnitt. Beim Grünmais ist die Vergrößerung nicht so erheblich; sie beträgt aber gegenüber dem Vorjahr auch rund ein Drittel und 9 vH gegenüber 1954/59. Nur der Wickenanbau ist geringfügig gestiegen und bleibt gegenüber dem langjährigen Durchschnitt zurück.

Anbau und Ernte einiger Futterpflanzen im Hauptfruchtbau
Bundesgebiet ohne Berlin

Fruchtart	JD 1954/59	1958	1959	1960	Zu- (+) bzw. Abnahme (-) 1960 gegen	
					JD 1954/59	1959
					vH	
Fläche in 1 000 ha						
Serradella, Esparsette u. dgl.	11,1	10,3	7,7	17,4	+ 56,3	+ 124,3
Grünmais } zur Grünfutter-, Gärfutter-	45,8	45,8	37,7	49,9	+ 8,8	+ 32,2
Wicken } oder Heugewinnung	25,3	23,5	18,8	19,3	- 23,8	+ 2,5
Hektarerträge in dz (Grünmasse)						
Serradella, Esparsette u. dgl.	208,0	218,1	198,3	238,0	+ 14,4	+ 20,0
Grünmais } zur Grünfutter-, Gärfutter-	351,6	378,5	312,3	367,7	+ 4,6	+ 17,7
Wicken } oder Heugewinnung	188,2	204,6	165,3	201,6	+ 7,1	+ 22,0
Gesamterträge in 1 000 t						
Serradella, Esparsette u. dgl.	231,1	223,7	153,5	413,4	+ 78,9	+ 169,4
Grünmais } zur Grünfutter-, Gärfutter-	1 610,6	1 733,6	1 178,1	1 833,3	+ 13,8	+ 55,6
Wicken } oder Heugewinnung	475,8	481,1	310,8	388,4	- 18,4	+ 25,0

*) "Die Rauhfutterernte" sowie "Die Zwischenfruchternte" erscheinen demnächst.

Die Hektarerträge der Futterpflanzen waren infolge der reichlichen Feuchtigkeit 1960 überdurchschnittlich. Bei den 3 genannten Arten liegen sie um rund 18 bis 22 vH über dem Vorjahr und um rund 5 bis 14 vH über dem langjährigen Durchschnitt. Infolge der Ausdehnung der Anbauflächen und der überdurchschnittlichen Hektarerträge sind die Gesamterträge in diesem Jahr wesentlich größer als im Vorjahr. So ist an Serradella und Esparsette zur Grün-, Gärfutter- und Heugewinnung in Grünmasse im Bundesgebiet eine Ernte von über 400 000 t eingebracht worden, d. s. 170 vH mehr als im Vorjahr, aber auch rund 80 vH mehr als 1954/59. Die Ernte an Grünmais beträgt rund 1,8 Mill. t, d. s. über die Hälfte mehr als 1959 und um 14 vH mehr als im langjährigen Durchschnitt. Auch die Wickenernte ist trotz der geringfügigen Steigerung der Anbaufläche um ein Viertel größer als die vorjährige, bleibt aber gegenüber 1954/59 um 18 vH zurück.

Endgültige Ernteschätzung

im Haupt

Lfd. Nr.	Land	Jahr	Serradella, Esparsette und gemischter Anbau von Klee und Luzerne		
			Fläche	Ertrag 1)	
				je	im
				Hektar	ganzen
ha	dz	t			
1	Schleswig-Holstein	1960	322	178,6	5 750
2	" "	1959	127	160,2	2 035
3	Hamburg	1960	1	180,0	18
4	"	1959	2	128,3	26
5	Niedersachsen	1960	600	198,1	11 886
6	"	1959	482	52,6	2 535
7	Bremen	1960	-	-	-
8	"	1959	-	-	-
9	Nordrhein-Westfalen	1960	3 160	258,6	81 718
10	" "	1959	554	163,3	9 047
11	Hessen	1960	4 262	226,3	96 467
12	"	1959	187	164,4	3 074
13	Rheinland-Pfalz	1960	269	191,9	5 162
14	" "	1959	210	170,1	3 572
15	Baden-Württemberg	1960	5 752	257,6	148 189
16	" "	1959	4 025	227,3	91 470
17	Bayern	1960	2 947	214,0	63 066
18	"	1959	2 086	193,7	40 406
19	Saarland	1960	56	212,2	1 188
20	"	1959	69	192,0	1 325
21	Bundesgebiet ohne Berlin	1960	17 369	238,0	413 444
22	" " "	1959	7 742	198,3	153 490
23	Berlin (West)	1960	9	185,2	170
24	" "	1959	5	200,0	110

1) In Grünmasse berechnet.

einiger Futterpflanzen
fruchtbau 1960

Grünmais			Wicken und Süßlupinen			Lfd. Nr.
zur Grünfutter-, Gärfutter- oder Heugewinnung						
Fläche	Ertrag 1)		Fläche	Ertrag 1)		
	je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen	
ha	dz	t	ha	dz	t	
626	364,7	22 830	3 198	177,6	56 793	1
279	125,8	3 510	1 945	197,0	38 317	2
49	338,5	1 659	16	198,2	317	3
20	293,8	588	10	150,0	150	4
1 098	382,1	41 955	1 446	209,5	30 294	5
479	125,8	6 026	1 431	55,8	7 985	6
14	308,5	432	1	199,0	20	7
10	300,0	300	2	199,0	40	8
2 505	402,1	100 726	710	221,8	15 748	9
1 004	261,7	26 275	1 086	143,9	15 628	10
5 904	399,1	235 648	638	199,1	12 701	11
3 320	261,9	86 951	1 378	116,4	16 040	12
4 149	311,6	129 283	2 723	188,8	51 410	13
2 880	241,7	69 615	1 215	156,4	19 008	14
10 564	400,8	423 358	6 873	220,5	151 576	15
10 854	352,3	382 358	3 704	194,1	71 906	16
24 865	351,9	874 999	3 407	189,0	64 392	17
18 815	319,4	600 951	7 796	175,8	137 054	18
82	294,8	2 417	256	202,9	5 194	19
62	239,4	1 484	237	196,9	4 667	20
49 856	367,7	1 833 307	19 268	201,6	388 445	21
37 723	312,3	1 178 058	18 804	165,3	310 795	22
30	370,2	1 127	13	219,0	280	23
46	340,4	1 562	5	267,2	129	24