

STATISTISCHE BERICHTE

27. FEB. 2009 07a



Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

ZG 43

Arb.-Nr. III/5/45

Erschienen am 20. August 1954

Signatur ZG 1
3 B 2 I / K 20

Wachstumstand und Ernteschätzung von

Gemüse und Erdbeeren

Juli 1954

(4060)

Nachdruck - auch auszugsweise -
nur mit Quellenangabe gestattet

Die Witterung war von Mitte Juni bis Mitte Juli fast im ganzen Bundesgebiet zu kühl (bis 3 Grad unter der Norm des Monatsmittels) und zu niederschlagsreich (Monatssumme bis 300 % der Norm). Die Sonnenscheindauer bewegte sich im allgemeinen zwischen 50 und 80 % der Normalwerte. In den Meldungen der Gemüseberichterstatter wurden die außergewöhnlichen Witterungsverhältnisse für die weitere Entwicklung der Gemüsekulturen allgemein ungünstig beurteilt.

Die Wachstumsstandsnoten der Herbstgemüsearten (Kopfkohl, Möhren, Rote Rüben, Zwiebeln) zeigen durchweg geringere Werte als zur gleichen Zeit des Vorjahres, wenn auch gegenüber den Vormonatsbeurteilungen eine leichte Besserung feststellbar ist. Verhältnismäßig günstig werden die Gemüsekulturen in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und zum Teil auch in Hessen beurteilt, während der Wachstumsstand in Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Bayern den Bundesdurchschnitt im allgemeinen nicht erreicht.

Ernteschätzungen

Die Ernteschätzungen beziehen sich auf Frühweißkohl, Frührotkohl, Frühwirsingkohl ohne Adventswirsingkohl, Frühblumenkohl, Grüne Pflückerbsen, Dicke Bohnen, Winterzwiebeln und Frühe Möhren. Gegenüber den Vorschätzungen vom Juni d.J. (vergl. Stat.Ber.vom 3. Juli 1954 - Arb.Nr. III/5/42) haben sich die Ernterwartungen nur bei Dicken Bohnen und Frühblumenkohl etwas verringert, während im übrigen die Vorschätzungen vom Vormonat um ein geringes übertroffen werden. Im Vergleich zum langjährigen Durchschnitt 1949/1953 erreichen die Hektarerträge 1954 von Kopfkohlarten (Frühweißkohl, Frühwirsing, Frührotkohl) sowie von Winterzwiebeln diesen Durchschnitt nicht, während Frühblumenkohl, Grüne Erbsen, Dicke Bohnen und Frühe Möhren in diesem Jahr höhere Erträge aufweisen als im Durchschnitt 1949/1953.

Den Ernteberechnungen liegen noch die Flächen nach der Erhebung über den beabsichtigten Anbau vom Februar 1954 zugrunde. Danach ergeben sich für die nachfolgend aufgeführten Sommergemüsearten rund 174 000 t gegenüber 196 000 t im Vorjahr.

Gemüseart	Ertragsschätzungen je Hektar			Voraussichtliche Erntemenge im ganzen		Veränderung 1954 gegen 1953	
	1954		1953	1954		t	vH
	Juli	Juni	Juli	1954	1953		
	dz.	dz.	dz.	t	t		
Frühweißkohl	253,9	251,4	278,5	29 147	35 835	- 6 688	-18,7
Frührotkohl	225,3	210,7	237,8	12 121	15 023	- 2 902	-19,3
Frühwirsingkohl	201,8	199,4	207,3	17 432	19 791	- 2 359	-11,9
Frühblumenkohl	170,4	177,2	169,4	22 047	21 047	+ 1 000	+ 4,7
Grüne Pflückerbsen	92,3	90,6	87,1	50 341	59 013	- 8 672	-14,7
Dicke Bohnen	118,9	122,3	113,0	15 800	16 464	- 664	- 4,0
Winterzwiebeln	144,3	123,8	137,5	3 781	3 902	- 121	- 3,2
Frühe Möhren	187,7	170,0	191,0	23 121	24 956	- 1 835	- 7,4
				173 790	196 031	-22 241	-11,3

Bemerkenswert sind die relativ günstigen Hektarerträge in einigen Hauptanbaugebieten, die zum Teil über dem Landesdurchschnitt liegen:

Hauptanbaugebiete K r e i s e	Früh- weiß- kohl	Früh- rot- kohl	Früh- wir- sing- kohl	Früh- blu- men- kohl	Grüne Pflück- erbsen
	dz	dz	dz	dz	dz
<u>Niedersachsen</u>					
Hannover-Land	257,3	264,6	-	159,0	-
Hamel-Pyrmont	-	275,0	-	-	-
Hildesheim Mbg.	-	-	-	144,8	-
Salzgitter-St.	-	-	-	-	113,3
Harburg	-	-	-	-	-
<u>Nordrhein-Westf.</u>					
Grevenbroich	-	247,1	-	181,4	103,9
Kempen-Krefeld	-	-	194,5	-	-
Bonn-Land	265,3	245,7	241,5	224,4	-

Faßt man die seit Mai 1954 durchgeführten Erntetermineitlungen aus Erntevorschätzungen und Ernteschätzungen zusammen, so ergibt sich für das erste Halbjahr 1954 eine Ernte von 346 000 t gegen 437 000 t im Vorjahr, was einem Erzeugungsrückgang von -21 vH entspricht.

Pflanzenkrankheiten und -schädlinge

Der Befall mit tierischen Schädlingen und Pflanzenkrankheiten ist in diesem Jahr außergewöhnlich groß. Insbesondere werden Kohldrehherzmücke, Kohlhornie, Zwiebelfliege, Brennfleckenkrankheit an Bohnen, Blattläuse und Kohlweißlingsraupen aus allen Gebieten gemeldet. Ferner werden noch Braunfäule an Tomaten besonders in Bayern und Baden-Württemberg, Möhrenfliegen besonders in Bayern und Nordrhein-Westfalen angegeben. Darüber hinaus wird in Baden-Württemberg ein starkes Auftreten von Engerlingen und Maulwurfsgrillen gemeldet.

Ernteschätzung von Erdbeeren

Die Erntevorschätzung von Erdbeeren im Juni, die noch einen Hektarertrag von rund 50 dz erwarten ließ, hat sich infolge der ungünstigen Witterungsbedingungen nicht erfüllt. Mit einem Hektarertrag von 46,4 dz nach der Julischätzung liegt das Ergebnis niedriger als im Vorjahr (52,1 dz) und auch niedriger als im fünfjährigen Mittel 1949 bis 1953 (50,9 dz). Damit dürfte auch der Gesamtertrag trotz erweiterten Anbaues etwa nur den Vorjahresumfang erreichen. Nach der Flächenfeststellung von Februar 1954 unter Berücksichtigung besonders starker Auswinterungsverluste in Niedersachsen ergäbe sich danach eine Ernte von rund 11 000 t.

Wachstumstand des

(Begutachtung)

Noten: 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 =

Lfd. Nr.	L a n d	Zeit	Herbst- weiß- kohl	Dauer- weiß- kohl	Herbst- rot- kohl	Dauer- rot- kohl
			1	2	3	4
1	Schleswig-Holstein	Juli	2,6	2,6	2,8	2,8
2	" "	Juni	2,8	.	2,9	.
3	Hamburg	Juli	3,1	3,0	3,2	2,8
4	" "	Juni	2,8	.	2,9	.
5	Niedersachsen	Juli	2,8	2,8	2,8	2,8
6	" "	Juni	2,9	.	3,0	.
7	Bremen	Juli
8	" "	Juni
9	Nordrhein-Westfalen	Juli	2,3	2,5	2,4	2,5
10	" "	Juni	2,4	.	2,6	.
11	Hessen	Juli	2,4	2,6	2,6	2,6
12	" "	Juni	2,6	.	2,7	.
13	Rheinland-Pfalz	Juli	2,8	2,6	2,7	2,8
14	" "	Juni	2,8	.	2,8	.
15	Baden-Württemberg	Juli	2,3	2,4	2,4	2,5
16	" "	Juni	2,5	.	2,6	.
17	Bayern	Juli	2,7	2,7	2,8	2,7
18	" "	Juni	2,7	.	2,8	.
19	<u>Bundesgebiet</u>	Juli	2,5	2,6	2,6	2,7
20	" "	Juni	2,6	.	2,7	.
21	" "	Juli 1953	2,3	2,4	2,4	2,4
22	West-Berlin	Juli	2,5	2,5	2,5	2,3
23	" "	Juni	3,0	.	2,9	.

Gemüses im Juli 1954

nach Noten)

mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering)

Herbst- wirsing- kohl	Dauer- wirsing- kohl	Mittelfr.- und Spät- blumen- kohl	Sommer- und Herbst- kopfsalat	Späte Möhren	Rote Rüben	Zwiebeln (Frühjahrs- aussaat)	Lfd. Nr.
5	6	7	8	9	10	11	
2,9	2,7	3,0	2,7	2,9	2,9	2,7	1
3,0	.	3,0	2,7	2,8	2,6	2,6	2
3,0	3,1	2,9	2,9	2,7	3,1	2,6	3
2,9	.	2,8	2,6	2,7	2,7	3,0	4
2,8	2,8	3,0	2,5	2,6	2,6	2,7	5
3,0	.	3,1	2,6	2,7	2,6	2,8	6
.	7
.	8
2,3	2,4	2,6	2,5	2,4	2,2	2,4	9
2,5	.	2,6	2,4	2,5	2,4	2,6	10
2,4	2,5	2,7	2,5	2,3	2,4	2,5	11
2,7	.	2,8	2,4	2,5	2,5	2,5	12
2,5	2,6	2,9	2,6	2,6	2,5	2,7	13
2,6	.	2,9	2,6	2,6	2,6	2,6	14
2,4	2,4	2,5	2,5	2,3	2,2	2,2	15
2,4	.	2,7	2,4	2,3	2,3	2,3	16
2,6	2,6	3,0	2,9	2,5	2,5	2,7	17
3,3	.	2,9	2,4	2,7	2,5	2,6	18
2,4	2,6	2,7	2,6	2,5	2,6	2,6	19
2,7	.	2,8	2,4	2,6	2,5	2,6	20
2,2	2,4	2,6	2,7	2,5	2,2	2,4	21
2,7	2,5	2,7	2,7	2,8	2,7	3,0	22
2,8	.	2,8	2,6	2,9	2,8	2,7	23

Ernteschätzung von

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr	Frühweißkohl			Frührotkohl		
			Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag	
				je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen
			ha	dz		ha	dz	
1	2	3	4	5	6			
1	Schleswig-Holstein	1954	213	323,8	68 969	52	299,0	15 548
2	" "	1953	293	331,0	97 119	70	302,0	21 197
3	Hamburg	1954	79	288,4	22 782	16	210,9	3 375
4	" "	1953	77	332,0	25 564	18	248,9	4 480
5	Niedersachsen	1954	118	254,6	30 144	59	227,8	13 373
6	" "	1953	148	265,8	39 337	76	224,0	16 998
7	Bremen	1954	6	291,7	1 750	3	353,3	1 060
8	" "	1953	5	404,2	2 021	3	376,7	1 130
9	Nordrhein-Westfalen	1954	366	239,0	87 473	178	242,9	43 233
10	" "	1953	366	279,1	102 157	235	260,9	61 323
11	Hessen	1954	61	266,5	16 254	36	234,2	8 432
12	" "	1953	61	252,9	15 424	39	255,2	9 951
13	Rheinland-Pfalz	1954	72	216,7	15 556	27	195,4	5 352
14	" "	1953	87	249,3	21 584	33	189,7	6 241
15	Baden-Württemberg	1954	107	239,5	25 558	77	226,7	17 430
16	" "	1953	106	275,4	29 245	63	241,0	15 186
17	Bayern	1954	126	182,4	22 982	90	149,0	13 411
18	" "	1953	131	197,7	25 898	86	159,6	13 728
19	<u>Bundesgebiet</u>	1954	1 148	253,9	291 468	538	225,3	121 214
20	" "	1953	1 274	281,3	358 349	623	241,1	150 234
21	" 5jähr.Ø	1949/53		266,1			226,5	
22	West-Berlin	1954	6	194,3	1 086	2	160,0	358
23	" "	1953	6	204,1	1 178	2	197,2	345

Gemüse im Juli 1954

Frühwirsingkohl			Frühblumenkohl			Grüne Pflückerbisen			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag		
	je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen	
ha	dz		ha	dz		ha	dz		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
38	276,4	10 503	102	178,9	18 248	1 342	87,0	116 754	1
53	260,0	13 663	87	176,0	15 308	1 778	92,9	165 145	2
168	265,3	44 572	189	226,9	42 890	15	89,8	1 346	3
152	295,4	44 901	192	226,9	43 565	15	94,5	1 418	4
43	165,0	7 029	190	140,4	26 659	2 625	95,2	249 834	5
49	178,9	8 838	187	148,1	27 650	2 997	89,6	268 409	6
2	206,0	412	7	204,3	1 430	8	74,0	592	7
1	238,0	238	9	206,7	1 860	32	85,9	2 749	8
275	192,9	53 059	420	175,4	73 682	349	89,7	31 297	9
339	198,7	67 355	414	169,4	70 131	387	87,1	33 723	10
66	206,9	13 653	58	191,7	11 120	222	89,9	19 963	11
71	166,2	11 797	70	192,9	13 504	246	75,6	18 602	12
65	173,5	11 219	52	145,6	7 550	118	65,8	7 782	13
125	177,1	22 054	39	138,2	5 367	114	64,1	7 317	14
87	190,4	16 505	133	169,8	22 544	667	102,3	68 285	15
67	196,4	13 276	120	158,8	18 982	921	92,6	85 285	16
120	144,7	17 365	143	114,3	16 343	109	69,3	7 557	17
100	157,9	15 786	125	112,8	14 103	108	69,3	7 483	18
864	201,8	174 317	1 294	170,4	220 466	5 455	92,3	503 410	19
337	206,8	197 908	1 243	169,3	210 470	6 598	89,4	590 131	20
	203,2 ¹⁾			160,5			84,0		21
7	148,0	1 024	6	131,0	846	4	51,7	182	22
7	166,6	1 244	7	92,0	664	3	49,0	137	23

1) Einschl. Adventswirsing

noch:

Ernteschätzung von

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr	Dicke Bohnen (Sau- oder Puffbohnen)			Winterzwiebeln		
			Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag	
				je	im		je	im
				Hektar	ganzen		Hektar	ganzen
ha	dz.		ha	dz.				
16	17	18	19	20	21			
1	Schleswig-Holstein	1954	42	106,7	4 481	4	243,3	975
2	" "	1953	63	127,0	7 958	8	157,0	1 259
3	Hamburg	1954	30	124,1	3 722	1	134,4	134
4	"	1953	32	130,3	4 170	1	140,0	140
5	Niedersachsen	1954	219	105,0	22 975	1 ²⁾	180,0	162
6	"	1953	331	101,2	33 530	16	152,9	2 492
7	Bremen	1954	8	128,8	1 030	-	-	-
8	"	1953	7	120,0	840	0	150,0	0
9	Nordrhein-Westfalen	1954	992	123,4	122 381	20	136,1	2 722
10	" "	1953	990	113,6	112 510	25	151,0	3 775
11	Hessen	1954	7	87,1	610	19	161,3	3 064
12	"	1953	7	93,7	656	16	124,4	1 990
13	Rheinland-Pfalz	1954	22	99,9	2 243	163	149,4	24 319
14	" "	1953	40	112,1	4 431	173	135,0	23 413
15	Baden-Württemberg	1954	7	59,9	443	29	126,2	3 597
16	" "	1953	5	57,0	268	25	151,1	3 793
17	Bayern	1954	2	55,5	111	25	113,5	2 838
18	"	1953	4	69,8	279	17	127,2	2 162
19	<u>Bundesgebiet</u>	1954	1 329	118,9	157 996	262	144,3	37 809
20	"	1953	1 479	111,3	164 642	281	138,9	39 024
21	" 5jähr. ø	1949/53		106,8			146,4	
22	West-Berlin	1954	0			0		
23	" "	1953	0	146,7	47	0	150,0	54

2) Nach Auswinterung verbliebene Erntefläche

Gemüse im Juli 1954

Fr ü h e M ö h r e n			E r d b e e r e n			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag		
	je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen	
ha	dz		ha	dz		
22	23	24	25	26	27	
103	164,0	16 892	209	58,1	12 143	1
113	208,0	23 606	176	61,3	10 818	2
59	208,0	12 270	254	44,5	11 297	3
62	211,7	13 125	234	49,6	11 606	4
243	201,0	48 837	269 ²⁾	42,6	11 445	5
281	210,3	59 087	292	46,8	13 668	6
10	219,9	2 199	6	40,8	245	7
9	236,8	2 131	5	46,8	234	8
326	204,9	66 792	481	42,8	20 596	9
320	188,2	60 235	460	62,4	28 717	10
73	188,8	13 783	348	38,7	13 459	11
83	138,4	11 491	322	44,4	14 285	12
108	180,0	19 467	243	43,7	10 627	13
151	179,7	27 151	196	48,7	9 540	14
133	172,0	22 874	382	60,7	23 187	15
133	186,4	24 826	287	54,3	15 585	16
177	158,7	28 097	138	37,3	5 153	17
169	165,1	27 903	156	40,7	6 350	18
1 232	187,7	231 211	2 330	46,4	108 152	19
1 321	188,9	249 555	2 128	52,1	110 803	20
	184,5			50,9		21
38	182,0	6 909	8	50,3	402	22
29	144,8	4 203	7	24,3	165	23