

# STATISTISCHE BERICHTE

27. FEB. 2009 *la*




Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

Arb.Nr. III/5/75

Erschienen am 20. Juli 1956

ZG 43



Wachstumstand und Ernteschätzung von Gemüse  
J u n i 1956

(5604)

Nachdruck - auch auszugsweise -  
nur mit Quellenangabe gestattet

Die allgemeinen Witterungsbedingungen haben sich in der Berichtszeit (vom 20. Mai bis 20. Juni) leicht gebessert. Doch wurde die Witterung von der Mehrzahl der Berichterstatter (74 vH) als zu kalt angesehen. Die Niederschläge wurden von der Hälfte der Berichterstatter als zu hoch beurteilt. Für die einzelnen Teile des Bundesgebietes zeigt die Beurteilung des Temperaturverlaufes eine sehr viel grössere Einheitlichkeit als die der Niederschläge.

Beurteilung der Witterung  
in vH der Berichte mit einschlägigen Angaben im Juni 1956

L a n d	Niederschläge			Temperaturverlauf		
	zu gering	ausreichend	zu hoch	zu warm	normal	zu kalt
	vH			vH		
Schleswig-Holstein	47	53	-	2	42	56
Hamburg	26	67	7	-	22	78
Niedersachsen	10	29	61	1	24	75
Bremen	.	.	.	.	.	.
Nordrhein-Westfalen	4	37	59	-	14	86
Hessen	7	52	41	1	35	64
Rheinland-Pfalz	-	34	66	-	16	84
Baden-Württemberg	1	52	47	-	21	79
Bayern	1	63	36	-	40	60
<u>Bundesgebiet</u> 1956	7	42	51	1	25	74
" 1955	1	69	30	0	22	78

Von den endgültigen Schätzungen des Hektarertrages hat nur der Spargel mit 30,7 dz/ha gegenüber dem Jahr 1955 mit 23,8 dz/ha einen grösseren Ertrag aufzuweisen. Bei Rhabarber und Frühlkohlrabi blieb der Hektarertrag mit 246,8 bzw. 153,0 dz leicht hinter dem des Vorjahres zurück. Frühjahrskopfsalat hat mit 150,2 dz/ha einen etwas stärkeren Rückgang gegenüber dem Vorjahr gebracht.

Für die bisher endgültig geschätzten Gemüsearten zeigt die folgende Zusammenstellung, dass sich die ungünstige Beurteilung der ersten Entwicklungszeit infolge des verspäteten und kalten Frühjahrs später meist wesentlich verbessert hat. Trotzdem sind bei all' diesen Arten nur mit Ausnahme von Spargel die Hektarerträge geringer als im Vorjahr, in dem das Frühjahr auch ungünstig war.

Gemüseart	Vorschätzung			Schätzung		
	März	April	Mai	Mai 1956	Juni 1956	1955
	in dz je ha					
Winterspinat	x) 60,8	71,3		80,4		102,2
Frühjahrsspinat	x) 70,4	99,0		101,9		102,7
Adventswirsingkohl		114,4		115,4		149,2
Winterkopfsalat		93,3		104,7		117,6
Frühjahrskopfsalat		x) 128,0	141,9		150,2	159,5
Frühlkohlrabi		x) 125,0	142,5		153,0	155,1
Spargel			29,0		30,7	23,8
Rhabarber			240,0		246,8	247,1

x) Ohne Schleswig-Holstein und Bremen.

Für die Gemüsearten, deren Ertrag endgültig geschätzt wurde, ist noch nicht bekannt, wie sich die Anbauabsichten verwirklicht haben. Daher können auch die auf dieser Grundlage errechneten Erntemengen nur als vorläufige Angaben gewertet werden.

Die Bewertungen des Wachstumsstandes vom 20. Juni ergaben, von den Gurken abgesehen, durchweg Noten zwischen mittel und gut. Die Beurteilung ist bei den meisten dieser Arten um 1 bis 2 Zehntelnoten günstiger als 1955. Die beste Bewertung haben mit 2,4 der Sommer- und Herbstkopfsalat und die Steckzwiebeln. Die Gurken werden mit 3,1 am ungünstigsten, aber noch besser als zur gleichen Zeit des Vorjahres, beurteilt.

Von den Meldungen über ein aussergewöhnlich starkes Auftreten von Krankheiten und Schädlingen sind in der folgenden Zusammenstellung nur die berücksichtigt, die für das gesamte Bundesgebiet 5 vH der Meldungen überschreiten. Hiervon erscheinen die Blattläuse und Wühlmäuse am häufigsten und in den einzelnen Teilen des Bundesgebietes mit einer gewissen Gleichmässigkeit, während bei den etwas weniger verbreiteten Kohlflieden, Erdflöhen und Bohnenblattläusen gebietsmässig sich ein unterschiedliches Bild ergibt.

Meldungen über ungewöhnlich starkes Auftreten von Pflanzenkrankheiten und -schädlingen im Juni 1956  
in vH aller eingegangenen Berichte

L a n d	Mehl-	Blatt-	Bohnen-	Erd-	Kohl-	Rüben-	Wühl-	Schnecken
	tau	läuse	blattläuse	flöhe	fliegen	blattwespen	mäuse	
	vH							
Schleswig-Holstein	7	9	1	32	24	12	7	-
Hamburg	-	22	-	33	15	-	22	-
Niedersachsen	4	19	5	12	14	15	16	-
Nordrh.-Westfalen	6	15	11	10	17	15	18	-
Hessen	3	21	10	6	3	3	14	1
Rheinland-Pfalz	8	20	13	6	7	4	23	4
Baden-Württemberg	7	22	17	8	11	0	16	32
Bayern	9	40	24	19	28	1	38	3
Bundesgebiet	5	21	11	11	14	8	18	6

Wachstumstand des

(Begutachtung)

Noten: 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 =

Lfd. Nr.	L a n d	Zeit (Juni)	Mittelfrüher und Spät- blumenkohl	Sommer- und Herbst- kopfsalat	Späte Möhren
			1	2	3
1	Schleswig-Holstein	1956	2,6	2,5	2,7
2	" "	1955	3,0	2,6	2,8
3	Hamburg	1956	2,9	2,8	3,0
4	" "	1955	3,0	3,0	2,9
5	Niedersachsen	1956	2,7	2,5	2,7
6	" "	1955	2,9	2,7	2,9
7	Bremen	1956	.	.	.
8	" "	1955	.	.	.
9	Nordrhein-Westfalen	1956	2,3	2,4	2,4
10	" "	1955	2,5	2,3	2,5
11	Hessen	1956	2,4	2,4	2,5
12	" "	1955	2,6	2,3	2,5
13	Rheinland-Pfalz	1956	2,6	2,4	2,5
14	" "	1955	2,5	2,5	2,7
15	Baden-Württemberg	1956	2,4	2,3	2,4
16	" "	1955	2,4	2,3	2,5
17	Bayern	1956	2,6	2,4	2,7
18	" "	1955	2,9	2,6	2,8
19	<u>Bundesgebiet</u>	1956	2,5	2,4	2,6
20	" "	1955	2,7	2,4	2,7
21	Berlin (West)	1956	2,8	2,8	2,8
22	" "	1955	2,8	2,8	2,8

Gemüse im Juni 1956

nach Noten)

mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering

Zwiebeln (Frühjahrs- aussaat)	Steckzwiebeln	Busch- bohnen	Stangenbohnen	Gurken	Tomaten	Lfd. Nr.
4	5	6	7	8	9	
2,9	2,3	2,3	2,6	2,7	2,5	1
3,0	2,8	.	3,3	4,1	3,3	2
2,8	2,8	2,9	3,0	3,0	3,0	3
2,8	3,1	.	3,2	3,2	3,1	4
2,8	2,6	2,9	3,0	3,2	3,0	5
2,9	2,7	.	3,5	3,8	3,4	6
.	.	.	.	.	.	7
.	.	.	.	.	.	8
2,4	2,5	2,9	3,0	3,4	2,9	9
2,6	2,5	.	3,0	3,1	2,6	10
2,7	2,5	2,6	2,6	3,1	2,6	11
2,6	2,3	.	3,1	3,2	2,9	12
2,8	2,4	2,7	2,5	3,0	2,7	13
2,8	2,6	.	3,0	3,5	2,7	14
2,5	2,3	2,6	2,6	2,8	2,6	15
2,5	2,2	.	2,9	3,3	2,9	16
2,6	2,4	2,9	2,9	3,2	3,0	17
2,7	2,5	.	3,3	3,8	3,4	18
2,6	2,4	2,7	2,9	3,1	2,8	19
2,7	2,5	.	3,1	3,5	2,9	20
2,3	2,7	3,0	3,4	3,9	3,1	21
2,8	2,4	.	3,1	3,8	3,1	22

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr <sup>1)</sup>	Frühkohlrabi			Frühjahrskopfsalat		
			Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag	
				je	im		je	im
				Hektar	ganzen		Hektar	ganzen
ha	dz		ha	dz				
			1	2	3	4	5	6
1	Schleswig-Holstein	1956	21	147,0	3 087	23	112,4	2 585
2	" "	1955	22	131,0	2 882	21	157,6	3 310
3	Hamburg	1956	60	182,1	10 926	105	151,7	15 928
4	" "	1955	57	174,3	9 937	98	152,8	14 977
5	Niedersachsen	1956	117	139,2	16 242	108	130,5	14 147
6	" "	1955	84	125,3	10 466	81	128,3	10 329
7	Bremen	1956	6	184,8	1 109	7	219,4	1 536
8	" "	1955	4	140,0	560	7	143,9	1 007
9	Nordrhein-Westf.	1956	361	165,9	59 884	473	157,8	74 646
10	" "	1955	300	167,7	50 297	499	167,7	83 686
11	Hessen	1956	44	168,2	7 402	99	155,0	15 342
12	" "	1955	35	182,3	6 382	90	144,6	13 017
13	Rheinland-Pfalz	1956	34	100,4	3 412	80	97,8	7 825
14	" "	1955	29	131,5	3 813	76	108,9	8 274
15	Baden-Württembg.	1956	79	189,8	14 937	234	193,5	45 347
16	" "	1955	69	184,3	12 772	184	193,0	35 592
17	Bayern	1956	164	113,0	18 525	273	121,4	33 155
18	" "	1955	152	128,7	19 562	258	152,8	39 417
19	Bundesgebiet	1956	886	153,0	135 524	1 402	150,2	210 511
20	" "	1955	752	155,1	116 671	1 314	159,5	209 609
21	Berlin (West)	1956	46	163,8	7 476	29	151,6	4 447
22	" "	1955	51	179,9	9 212	28	159,6	4 436

1) 1956 Flächen lt. Anbauabsicht (Febr. 1956), beim Spargel voraussichtl. Fläche  
lt. Erhebung vom Juli 1955 - 1955 Endgültige Ernteschätzung -

Gemüse im Juni 1956

Spargel			Rhabarber			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag		
	je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen	
ha	dz		ha	dz		
7	8	9	10	11	12	
90 <sup>2)</sup>	22,4	2 016	50 <sup>2)</sup>	228,8	11 440	1
90	11,9	1 071	50	238,2	11 910	2
3	18,8	56	118	246,4	29 078	3
3	22,5	68	118	242,3	28 591	4
1 032 <sup>3)</sup>	30,7	31 671	62 <sup>2)</sup>	233,5	14 384	5
953	19,4	18 535	62	235,1	14 482	6
0	.	.	5	270,9	1 355	7
0	.	.	5	350,8	1 754	8
180	31,1	5 591	108 <sup>3)</sup>	268,6	29 013	9
202	30,1	6 086	121	267,8	32 403	10
1 035 <sup>3)</sup>	30,3	31 312	26 <sup>3)</sup>	240,4	6 251	11
1 005	23,1	23 265	23	233,3	5 366	12
353	33,9	11 958	15	159,5	2 393	13
318	29,3	9 306	15	196,1	2 941	14
722	30,8	22 254	83	274,4	22 664	15
667	27,1	18 062	83	270,1	22 312	16
95	29,3	2 786	50	220,4	11 022	17
129	30,0	3 869	50	209,3	10 465	18
3 510	30,7	107 644	517	246,8	127 600	19
3 367	23,8	80 262	527	247,1	130 224	20
1	26,2	17	9	229,0	2 082	21
2	20,8	36	9	221,2	2 011	22

2) Endgültige Fläche 1955 - 3) Fläche lt. Erhebung vom Febr. 1956.