

STATISTISCHE BERICHTE

Unverkäufliches
Freiexemplar



Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

Arb.Nr. III/5/29

Erschienen am 26. Mai 1953

Wachstumstand des Gemüses April 1953

und

Erntevorschätzung von Winterkonfosalat und Winterspinat

Der Wachstumstand des Frühgemüses auf dem Feiland wird im Bundesgebiet nach den ersten Berichten dieses Jahres von Mitte April durchweg besser als mittel beurteilt. Beinahe gut ist der Stand von Rhabarber mit der Note 2,1. Auch Frühkohlrabi und Frühjahrsspinat zeigen mit 2,5 eine verhältnismässig günstige Beurteilung, desgleichen alle Frühkohllarten (Frühweiss-, Frührot-, Frühwirsing- und Frühblumenkohl), sowie Frühmöhren mit der Note 2,7. Winterzwiebeln der Herbstaussaat 1952 erreichen dagegen nur eine mittlere Beurteilung, da ihre Entwicklung durch kühle Nächte vielfach beeinträchtigt wurde. Der Wachstumstand aller Frühgemüsekulturen - mit Ausnahme der Winterzwiebeln - wird zum Zeitpunkt der Meldung fast ebenso günstig wie im gleichen Monat des Vorjahres beurteilt. Die Witterungsverhältnisse in den einzelnen Bundesländern waren infolge ausreichender Winterfeuchtigkeit und normalen Temperaturverlaufes bei teils geringen teils ausreichenden Niederschlägen für die Aussaaten und Auspflanzungen von Frühgemüse im allgemeinen günstig, so dass die Wachstumstandsbeurteilungen in den norddeutschen Anbaugebieten keine wesentlichen Abweichungen gegenüber denen der west- und süddeutschen Anbaugebiete aufweisen.

Den Erntevorschätzungen für Winterkopfsalat und Winterspinat liegen die im Februar 1953 ermittelten endgültigen Anbauflächen zugrunde. Die Vergleichszahlen für 1952 beziehen sich entsprechend auf die Herbstanbauflächen 1951 nach der Erhebung vom Februar 1952.

Die Erntevorschätzung für Winterkopfsalat und Winterspinat lässt im Bundesgebiet geringere Durchschnittserträge als im Jahre 1952 erwarten. Für Winterkopfsalat wird der Hektarertrag im Bundesgebiet durchschnittlich auf 126,4 dz, für Winterspinat auf 90,8 dz geschätzt, was einen Ertragsrückgang von 13 vH bzw. 18 vH gegenüber den entsprechenden Hektarerträgen des Jahres 1952 bedeutet. Da auch die Anbauflächen des Jahres 1953 bei Winterkopfsalat erheblich, bei Winterspinat um ein geringes unter denen von 1952 liegen, erreichen die für 1953 errechneten Erntemengen der beiden Gemüsearten bei weitem nicht die Vorjahrshöhe. Für Winterkopfsalat ergibt sich nach den Vorschätzungen eine Ernte von 4 159 t gegen 6 475 t, für Winterspinat von 19 451 t gegen 25 714 t.

An Pflanzenschädlingen melden fast alle Länder des Bundesgebietes das Auftreten von Ackerschnecken, Kohltriebrüsslern und Drahtwürmern; allgemein wird über das starke Auftreten von Feldmäusen berichtet.

Erntevorschätzung April 1953

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr	Winterkopfsalat			Winterspinat		
			Fläche	E r t r a g		Fläche	E r t r a g	
				vom	im		vom	im
			ha	Hektar	ganzen	ha	Hektar	ganzen
1	2	3	4	5	6			
1	Schleswig-Holstein	1953	1	123,0	123	2	101,0	202
2	" "	1952	-	-	-	2	81,0	162
3	Hamburg	1953	6	130,1	781	7	118,6	830
4	" "	1952	6	129,2	775	3	118,0	354
5	Niedersachsen	1953	6	94,8	578	123	79,3	9 773
6	" "	1952	5	113,1	611	102	82,0	8 309
7	Bremen	1953	0	115,0	0	1	100,0	100
8	" "	1952	0	120,0	0	1	98,0	98
9	Nordrhein-Westfalen	1953	42	116,2	4 882	886	99,4	88 032
10	" "	1952	85	130,3	11 079	1 006	139,6	140 390
11	Hessen	1953	13	105,5	1 371	54	67,9	3 664
12	" "	1952	15	108,9	1 633	66	76,0	5 018
13	Rheinland-Pfalz	1953	118	100,9	11 909	478	77,3	36 983
14	" "	1952	156	119,8	18 736	547	84,5	46 236
15	Baden-Württemberg	1953	106	174,4	18 589	276	110,1	30 461
16	" "	1952	140	200,7	28 100	185	127,2	23 541
17	Bayern	1953	37	91,9	3 355	316	77,4	24 464
18	" "	1952	40	95,7	3 815	359	91,9	33 035
19	<u>Bundesgebiet</u>	1953	329	126,4	41 588	2 143	90,8	194 510
20	" "	1952	447	144,9	64 749	2 271	115,3	257 143
21	West-Berlin	1953	0	110,0	46	20	49,8	991
22	" "	1952	1	160,0	106	15	70,0	1 027

Wachstumstand des Gemüses im April 1953

(Begutachtung nach Noten)

Noten: 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr (April)	Früh- weißkohl	Früh- rotkohl	Früh- wirsingkohl	Advents- kohl
			1	2	3	4
1	Schleswig-Holstein	1953	2,6	2,5	2,5	-
2	" "	1952	2,8	2,9	2,7	-
3	Hamburg	1953	3,2	3,1	2,9	-
4	"	1952	2,9	3,1	3,2	-
5	Niedersachsen	1953	2,6	2,8	2,8	-
6	"	1952	2,8	2,9	3,0	-
7	Bremen	1953	2,9	3,0	2,9	-
8	"	1952	2,9	3,0	3,0	-
9	Nordrhein-Westfalen	1953	2,7	2,7	2,6	2,8
10	" "	1952	2,6	2,6	2,3	-
11	Hessen	1953	2,6	2,6	2,5	-
12	"	1952	2,6	2,6	2,6	-
13	Rheinland-Pfalz	1953	2,6	2,8	2,9	2,8
14	" "	1952	2,7	2,7	2,5	-
15	Baden-Württemberg	1953	2,5	2,6	2,5	-
16	" "	1952	2,4	2,5	2,5	-
17	Bayern	1953	2,6	2,6	2,5	-
18	"	1952	2,5	2,6	2,6	-
19	Landesgebiet	1953	2,7	2,7	2,7	2,8
20	"	1952	2,7	2,7	2,6	-
21	West-Berlin	1953	3,0	3,1	3,0	-
22	" "	1952	2,8	2,5	2,6	-

noch:

Wachstumstand des Gemüses im April 1953

(Begutachtung nach Noten)

Noten: 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering

Früh- Blumenkohl	Früh- kohlrabi	Frühjahrs- spinat	Winterzwiebeln (Herbstsaat)	Frühe Möhren. (Karotten)	Rhabarber	Lfd. Nr.
5	6	7	8	9	10	
2,7	2,5	2,4	3,0	2,5	2,1	1
2,8	2,6	2,5	2,8	2,7	2,3	2
3,0	3,2	2,9	3,0	2,9	2,0	3
2,9	2,8	2,6	3,0	2,7	2,3	4
2,8	2,7	2,4	3,0	2,7	2,3	5
3,0	2,8	2,6	2,8	2,7	2,4	6
3,0	2,9	2,8	2,0	2,7	2,5	7
2,8	2,8	2,5	3,0	3,0	2,6	8
2,7	2,5	2,3	2,6	2,7	2,2	9
2,6	2,3	2,3	2,7	2,4	2,2	10
2,6	2,6	2,5	2,8	2,8	2,4	11
2,7	2,5	2,5	2,7	2,9	2,3	12
2,6	2,5	2,5	3,3	2,6	2,3	13
2,6	2,6	2,6	2,5	2,6	2,3	14
2,5	2,4	2,6	2,9	2,7	2,4	15
2,5	2,4	2,6	2,7	2,7	2,3	16
2,7	2,4	2,5	2,8	2,6	2,1	17
2,7	2,4	2,4	2,7	2,6	2,1	18
2,7	2,5	2,5	3,0	2,7	2,1	19
2,7	2,4	2,4	2,6	2,6	2,3	20
3,1	2,9	3,2	2,8	3,0	2,5	21
2,6	2,5	2,8	3,0	2,7	2,6	22