

Dr. Reepschläger

STATISTISCHE BERICHTE



Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

Arb.-Nr. VIII/2/166

Erschienen am 1. Februar 1952.

Die Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten
im Bundesgebiet und West-Berlin
im 4. Vierteljahr 1951 (30.9. - 29.12.)

Wie in früheren Berichten wird darauf hingewiesen, dass die sogenannten "sanitätspolizeilichen" Meldungen die Grundlage für die vorliegende Zusammenstellung bilden. Dieses Material weist aber in Bezug auf vollständige Erfassung und Meldung Mängel auf. Insbesondere muss immer wieder hervorgehoben werden, dass kurzdauernde und leichtverlaufende Infektionskrankheiten sicherlich sehr viel schlechter erfasst werden können als langdauernde und lebensbedrohende wie z.B. Kinderlähmung.

Bezüglich grundsätzlicher Fragen dieser Vierteljahreszusammenstellung verweisen wir auf die vorausgegangenen Statistischen Berichte.

Außer den in der Tabelle aufgeführten Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten wurden in der Berichtszeit gemeldet:

91 Neuerkrankungen	an Weil'scher Krankheit
19	" Trachom
4	" Enteritis
29	" Feldfieber
7	" Mikrosporrie und
2 263	" Parotitis.

Weiter wurden 23 Bißverletzungen durch tollwutverdächtige Tiere gemeldet, davon 10 von Schleswig-Holstein, 13 von Bayern. In Niedersachsen wurden 28 Tollwutverdachtsfälle, in Hamburg 3 Tollwuterkrankungen erfasst.

Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten
im Bundesgebiet

im 4. Vierteljahr 1951 (30. Sept.-29. Dez. 1951)
vorläufige Zahlen

a) Grundzahlen

- keine Neuerkrankung, . keine Meldung

Land	Diphtherie	Scharlach	Keuchhusten	Marsern	Übertragbare			Unterleibstypus	Paratyphus	Ruhr
					Genickstarre	Gehirnentzdg.	Kinderlähmung			
Schleswig-Holstein	319	986	1 424	78	5	-	27	140	112	14
Hamburg	155	817	853	.	7	3	22	30	35	14
Niedersachsen	765	3 079	1 981	.	28	5	23	149	160	17
Nordrhein-Westfalen	2 917	5 289	2 596	106	42	11	76	331	291	53
Bremen	39	243	277	.	2	-	2	5	13	22
Hessen	475	2 159	1 342	2 252	26	4	21	75	34	54
Württemberg-Baden	243	1 377	993	371	10	9	22	56	22	12
Bayern	1 140	3 796	2 056	3 949	54	11	293	147	55	58
Rheinland-Pfalz	500	855	593	202	21	4	22	69	38	3
Baden	92	457	260	239	7	2	9	15	8	12
Württemberg-Hohenzollern	71	323	308	553	1	-	12	8	6	6
Bundesgebiet ¹⁾ 4.Vj. 1951	6 716	19 381	12 683	7 750	203	49	529	1 025	774	265
dagegen 3.Vj. 1951	6 829	17 459	13 542	7 224	217	42	592	1 704	1 704	347
2.Vj. 1951	6 275	12 905	12 180	21 051	188	62	79	803	1 109	220
1.Vj. 1951	7 282	15 314	11 153	20 415	317	64	89	581	426	186
4.Vj. 1950	9 540	30 309	15 632	12 962	184	53	539	983	853	253

Land	Bakt. Lebensmittelvergiftung	Geschlechtskrankheiten ausser Gonorrhoe u. Syphilis	Grippe	Lungenentzündung	Kindbettfieber	Fieberhafte Fehlgeburt	Malaria ²⁾	Bang'sche Krankheit	Gelbsucht	Krätze
Schleswig-Holstein	3	2	.	21	4	10	1	3	102	83
Hamburg	19	8	.	37	1	-	-	-	244	20
Niedersachsen	13	2	129	142	6	17	-	7	75	98
Nordrhein-Westfalen	45	.	.	242	3	57	1	9	341	69
Bremen	.	1	.	.	1	1	-	-	.	.
Hessen	11	.	533	.	-	2	-	2	431	56
Württemberg-Baden	25	.	15	.	1	1	1	1	27	2
Bayern	72	6	148	.	10	12	2	15	204	190
Rheinland-Pfalz	4	2	.	.	4	8	2	2	31	15
Baden	6	-	.	.	-	-	-	1	9	.
Württemberg-Hohenzollern	17	.	57	.	2	.	1	4	.	1
Bundesgebiet ¹⁾ 4.Vj. 1951	215	21	882	442	32	108	8	44	1 465	534
dagegen 3.Vj. 1951	1 319	13	300	340	32	150	10	71	921	470
2.Vj. 1951	616	30	1 329	760	40	145	7	94	969	629
1.Vj. 1951	250	18	31 121	1 387	47	173	5	85	1 232	1 396
4.Vj. 1950	188	23	1 748	732	47	228	14	37	1 683	1 514

1) Ohne die Länder, von denen keine Meldungen vorliegen. 2) Außerdem 3 Rückfälle.

Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten
im Bundesgebiet

im 4. Vierteljahr 1951 (30. Sept. - 29. Dez. 1951)
vorläufige Zahlen

b) Berechnet auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr
(Bevölkerungszahl vom 1.11.1951)

- Keine Neuerkrankung, . keine Meldung

Land	Diphtherie	Scharlach	Keuchhusten	Masern	übertragbare			Unterleibstypus	Paratyphus	Ruhr
					Genickstarre	Gehirnentzdg.	Kinderlähmung			
Schleswig-Holstein	5,06	15,65	22,60	1,24	0,08	-	0,43	2,22	1,78	0,22
Hamburg	3,72	19,60	20,47	.	0,17	0,07	0,53	0,72	0,84	0,34
Niedersachsen	4,52	18,18	11,70	.	0,17	0,03	0,14	0,88	0,95	0,10
Nordrhein-Westfalen	8,54	15,48	7,60	0,31	0,12	0,03	0,22	0,97	0,85	0,15
Bremen	2,68	16,65	18,98	.	0,14	..	0,14	0,35	0,90	1,50
Hessen	4,29	19,52	12,13	20,36	0,23	0,04	0,19	0,68	0,31	0,49
Württemberg-Baden	2,42	13,72	9,89	3,70	0,10	0,09	0,22	0,56	0,22	0,12
Bayern	4,95	16,49	8,93	17,16	0,23	0,05	1,27	0,64	0,24	0,25
Rheinland-Pfalz	6,39	10,92	7,58	2,58	0,27	0,05	0,28	0,88	0,49	0,04
Baden	2,63	13,07	7,43	6,84	0,20	0,06	0,26	0,43	0,23	0,35
Württemberg-Hohenzollern	2,22	10,08	9,62	17,27	0,03	-	0,38	0,25	0,19	0,19
Bundesgebiet ¹⁾ 4.Vj. 1951	5,52	15,93	10,42	7,82	0,17	0,04	0,43	0,84	0,64	0,22
dagegen 3.Vj. 1951	5,62	14,38	11,15	5,95	0,18	0,03	0,49	1,40	2,31	0,29
2.Vj. 1951	5,24	10,79	10,18	21,63	0,16	0,05	0,07	0,67	0,93	0,18
1.Vj. 1951	6,17	12,97	9,44	21,27	0,27	0,05	0,06	0,49	0,36	0,16
4.Vj. 1950	7,93	25,20	13,00	13,27	0,15	0,04	0,45	0,82	0,71	0,21

Land	Bakt. Lebensmittelvergiftung	Geschlechtskrankheiten ausser Gonorrhoe u. Syphilis	Grippe	Lungenentzündung	Kindbettfieber ²⁾	Fieberhafte Fehlgeburt ²⁾	Malaria	Bang'sche Krankheit	Gelbsucht	Krätze
Schleswig-Holstein	0,05	0,03	-	0,33	0,27	0,68	0,02	0,05	1,62	1,32
Hamburg	0,45	0,19	.	0,89	0,10	-	-	-	5,85	0,48
Niedersachsen	0,08	0,01	0,76	0,84	0,15	0,43	-	0,04	0,45	0,58
Nordrhein-Westfalen	0,13	.	-	0,71	0,04	0,71	0,00	0,03	1,00	0,20
Bremen	-	0,07	.	.	0,29	0,29	-	-	.	.
Hessen	0,10	.	4,82	.	-	0,08	-	0,02	3,90	0,51
Württemberg-Baden	0,25	.	0,15	.	0,04	0,04	0,01	0,01	0,27	0,02
Bayern	0,31	0,03	0,64	.	0,19	0,22	0,01	0,07	0,89	0,83
Rheinland-Pfalz	0,05	0,03	-	.	0,22	0,44	0,03	0,03	0,40	0,19
Baden	0,17	-	.	.	-	-	-	0,03	0,26	.
Württemberg-Hohenzollern	0,53	.	1,78	.	0,27	-	0,03	0,13	.	0,03
Bundesgebiet ¹⁾ 4.Vj. 1951	0,18	0,03	0,78	0,72	0,11	0,38	0,01	0,04	1,25	0,46
dagegen 3.Vj. 1951	1,09	0,02	0,25	0,29	0,11	0,53	0,01	0,06	0,76	0,39
2.Vj. 1951	0,51	0,05	1,20	1,26	0,14	0,52	0,01	0,08	0,84	0,55
1.Vj. 1951	0,21	0,02	28,46	2,24	0,17	0,61	0,00	0,07	1,08	1,23
4.Vj. 1950	0,16	0,02	1,57	1,20	0,16	0,79	0,01	0,03	1,45	1,31

1) Soweit für bestimmte Krankheiten von einzelnen Ländern keine Meldungen vorliegen, ist bei der Bevölkerung, auf die die Erkrankungszahlen bezogen sind, die Einwohnerzahl der betreffenden Länder abgesetzt.

2) Bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 45 Jahren.

Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten
in den Westsektoren von Berlin

im 4. Vierteljahr 1951

vorläufige Zahlen

- Keine Neuerkrankung, . keine Meldung

Berichtszeit	Diphtherie	Scharlach	Keuchhusten	Marsern	Übertragbare			Unterleibstypus	Paratyphus	Ruhr
					Genickstarre	Gehirnentzdg.	Kinderlähmung			

Grundzahlen

1. Vierteljahr 1951	263	2 205	.	.	13	-	5	22	9	121
2. Vierteljahr 1951	161	1 237	.	.	7	1	8	25	29	92
3. Vierteljahr 1951	243	942	.	.	5	-	50	68	79	137
4. Vierteljahr 1951	252	1 722	.	.	5	-	54	30	25	131
4. Vierteljahr 1950	402	4 044	.	.	6	-	7	30	25	81

Verhältniszahlen
auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr

1. Vierteljahr 1951	4,95	41,50	.	.	0,25	-	0,09	0,41	0,17	2,28
2. Vierteljahr 1951	2,99	23,00	.	.	0,13	0,02	0,15	0,46	0,54	1,71
3. Vierteljahr 1951	4,45	17,27	.	.	0,09	-	0,91	1,25	1,45	2,51
4. Vierteljahr 1951	4,61	31,46	.	.	0,09	-	0,99	0,55	0,46	2,40
4. Vierteljahr 1950	7,49	75,33	.	.	0,11	-	0,13	0,56	0,46	1,51

Berichtszeit	Bakt. Lebensmittelvergiftung	Geschlechtskrankheiten ausser Gonorrhoe u. Syphilis	Grippe	Lungenentzdg.	Kindbettfieber ¹⁾	Fieberhafte Fehlgeburt	Malaria	Bang'sche Krankheit	Gelbsucht	Krätze
--------------	------------------------------	---	--------	---------------	------------------------------	------------------------	---------	---------------------	-----------	--------

Grundzahlen

1. Vierteljahr 1951	13	-	.	.	1	.	-	.	.	.
2. Vierteljahr 1951	15	1	.	.	2	.	4	.	.	.
3. Vierteljahr 1951	31	-	.	.	3	.	2	1	.	.
4. Vierteljahr 1951	16	1	.	.	2	.	1	-	.	.
4. Vierteljahr 1950	21	4	.	.	1	.	2	-	.	.

Verhältniszahlen
auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr

1. Vierteljahr 1951	0,25	-	.	.	0,02	.	-	.	.	.
2. Vierteljahr 1951	0,28	0,02	.	.	0,16	.	0,07	.	.	.
3. Vierteljahr 1951	0,57	-	.	.	0,24	.	0,04	0,02	.	.
4. Vierteljahr 1951	0,29	0,02	.	.	0,16	.	0,02	-	.	.
4. Vierteljahr 1950	0,35	0,08	.	.	0,18	.	0,04	-	.	.

¹⁾ Bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 45 Jahren.