

STATISTISCHE BERICHTE

Unverkäufliches
Freiexemplar!



Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

Arb.-Nr. VIII/3/19

Erschienen am 20. März 1953

Erkrankungen an aktiver Tuberkulose
im Bundesgebiet und West-Berlin
im 4. Vierteljahr 1952

Seit 1951 ist es möglich, Zusammenstellungen über den Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten für das ganze Bundesgebiet zu geben.

Die Zahlen der Neuzugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten können jedoch nicht zu einem vollständigen Bundesergebnis zusammengestellt werden, da Württemberg-Hohenzollern sich mit seiner Meldeform über die Neuzugänge an aktiver Tuberkulose bisher nicht den übrigen Ländern angeglichen hat.

Bezüglich grundsätzlicher Fragen wird auf die vorausgegangenen Statistischen Berichte verwiesen. Es sei weiterhin bemerkt, daß es sich bei den mitgeteilten Zahlen, solange die Untersuchungen auf freiwilliger Basis erfolgen, immer nur um die erfaßten Erkrankungen handelt und damit um die untersten Werte. Bei der Beurteilung der Tuberkulose-Morbidität muß auch beachtet werden, daß durch die Statistik der Neuerkrankungen nur die Neuzugänge (erstmalig Erkrankte) erfaßt werden, nicht aber die Besserungen oder Verschlechterungen (Verschiebungen zwischen den Gruppen).

Um das Bild über die Tuberkulose im Bundesgebiet und West-Berlin abzurunden, werden in der Anlage auch die Tuberkulosesterbeziffern der vier Vierteljahre 1952 und zum Vergleich die entsprechenden Vierteljahre 1951 auf Grund der standesamtlichen Meldungen beigelegt.

Neuerkrankungen ¹⁾ an aktiver Tuberkulose
im Bundesgebiet und West-Berlin
im 4. Vierteljahr 1952
 (vorläufiges Ergebnis)

| Land | Tuberkulose der Atmungsorgane | | | | | Tuberkulose anderer Organe | Tuberkulose aller Formen insgesamt |
|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------|--------------------------------------|-----------|----------------------------|------------------------------------|
| | ansteckend (offen) | | | nicht-ansteckend (aktiv geschlossen) | insgesamt | | |
| | mit Bazillennachweis | ohne Bazillennachweis | insgesamt | | | | |
| Grundzahlen | | | | | | | |
| Schleswig-Holstein | 261 | 140 | 401 | 1 354 | 1 755 | 232 | 1 987 |
| Hamburg | 203 | 110 | 313 | 1 110 | 1 423 | 111 | 1 534 |
| Niedersachsen | 726 | 314 | 1 040 | 2 525 | 3 565 | 473 | 4 038 |
| Bremen | 44 | 18 | 62 | 230 | 292 | 73 | 365 |
| Nordrhein-Westfalen | 1 618 | 468 | 2 086 | 3 779 | 5 865 | 1 012 | 6 877 |
| Hessen | 361 | 134 | 495 | 1 042 | 1 537 | 303 | 1 840 |
| Rheinland-Pfalz ²⁾ | 290 | 154 | 444 | 624 | 1 068 | 275 | 1 343 |
| Baden-Württemberg ²⁾ | 446 | 126 | 572 | 1 538 | 2 110 | 358 | 2 468 |
| Bayern | 890 | 278 | 1 168 | 2 059 | 3 227 | 524 | 3 751 |
| Bundesgebiet ²⁾ | 4 839 | 1 742 | 6 581 | 14 261 | 20 842 | 3 361 | 24 203 |
| West-Berlin | 405 | 264 | 669 | 1 009 | 1 678 | 137 | 1 815 |

Verhältniszahlen
auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr

| | | | | | | | |
|---------------------------------|------|------|-------|-------|-------|------|-------|
| Schleswig-Holstein | 4,26 | 2,29 | 6,55 | 22,10 | 28,65 | 3,79 | 32,43 |
| Hamburg | 4,81 | 2,61 | 7,40 | 26,27 | 33,67 | 2,63 | 36,29 |
| Niedersachsen | 4,34 | 1,88 | 6,21 | 15,09 | 21,30 | 2,83 | 24,13 |
| Bremen | 2,96 | 1,22 | 4,18 | 15,47 | 19,64 | 4,90 | 24,54 |
| Nordrhein-Westfalen | 4,65 | 1,35 | 6,00 | 10,87 | 16,87 | 2,91 | 19,78 |
| Hessen | 3,24 | 1,20 | 4,45 | 9,36 | 13,81 | 2,72 | 16,54 |
| Rheinland-Pfalz ²⁾ | 3,65 | 1,94 | 5,58 | 7,85 | 13,44 | 3,46 | 16,89 |
| Baden-Württemberg ²⁾ | 3,26 | 0,92 | 4,18 | 11,23 | 15,41 | 2,61 | 18,02 |
| Bayern | 3,86 | 1,21 | 5,07 | 8,93 | 14,00 | 2,27 | 16,27 |
| Bundesgebiet ²⁾ | 4,06 | 1,46 | 5,52 | 11,97 | 17,49 | 2,82 | 20,31 |
| West-Berlin | 7,40 | 4,82 | 12,23 | 18,44 | 30,68 | 2,50 | 33,17 |

¹⁾ Nur Neuzugänge, keine Zugänge aus anderen Gruppen. - ²⁾ Ohne Reg.-Bez. Südwürttemberg-Hohenzollern. Hierfür Angaben aus den wöchentlichen Berichten über die Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten : Tbc der Atmungsorgane 182, Tbc anderer Organe 69.

im Bundesgebiet und West-Berlin

am 31.12.1952

(Vorläufiges Ergebnis)

| L a n d | Tuberkulose der Atmungsorgane | | | | Tuberkulose anderer Organe | Tuberkulose aller Formen insgesamt |
|---------|-------------------------------|----------------------------|-----------|--|----------------------------------|---|
| | ansteckend (offen) | | | nichtan- steckend (aktiv ge- schlossen) | | |
| | mit Bazil- lennachweis | ohne Bazil- lennachweis | insgesamt | | | |

Grundzahlen

| | | | | | | | |
|---------------------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|---------|
| Schleswig-Holstein | 5 106 | 3 366 | 8 472 | 21 880 | 30 352 | 4 105 | 34 457 |
| Hamburg | 4 686 | 2 664 | 7 350 | 18 084 | 25 434 | 2 350 | 27 784 |
| Niedersachsen | 16 462 | 5 483 | 21 945 | 35 341 | 57 286 | 8 958 | 66 244 |
| Bremen | 1 509 | 996 | 2 505 | 5 634 | 8 139 | 1 280 | 9 419 |
| Nordrhein-Westfalen | 29 458 | 13 057 | 42 515 | 82 176 | 124 691 | 23 576 | 148 267 |
| Hessen | 8 046 | 1 814 | 9 860 | 17 533 | 27 393 | 5 922 | 33 315 |
| Rheinland-Pfalz | 5 384 | 3 285 | 8 669 | 13 921 | 22 590 | 5 536 | 28 126 |
| Baden-Württemberg | 12 257 | 4 556 | 16 813 | 36 678 | 53 491 | 8 587 | 62 078 |
| Bayern | 16 153 | 6 934 | 23 087 | 33 824 | 56 911 | 7 892 | 64 803 |
| Bundesgebiet | 99 061 | 42 155 | 141 216 | 265 071 | 406 287 | 68 206 | 474 493 |
| West-Berlin | 9 222 | 3 120 | 12 342 | 19 614 | 31 956 | 3 221 | 35 177 |

Verhältniszahlen
auf 10 000 der Bevölkerung

| | | | | | | | |
|---------------------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|--------|
| Schleswig-Holstein | 21,06 | 13,88 | 34,94 | 90,23 | 125,16 | 16,93 | 142,09 |
| Hamburg | 27,77 | 15,79 | 43,56 | 107,18 | 150,75 | 13,93 | 164,66 |
| Niedersachsen | 24,75 | 8,24 | 33,00 | 53,14 | 86,14 | 13,47 | 99,60 |
| Bremen | 25,40 | 16,77 | 42,17 | 94,85 | 137,02 | 21,55 | 158,57 |
| Nordrhein-Westfalen | 21,23 | 9,41 | 30,64 | 59,21 | 89,85 | 16,99 | 106,84 |
| Hessen | 18,16 | 4,09 | 22,25 | 39,57 | 61,82 | 13,36 | 75,18 |
| Rheinland-Pfalz | 16,98 | 10,36 | 27,35 | 43,91 | 71,26 | 17,46 | 88,72 |
| Baden-Württemberg | 18,30 | 6,80 | 25,11 | 54,77 | 79,88 | 12,82 | 92,70 |
| Bayern | 17,60 | 7,56 | 25,16 | 36,86 | 62,03 | 8,60 | 70,63 |
| Bundesgebiet | 20,34 | 8,65 | 28,99 | 54,42 | 83,41 | 14,00 | 97,42 |
| West-Berlin | 42,17 | 14,27 | 56,43 | 89,68 | 146,11 | 14,73 | 160,84 |

Neuerkrankungen und Bestand an aktiver Tuberkulose

im Bundesgebiet und West-Berlin

| Gebiet Berichtszeit | Tuberkulose der Atmungsorgane | | | | | Tuberkulose anderer Organe | Tuberkulose aller Formen insgesamt |
|------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------|---|-----------|----------------------------------|---|
| | ansteckend (offen) | | | nicht an- steckend (aktiv ge- schlossen) | insgesamt | | |
| | mit Bazil- lennachweis | ohne Bazil- lennachweis | insgesamt | | | | |

Neuerkrankungen ¹⁾
auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr

Bundesgebiet ²⁾

| | | | | | | | | |
|------|----------------|------|------|------|-------|-------|------|-------|
| 1951 | 1. Vierteljahr | 5,11 | 2,03 | 7,14 | 14,84 | 21,98 | 3,35 | 25,33 |
| | 2. Vierteljahr | 5,62 | 2,23 | 7,85 | 16,39 | 24,25 | 3,96 | 28,22 |
| | 3. Vierteljahr | 4,76 | 1,88 | 6,64 | 14,78 | 21,43 | 3,52 | 24,95 |
| | 4. Vierteljahr | 4,45 | 1,71 | 6,16 | 12,87 | 19,03 | 3,07 | 22,09 |
| 1952 | 1. Vierteljahr | 5,09 | 1,88 | 6,97 | 14,59 | 21,56 | 3,44 | 25,00 |
| | 2. Vierteljahr | 5,05 | 1,81 | 6,86 | 14,90 | 21,76 | 3,70 | 25,46 |
| | 3. Vierteljahr | 4,66 | 1,64 | 6,30 | 13,76 | 20,06 | 3,03 | 23,09 |
| | 4. Vierteljahr | 4,06 | 1,46 | 5,52 | 11,97 | 17,49 | 2,82 | 20,31 |

West-Berlin

| | | | | | | | | |
|------|----------------|------|------|-------|-------|-------|------|-------|
| 1951 | 1. Vierteljahr | 7,77 | 7,95 | 15,72 | 21,32 | 37,04 | 2,84 | 39,89 |
| | 2. Vierteljahr | 8,78 | 7,92 | 16,70 | 24,70 | 41,39 | 3,09 | 44,48 |
| | 3. Vierteljahr | 6,80 | 7,13 | 13,94 | 20,06 | 33,99 | 2,84 | 36,84 |
| | 4. Vierteljahr | 7,07 | 6,91 | 13,98 | 19,51 | 33,49 | 2,80 | 36,28 |
| 1952 | 1. Vierteljahr | 6,75 | 7,21 | 13,96 | 19,98 | 33,94 | 2,85 | 36,79 |
| | 2. Vierteljahr | 7,32 | 7,71 | 15,03 | 19,08 | 34,11 | 2,97 | 37,08 |
| | 3. Vierteljahr | 7,46 | 5,83 | 13,29 | 17,94 | 31,23 | 2,54 | 33,77 |
| | 4. Vierteljahr | 7,40 | 4,82 | 12,23 | 18,44 | 30,68 | 2,50 | 33,17 |

Bestand ³⁾
auf 10 000 der Bevölkerung

Bundesgebiet

| | | | | | | | | |
|------|----------------|-------|------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 1951 | 1. Vierteljahr | 18,97 | 9,87 | 28,84 | 58,45 | 87,29 | 15,28 | 102,56 |
| | 2. Vierteljahr | 19,41 | 9,93 | 29,35 | 58,22 | 87,57 | 15,42 | 102,99 |
| | 3. Vierteljahr | 19,65 | 9,87 | 29,53 | 57,84 | 87,37 | 15,45 | 102,82 |
| | 4. Vierteljahr | 19,57 | 9,62 | 29,20 | 56,59 | 85,78 | 15,14 | 100,93 |
| 1952 | 1. Vierteljahr | 19,70 | 9,28 | 28,99 | 55,69 | 84,68 | 14,42 | 99,10 |
| | 2. Vierteljahr | 20,03 | 9,15 | 29,18 | 56,07 | 85,25 | 14,56 | 99,82 |
| | 3. Vierteljahr | 20,46 | 9,08 | 29,53 | 56,37 | 85,90 | 14,54 | 100,44 |
| | 4. Vierteljahr | 20,34 | 8,65 | 28,99 | 54,42 | 83,41 | 14,00 | 97,42 |

West-Berlin

| | | | | | | | | |
|------|----------------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|
| 1951 | 1. Vierteljahr | 39,35 | 22,51 | 61,86 | 94,78 | 156,64 | 19,40 | 176,04 |
| | 2. Vierteljahr | 40,06 | 21,74 | 61,79 | 94,97 | 156,76 | 18,69 | 175,45 |
| | 3. Vierteljahr | 40,18 | 21,04 | 61,22 | 94,58 | 155,80 | 18,15 | 173,95 |
| | 4. Vierteljahr | 40,44 | 19,55 | 59,99 | 93,48 | 153,46 | 17,00 | 170,46 |
| 1952 | 1. Vierteljahr | 40,52 | 19,10 | 59,62 | 93,08 | 152,70 | 16,51 | 169,22 |
| | 2. Vierteljahr | 40,95 | 18,72 | 59,67 | 92,68 | 152,36 | 16,20 | 168,56 |
| | 3. Vierteljahr | 41,78 | 17,13 | 58,90 | 91,47 | 150,37 | 15,62 | 166,00 |
| | 4. Vierteljahr | 42,17 | 14,27 | 56,43 | 89,68 | 146,11 | 14,73 | 160,84 |

¹⁾ Nur Neuzugänge, keine Zugänge aus anderen Gruppen.- ²⁾ Ohne Reg.-Bez. Südwestfalen-Hohenzollern.- ³⁾ Bestand am Ende des Vierteljahres.

Sterbefälle an Tuberkulose der Atmungsorgane
in den Ländern des Bundesgebietes und West-Berlin
 (auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr)
 vorläufiges Ergebnis der standesamtlichen Meldungen

| Land | 1951 | | | | 1952 | | | |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 1.Vj. | 2.Vj. | 3.Vj. | 4.Vj. | 1.Vj. | 2.Vj. | 3.Vj. | 4.Vj. |
| Schleswig-Holstein | 3,5 | 3,0 | 2,9 | 3,4 | 3,8 | 2,7 | 1,5 | 2,1 |
| Hamburg | 3,6 | 3,3 | 2,9 | 3,1 | 3,5 | 2,7 | 1,4 | 1,9 |
| Niedersachsen | 3,6 | 3,0 | 2,8 | 2,7 | 3,4 | 2,6 | 1,4 | 1,6 |
| Bremen | 3,4 | 3,7 | 2,8 | 3,3 | 3,1 | 2,4 | 1,9 | 1,9 |
| Nordrhein-Westfalen | 4,0 | 3,6 | 2,9 | 3,1 | 3,5 | 2,6 | 1,6 | 1,9 |
| Hessen | 3,1 | 2,8 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | 1,9 | 1,6 | 1,8 |
| Rheinland-Pfalz | 4,0 | 3,1 | 2,5 | 3,1 | 3,3 | 2,4 | 1,6 | 1,5 |
| Baden-Württemberg | 2,8 | 2,6 | 1,8 | 2,7 | 2,6 | 2,2 | 1,5 | 1,4 |
| Bayern | 3,5 | 3,4 | 2,7 | 3,0 | 3,4 | 2,9 | 1,7 | 1,9 |
| Bundesgebiet | 3,6 | 3,2 | 2,7 | 3,0 | 3,3 | 2,5 | 1,6 | 1,8 |
| West-Berlin | 4,6 | 4,9 | 4,0 | 4,4 | 5,6 | 4,1 | 2,8 | 2,6 |

Sterbefälle an Tuberkulose anderer Organe
(einschließlich Miliartuberkulose)
 in den Ländern des Bundesgebietes und West-Berlin
 (auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr)
 vorläufiges Ergebnis der standesamtlichen Meldungen

| Land | 1951 | | | | 1952 | | | |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 1.Vj. | 2.Vj. | 3.Vj. | 4.Vj. | 1.Vj. | 2.Vj. | 3.Vj. | 4.Vj. |
| Schleswig-Holstein | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,3 |
| Hamburg | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
| Niedersachsen | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
| Bremen | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 0,5 | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 0,2 |
| Nordrhein-Westfalen | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
| Hessen | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
| Rheinland-Pfalz | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 |
| Baden-Württemberg | 0,7 | 0,8 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 |
| Bayern | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
| Bundesgebiet | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
| West-Berlin | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |