

FACHSERIE **A**

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

II. Erkrankungen an Tuberkulose

4. Vierteljahr 1963



Bestellnummer: A 7/II - vj 4/63

VERLAG W. KOHLHAMMER GMBH / STUTTGART UND MAINZ

Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	3
Tabellen	
1. Neuzugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten im 4. Vierteljahr 1963 (Grund- und Verhältniszahlen)	4
2. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten am 31.12.1963 (Grund- und Verhältniszahlen)	5
3. Sterbefälle an Tuberkulose (auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr)	6

Erschienen im Juni 1964

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe
gestattet.

Preis: DM -.50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler Gliederung
werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen
Landesämter mit der Kennziffer A IV 5 veröffentlicht.

Tuberkulose
im 4. Vierteljahr 1963

Die aus den monatlichen Meldungen der Tuberkulose-Fürsorgestellen addierten Länderergebnisse werden für die vierteljährlichen Berichte verwendet.

Von den Tuberkulose-Fürsorgestellen werden unterschieden:

- a) Neuzugänge, d.s. erstmalig erfaßte Kranke, aus anderen Wohnbezirken zugezogene Kranke Personen, Wiedererkrankte, die als geheilt aus der Fürsorgeüberwachung entlassen waren und wieder aktiv erkrankten;
- b) der Bestand an Kranken nach einer Auszählung der Kartei am Ende des Vierteljahres.

Die Einordnung erfolgt nach den Krankheitsbefunden, und zwar nach ansteckender Tuberkulose der Atmungsorgane, nichtansteckender Tuberkulose der Atmungsorgane und Tuberkulose anderer Organe.

Die Anzahl der Neuzugänge und auch die des Bestandes an Tuberkulösen ist in großem Maße von der Zahl der untersuchten Personen abhängig. Die unterschiedliche, wechselnde Teilnahme der Bevölkerung in verschiedenen Verwaltungsbezirken z.B. an Röntgen-Reihen-Untersuchungen muß daher bei der Beurteilung der Ergebnisse beachtet werden.

Um das Bild über die Tuberkulose im Bundesgebiet einschl. Berlin (West) zu ergänzen, werden auch die Tuberkulosesterbeziffern des vierten Vierteljahres 1963 und zum Vergleich die der vier Vierteljahre 1962 auf Grund der Todesursachenstatistik beigefügt.

1. Neuzugänge¹⁾ an aktivier Tuberkulose Erkrankungen

am 4. Vierteljahr 1962

(Vorläufiges Ergebnis)

L a n d	Tuberkulose der Atemwege				Tuberkulose		
	ansteckend (offen)			nichtansteckend (aktiv geschlossen)	insgesamt	anderer Organe	aller Formen insgesamt
	mit Bazillennachweis	ohne	insgesamt				
Grundzahlen							
Schleswig-Holstein	141	63	204	401	605	94	699
Hamburg	104	22	126	343	469	75	544
Niedersachsen	274	86	360	917	1 277	232	1 509
Bremen	.	.	38	94	132	40	172
Nordrhein-Westfalen	934	192	1 126	1 778	2 904	508	3 412
Hessen	206	62	268	590	858	178	1 036
Rheinland-Pfalz	207	75	282	464	746	162	908
Baden-Württemberg	367	81	448	1 204	1 652	356	2 008
Bayern	522	108	630	1 353	1 983	300	2 283
Saarland	83	9	92	195	287	60	347
Bundesgebiet ohne Berlin	2 838 ^{a)}	698 ^{a)}	3 574	7 339	10 913	2 005	12 918
4. Vj. 1962	2 969 ^{a)}	758 ^{a)}	3 777	7 611	11 388	2 112	13 500
Berlin (West)	236	10	246	501	747	92	839
4. Vj. 1962	261	6	267	533	800	61	861
Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	3 074 ^{a)}	708 ^{a)}	3 820	7 840	11 660	2 097	13 757
4. Vj. 1962	3 230 ^{a)}	764 ^{a)}	4 044	8 144	12 188	2 173	14 361
Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr							
Schleswig-Holstein	23,6	10,5	34,1	67,0	101,1	15,7	116,8
Hamburg	22,3	4,7	27,0	73,4	100,3	16,0	116,4
Niedersachsen	16,0	5,0	21,0	53,6	74,7	13,6	88,2
Bremen	.	.	20,8	51,5	72,3	21,9	94,3
Nordrhein-Westfalen	22,7	4,7	27,3	43,1	70,5	12,3	82,8
Hessen	16,3	4,9	21,3	46,8	68,1	14,1	82,2
Rheinland-Pfalz	23,4	8,5	31,9	52,5	84,4	18,3	102,7
Baden-Württemberg	17,9	4,0	21,9	58,9	80,8	17,4	98,2
Bayern	21,0	4,4	25,4	54,5	79,9	12,1	92,0
Saarland	29,8	3,2	33,0	69,9	103,0	21,5	124,5
Bundesgebiet ohne Berlin	20,5 ^{a)}	5,0 ^{a)}	25,5	52,3	77,8	14,3	92,1
4. Vj. 1962	21,7 ^{a)}	5,5 ^{a)}	27,2	54,9	82,1	15,2	97,2
Berlin (West)	42,9	1,8	44,7	91,0	135,7	16,7	152,4
4. Vj. 1962	47,6	1,1	48,7	97,2	145,9	11,1	157,0
Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	21,4 ^{a)}	4,9 ^{a)}	26,2	53,8	80,0	14,4	94,4
4. Vj. 1962	22,7 ^{a)}	5,4 ^{a)}	28,0	56,5	84,5	15,1	99,6

1) Nur Neuzugänge, keine Zugänge aus anderen Gruppen.

a) Ohne Bremen.

2. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten

am 31.12.1963

(Vorläufiges Ergebnis)

L a n d	Tuberkulose der Atmungsorgane				Tuberkulose		
	ansteckend (offen)			nichtansteckend (aktiv geschlossen)	insgesamt	anderer Organe	aller Formen insgesamt
	mit Bazillennachweis	ohne	insgesamt				
	Grundzahlen						
Schleswig-Holstein	2 367	947	3 314	8 056	11 370	1 588	12 958
Hamburg	3 135	832	3 967	12 123	16 090	2 261	18 351
Niedersachsen	6 505	1 142	7 647	17 783	25 430	4 864	30 294
Bremen	.	.	942	2 436	3 378	776	4 154
Nordrhein-Westfalen	17 437	3 795	21 232	47 091	68 323	13 852	82 175
Hessen	3 972	666	4 638	10 490	15 128	3 292	18 420
Rheinland-Pfalz	3 761	1 413	5 174	10 769	15 943	3 153	19 096
Baden-Württemberg	7 710	1 124	8 834	19 419	28 253	5 268	33 521
Bayern	11 291	1 268	12 559	21 531	34 090	4 307	38 397
Saarland	1 292	352	1 644	2 813	4 457	685	5 142
Bundesgebiet ohne Berlin	57 470 ^{a)}	11 539 ^{a)}	69 951	152 511	222 462	40 046	262 508
4. Vj. 1962 b)	53 408 ^{a)}	11 660 ^{a)}	66 185	144 097	210 282	36 868	247 150
Berlin (West)	6 123	56	6 179	16 180	22 359	1 754	24 113
4. Vj. 1962	6 447	70	6 517	17 736	24 253	1 817	26 070
Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	63 593 ^{a)}	11 595 ^{a)}	76 130	168 691	244 821	41 800	286 621
4. Vj. 1962 b)	59 855 ^{a)}	11 730 ^{a)}	72 702	161 833	234 535	38 685	273 220
	Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr						
Schleswig-Holstein	99,6	39,9	139,5	339,1	478,6	66,8	545,4
Hamburg	169,0	44,9	213,9	653,7	867,6	121,9	989,5
Niedersachsen	95,9	16,8	112,7	262,0	374,7	71,7	446,4
Bremen	.	.	130,0	336,1	466,1	107,1	573,1
Nordrhein-Westfalen	106,6	23,2	129,8	287,8	417,6	84,7	502,3
Hessen	79,4	13,3	92,7	209,6	302,3	65,8	368,0
Rheinland-Pfalz	107,2	40,3	147,4	306,9	454,3	89,8	544,1
Baden-Württemberg	95,1	13,9	109,0	239,5	348,4	65,0	413,4
Bayern	114,7	12,9	127,5	218,7	346,2	43,7	390,0
Saarland	116,8	31,8	148,6	254,3	402,9	61,9	464,8
Bundesgebiet ohne Berlin	104,6 ^{a)}	21,0 ^{a)}	125,6	273,9	399,5	71,9	471,5
4. Vj. 1962 b)	112,1 ^{a)}	24,5 ^{a)}	136,9	298,1	435,0	76,3	511,3
Berlin (West)	280,1	2,6	282,6	740,1	1 022,7	80,2	1 103,0
4. Vj. 1962	296,5	3,2	299,7	815,7	1 115,5	83,6	1 199,1
Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	111,3 ^{a)}	20,3 ^{a)}	131,6	291,5	423,1	72,2	493,3
4. Vj. 1962 b)	120,2 ^{a)}	23,6 ^{a)}	143,9	320,4	464,3	76,6	540,9

a) Ohne Bremen. - b) Ohne Niedersachsen.

3. Sterbefälle an Tuberkulose (standesamtliche Meldungen)

auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr

(Vorläufiges Ergebnis)

L a n d	1962				1963			
	1. Vj.	2. Vj.	3. Vj.	4. Vj.	1. Vj.	2. Vj.	3. Vj.	4. Vj.
Atmungsorgane								
Schleswig-Holstein	17,2	12,7	12,5	13,2	15,5	12,-	10,9	11,9
Hamburg	13,4	14,6	12,9	18,0	23,3	17,1	12,2	13,3
Niedersachsen	13,6	12,5	9,8	11,6	16,7	12,4	10,0	11,4
Bremen	13,7	7,3	10,0	12,7	22,0	10,0	6,0	8,8
Nordrhein-Westfalen	13,9	13,2	11,1	12,8	18,2	11,2	10,0	12,2
Hessen	10,2	8,9	9,0	7,6	12,1	7,7	7,8	7,9
Rheinland-Pfalz	14,4	13,0	11,1	13,1	17,7	11,3	10,8	12,9
Baden-Württemberg	13,4	11,5	9,2	11,5	17,7	10,6	8,9	11,1
Bayern	17,0	15,5	12,0	13,7	19,6	13,9	13,3	14,5
Saarland	16,4	18,4	17,1	15,9	20,7	14,6	21,2	15,8
Bundesgebiet ohne Berlin	14,2	12,9	10,9	12,4	17,8	11,7	10,5	12,0
Berlin (West)	21,2	25,0	19,5	24,8	33,8	18,1	22,0	22,7
Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	14,5	13,4	11,2	12,9	18,4	11,9	11,0	12,4
Andere Organe								
Schleswig-Holstein	0,7	2,1	1,2	1,9	1,2	0,5	1,3	0,7
Hamburg	1,1	0,7	0,4	0,6	1,3	0,9	0,2	0,6
Niedersachsen	1,3	1,5	0,7	0,9	0,9	1,0	0,5	1,0
Bremen	0,6	0,6	0,6	2,2	0,6	0,6	-	1,1
Nordrhein-Westfalen	0,9	0,9	0,6	1,1	1,1	0,7	0,6	0,8
Hessen	0,8	0,7	0,5	1,0	0,7	0,5	0,4	0,7
Rheinland-Pfalz	1,3	1,5	0,8	1,0	0,8	0,9	0,5	0,7
Baden-Württemberg	1,2	1,8	1,0	1,3	1,7	0,5	1,1	0,7
Bayern	1,3	1,3	0,7	0,6	0,9	0,9	1,3	1,0
Saarland	0,7	2,6	0,7	0,4	0,7	0,7	0,7	-
Bundesgebiet ohne Berlin	1,1	1,3	0,7	1,0	1,1	0,7	0,8	0,8
Berlin (West)	1,3	0,4	1,3	1,5	0,4	1,7	0,5	1,6
Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	1,1	1,2	0,7	1,0	1,0	0,8	0,7	0,8