

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

II. Erkrankungen an Tuberkulose

4. Vierteljahr 1966



Bestellnummer: A 7/II - vj 4/66

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

I n h a l t

Seite

Vorbemerkung	3
Tabellenteil	
1. Zugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten nach Art und Form der Tuberkulose im 4. Vierteljahr 1966 (Grund- und Verhältniszahlen)	4
2. Zugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten nach Art und Form der Tuberkulose sowie nach Art des Zugangs im 4. Vierteljahr 1966 (Grund- und Verhältniszahlen)	5
3. Sterbefälle an Tuberkulose (Grund- und Verhältniszahlen)	6

Erkrankungs- und Sterbeziffern, die auf weniger als 50 Erkrankungsbzw. Sterbefälle beruhen, wurden eingeklammert, da sie infolge zu großer Zufallsschwankungen keinen sicheren statistischen Aussagewert besitzen.

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Erschienen im April 1967

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM -,50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 5 veröffentlicht.

Vorbemerkung

Die aus den monatlichen Meldungen der Tuberkulose-Fürsorgestellen addierten Länderergebnisse werden für die vierteljährlichen Berichte verwendet.

Zu diesen Meldungen zählen als Zugänge nur Erkrankte mit einer aktiven Tuberkulose (Gruppe I, entsprechend den Erläuterungen zur Tuberkulosestatistik vom November 1965 des Deutschen Zentralkomitees zur Bekämpfung der Tuberkulose), und zwar:

- a) Alle erstmals bekannt gewordenen Tuberkulösen einschließlich der Reaktivierten, d. h. jener Kranken, deren Tuberkulose inaktiv war und im Berichtszeitraum aktiv geworden ist.
- b) Alle Tuberkulösen, die in früheren Jahren aus der Tuberkulosefürsorge ausgeschieden waren und im Berichtszeitraum erneut erkrankten.
- c) Alle Tuberkulösen, die nach Umzug von einem in einen anderen Fürsorgebezirk dort registriert werden.

Die Einordnung erfolgt nach den Krankheitsbefunden, und zwar nach ansteckender Tuberkulose der Atmungsorgane, nichtansteckender Tuberkulose der Atmungsorgane und Tuberkulose anderer Organe.

Die Zahl der Zugänge an Tuberkulösen ist von der Zahl der durch Vorsorge- bzw. Reihenuntersuchungen erfaßten Personen abhängig. Die unterschiedliche Teilnahme der Bevölkerung in den verschiedenen Verwaltungsbezirken an diesen Untersuchungen muß daher bei der Beurteilung der Ergebnisse beachtet werden.

Um das Bild über die Tuberkulose zu ergänzen, werden auch die Tuberkulosesterbeziffern der vorhergehenden Vierteljahre 1966 und zum Vergleich die der Vierteljahre 1965 aufgrund der Todesursachenstatistik beigelegt.

1. Zugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten nach der Art und Form der Tuberkulose

im 4. Vierteljahr 1966

(Vorläufiges Ergebnis)

L a n d	Tuberkulose				
	insgesamt	der Atmungsorgane			anderer Organe (aktiv extrapulmonal)
		zu-sammen	ansteckungs-fähig (offen)	nichtanstek-kungsfähig (aktiv geschlossen)	
Grundzahlen					
Schleswig-Holstein	614	540	210	330	74
Hamburg	571	490	173	317	81
Niedersachsen	1 806	1 536	504	1 032	270
Bremen	219	180	54	126	39
Nordrhein-Westfalen	5 240	4 684	1 664	3 020	556
Hessen	1 331	1 103	330	773	228
Rheinland-Pfalz	762	633	281	352	129
Baden-Württemberg	2 908	2 472	647	1 825	436
Bayern	2 792	2 479	810	1 669	313
Saarland	274	239	95	144	35
Berlin (West)	836	756	230	526	80
Bundesgebiet	17 353	15 112	4 998	10 114	2 241
dagegen 4. Vj. 1965	13 561	11 577	3 780	7 797	1 984

Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr

Schleswig-Holstein	98,6	86,7	33,7	53,0	11,9
Hamburg	122,4	105,1	37,1	68,0	17,4
Niedersachsen	102,8	87,4	28,7	58,7	15,4
Bremen	116,0	95,3	28,6	66,7	(20,7)
Nordrhein-Westfalen	123,4	110,3	39,2	71,1	13,1
Hessen	100,7	83,5	25,0	58,5	17,3
Rheinland-Pfalz	83,6	69,5	30,8	38,6	14,2
Baden-Württemberg	135,0	114,7	30,0	84,7	20,2
Bayern	108,3	96,2	31,4	64,8	12,1
Saarland	96,0	83,7	33,3	50,4	(12,3)
Berlin (West)	151,6	137,1	41,7	95,4	14,5
Bundesgebiet	115,1	100,2	33,1	67,1	14,9
dagegen 4. Vj. 1965	90,7	77,5	25,3	52,2	13,3

2. Zugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten nach Art und Form der Tuberkulose sowie nach Art des Zugangs

im 4. Vierteljahr 1966

(Vorläufiges Ergebnis)

Land	Tuberkulose der Atmungsorgane						Tuberkulose anderer Organe (aktiv extrapulmonal)		
	ansteckungsfähig (offen)			nichtansteckungsfähig (aktiv geschlossen)			Erstmals bekannt gewordene Tuber- kulöse ¹⁾	Wieder- er- ²⁾ krankte	Zuzüge aus Kreisen außerhalb des Landes ³⁾
	Erstmals bekannt gewordene Tuber- kulöse ¹⁾	Wieder- er- ²⁾ krankte	Zuzüge aus Kreisen außerhalb des Landes ³⁾	Erstmals bekannt gewordene Tuber- kulöse ¹⁾	Wieder- er- ²⁾ krankte	Zuzüge aus Kreisen außerhalb des Landes ³⁾			
Grundzahlen									
Schleswig-Holstein	150	53	7	235	72	23	64	7	3
Hamburg	136	36	1	212	91	14	72	9	-
Niedersachsen	309	141	54	585	338	109	191	47	32
Bremen	37	14	3	91	24	11	22	12	5
Nordrhein-Westfalen	903	743	18	1 308	1 668	44	458	87	11
Hessen	225	80	25	520	177	76	171	40	17
Rheinland-Pfalz	216	49	16	266	71	15	105	23	1
Baden-Württemberg	411	212	24	1 218	540	67	306	120	10
Bayern	551	237	22	1 140	476	53	233	73	7
Saarland	85	9	1	133	8	3	34	1	-
Berlin (West)	163	67	.	351	175	.	66	14	.
Bundesgebiet	3 186	1 641	171	6 059	3 640	415	1 722	433	86

Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr

Schleswig-Holstein	24,1	8,5	(1,1)	37,7	11,6	(3,7)	10,3	(1,1)	(0,5)
Hamburg	29,2	(7,7)	(0,2)	45,5	19,5	(3,0)	15,4	(1,9)	-
Niedersachsen	17,6	8,0	3,1	33,3	19,2	6,2	10,9	(2,7)	(1,8)
Bremen	(19,6)	(7,4)	(1,6)	48,2	(12,7)	(5,8)	(11,7)	(6,4)	(2,6)
Nordrhein-Westfalen	21,3	17,5	(0,4)	30,8	39,3	(1,0)	10,8	2,0	(0,3)
Hessen	17,0	6,1	(1,9)	39,4	13,4	5,8	12,9	(3,0)	(1,3)
Rheinland-Pfalz	23,7	(5,4)	(1,8)	29,2	7,8	(1,6)	11,5	(2,5)	(0,1)
Baden-Württemberg	19,1	9,8	(1,1)	56,5	25,1	3,1	14,2	5,6	(0,5)
Bayern	21,4	9,2	(0,9)	44,2	18,5	2,1	9,0	2,8	(0,3)
Saarland	29,8	(3,2)	(0,4)	46,6	(2,8)	(1,1)	(11,9)	(0,4)	-
Berlin (West)	29,6	12,1	.	63,6	31,7	.	12,0	(2,5)	.
Bundesgebiet	21,1	10,9	1,1	40,2	24,1	2,8	11,4	2,9	0,6

1) Einschl. der Übergänge aus den Gruppen IIc, IID, III, V. - 2) Bzw. Reaktivierte. - 3) In Niedersachsen und Hessen einschl. der Zuzüge aus den Fürsorgebezirken innerhalb der Länder.

3. Sterbefälle an Tuberkulose

(Vorläufiges Ergebnis)

L a n d	1965				1966			
	1. Vj.	2. Vj.	3. Vj.	4. Vj.	1. Vj.	2. Vj.	3. Vj.	4. Vj.
Atmungsorgane								
Grundzahlen								
Schleswig-Holstein	83	80	67	77	82	71	74	71
Hamburg	71	65	58	50	60	54	44	71
Niedersachsen	210	207	180	180	213	186	183	218
Bremen	12	11	11	23	25	19	9	13
Nordrhein-Westfalen	501	434	441	518	458	459	395	460
Hessen	105	97	93	119	108	90	74	76
Rheinland-Pfalz	119	110	104	107	109	116	88	100
Baden-Württemberg	231	215	211	230	236	211	174	212
Bayern	408	395	322	381	382	356	335	381
Saarland	50	42	35	46	40	31	30	35
Berlin (West)	104	97	100	99	110	63	76	91
Bundesgebiet	1 894	1 753	1 622	1 830	1 823	1 656	1 482	1 728
Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr								
Schleswig-Holstein	14,0	13,3	10,9	12,5	13,6	11,6	11,9	11,4
Hamburg	15,5	14,0	12,4	10,7	13,1	11,7	9,4	15,2
Niedersachsen	12,4	12,1	10,3	10,3	12,5	10,7	10,4	12,4
Bremen	(6,6)	(6,0)	(5,9)	(12,3)	(13,6)	(10,2)	(4,8)	(6,9)
Nordrhein-Westfalen	12,3	10,5	10,5	12,3	11,1	11,0	9,3	10,8
Hessen	8,4	7,6	7,2	9,1	8,5	6,9	5,6	5,8
Rheinland-Pfalz	13,6	12,4	11,5	11,9	12,3	12,9	9,7	11,0
Baden-Württemberg	11,3	10,3	10,0	10,8	11,3	10,0	8,1	9,8
Bayern	16,6	15,8	12,7	15,0	15,3	14,0	13,0	14,8
Saarland	18,1	(15,0)	(12,3)	(16,2)	(14,4)	(11,0)	(10,5)	(12,3)
Berlin (West)	19,2	17,7	18,0	17,9	20,3	11,5	13,8	16,5
Bundesgebiet	13,1	11,9	10,9	12,2	12,5	11,1	9,8	11,5
Andere Organe								
Grundzahlen								
Schleswig-Holstein	3	3	3	1	2	5	9	2
Hamburg	6	8	2	2	-	4	3	2
Niedersachsen	17	16	13	18	11	17	8	13
Bremen	1	3	1	1	-	-	-	4
Nordrhein-Westfalen	25	25	28	49	35	25	38	27
Hessen	5	10	6	15	7	12	7	10
Rheinland-Pfalz	5	9	11	8	7	6	6	5
Baden-Württemberg	16	25	20	18	20	25	13	19
Bayern	12	21	19	15	22	22	18	12
Saarland	-	3	1	-	-	2	1	-
Berlin (West)	12	10	8	2	8	6	5	3
Bundesgebiet	102	133	112	129	112	124	108	97
Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr								
Bundesgebiet	0,7	0,9	0,8	0,9	0,8	0,8	0,7	0,6