

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **B**

LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI

Reihe 2

Gartenbau und Weinwirtschaft

I. Gemüse


Wachstumstand und Ernteschätzung
von Gemüse

Mai 1967



Bestellnummer: B 2/1 - 6/67

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Erläuterung der Ergebnisse	4
Tabellenteil:	
1. Wachstumsstand des Gemüses im Mai 1967	5
2. Ernteschätzung von Gemüse im Mai 1967	6
3. Ernteschätzung in Hauptanbaugebieten im Mai 1967	8

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet

Die letzte Darstellung der Methoden dieser Statistik ist in Band 86 und 242 der Statistik der Bundesrepublik Deutschland erschienen.

Erschienen im Juni 1967

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis DM 0,50

Ergebnisse für die einzelnen Bundesländer werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer C II 2 veröffentlicht.

Die Berichterstatter beurteilten den Witterungsverlauf für den Gemüsebau in der Zeit vom 21. April bis zum 20. Mai recht unterschiedlich. Sie hielten die Niederschläge vor allem in Hamburg, Hessen, Rheinland-Pfalz und Berlin für gering und sahen die Temperaturen in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland als vorwiegend zu kalt an. Insgesamt war es im Bundesgebiet trockener und kälter als zur gleichen Zeit des Vorjahres.

Beurteilung des Witterungsverlaufes in % der
ausgewerteten Berichte
für Mai 1967

Land	Niederschläge in der Berichtszeit			Temperatur			
	zu gering	aus- reichend	zu hoch	zu warm	normal	zu kalt	
Schleswig-Holstein	16	81	3	8	75	17	
Hamburg	69	31	-	15	58	27	
Niedersachsen	42	55	3	7	56	37	
Bremen	
Nordrhein-Westfalen	21	73	6	6	46	48	
Hessen	60	40	-	-	59	41	
Rheinland-Pfalz	62	38	-	13	37	50	
Baden-Württemberg	36	64	-	6	54	40	
Bayern	31	65	4	14	63	23	
Saarland	9	91	-	-	45	55	
Berlin (West)	62	38	-	15	54	31	
Bundesgebiet							
	1967	40	58	2	8	55	37
	April 1967	2	65	33	2	39	59
	Mai 1966	6	81	13	13	74	13

Der Wachstumstand der frühen Arten von Weiß- und Rotkohl, Wirsing und Möhren wurde im Bundesgebiet durchschnittlich gut bis mittel und damit etwas besser bewertet als im April. Im Vergleich zur Berichtszeit des Vorjahres lagen die Noten bei Frührotkohl um zwei Zehntel höher, bei Frühwirsing dagegen um ein Zehntel niedriger. Verhältnismäßig gut wurde auch der Stand von Frischerbsen und Dicken Bohnen beurteilt.

Nach den Ergebnissen der endgültigen Ernteschätzung bei den im Freien überwinterten Gemüsearten und Frühjahrsspinat wurde im Durchschnitt des Bundesgebietes nur bei Adventswirsing eine höhere Erntemenge (+ 4 %) als im Vorjahr erzielt. Bei Winterkopfsalat war eine geringe Abnahme (- 2 %) zu verzeichnen. Infolge stärkerer Flächeneinschränkungen (- 19 %) blieben die Erntemengen bei Winter- und Frühjahrsspinat zusammen um etwa 4 600 t (- 15 %) unter dem Ergebnis von 1966.

1. Wachstumsstand des Gemüses im Mai 1967

(gegenüber April 1967 und Mai 1966)

Noten: 1 = sehr gut; 2 = gut; 3 = mittel; 4 = gering; 5 = sehr gering

Land	Zeit	Früh- weiß- kohl	Früh- rot- kohl	Früh- wir- sing	Frühe Möh- ren	Frisch- erbsen	Dicke Boh- nen
Schleswig-Holstein	Mai 1967	2,6	2,6	2,8	2,7	2,6	2,5
	April 1967	3,0	3,0	3,1	3,1	.	.
	Mai 1966	2,6	2,7	2,8	2,7	2,6	2,6
Hamburg	Mai 1967	3,1	3,0	2,7	2,7	3,0	3,0
	April 1967	2,9	3,0	2,8	2,8	.	.
	Mai 1966	2,8	2,9	3,1	3,0	2,3	2,7
Niedersachsen	Mai 1967	2,8	2,9	2,7	2,7	2,5	2,4
	April 1967	3,0	3,1	3,1	3,0	.	.
	Mai 1966	2,7	2,8	2,8	2,7	2,6	2,7
Bremen	Mai 1967
	April 1967
	Mai 1966
Nordrhein-Westfalen	Mai 1967	2,6	2,6	2,6	2,9	2,7	2,5
	April 1967	2,7	2,8	2,6	2,8	.	.
	Mai 1966	2,5	2,6	2,4	2,7	2,5	2,3
Hessen	Mai 1967	2,6	2,6	2,5	2,5	2,5	2,6
	April 1967	2,6	2,6	2,6	2,8	.	.
	Mai 1966	2,6	2,7	2,5	2,7	2,7	2,7
Rheinland-Pfalz	Mai 1967	2,5	2,6	2,5	2,8	2,1	2,2
	April 1967	2,8	2,9	2,7	2,9	.	.
	Mai 1966	2,5	2,3	2,3	2,6	2,2	2,3
Baden-Württemberg	Mai 1967	2,5	2,6	2,6	2,7	2,4	2,3
	April 1967	2,6	2,7	2,6	2,7	.	.
	Mai 1966	2,4	2,5	2,5	2,6	2,4	2,2
Bayern	Mai 1967	2,8	2,8	2,8	2,7	2,6	2,6
	April 1967	2,8	2,8	2,8	2,8	.	.
	Mai 1966	2,5	2,5	2,5	2,6	2,5	2,4
Saarland	Mai 1967	2,1	2,0	2,1	2,5	2,3	2,1
	April 1967	2,6	2,4	2,4	2,5	.	.
	Mai 1966	2,0	2,1	2,0	2,0	2,3	2,0
Berlin (West)	Mai 1967	2,9	2,8	2,6	2,9	3,0	3,0
	April 1967	2,8	2,6	2,8	2,8	.	.
	Mai 1966	2,6	2,4	2,6	2,8	3,0	3,0
Bundesgebiet	Mai 1967	2,6	2,7	2,6	2,7	2,5	2,5
	April 1967	2,8	2,8	2,7	2,9	.	.
	Mai 1966	2,6	2,9	2,5	2,7	2,6	2,5

2. Ernteschätzung
(gegenüber

Lfd. Nr.	Land	Jahr	Adventswirsing		
			Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge
			ha	dz	
1	Schleswig-Holstein	1967	-	-	-
2		1966	-	-	-
3	Hamburg	1967	-	-	-
4		1966	-	-	-
5	Niedersachsen	1967	1	136,7	191
6		1966	-	-	-
7	Bremen	1967	-	-	-
8		1966	-	-	-
9	Nordrhein-Westfalen	1967	157	191,9	30 124
10		1966	157	193,9	30 445
11	Hessen	1967	9	72,7	654
12		1966	1	299,3	299
13	Rheinland-Pfalz	1967	56	158,3	8 886
14		1966	39	191,6	7 490
15	Baden-Württemberg	1967	-	-	-
16		1966	-	-	-
17	Bayern	1967	-	-	-
18		1966	-	-	-
19	Saarland	1967	2	129,1	224
20		1966	2	119,8	213
21	Berlin (West)	1967	-	-	-
22		1966	-	-	-
23	Bundesgebiet	1967	225	178,1	40 079
24		1966	199	193,2	38 447
25		Ø 1961/66	201	172,6	34 771

1) Einschließlich vom Statistischen Bundesamt geschätzter Erträge für Bremen. -

von Gemüse im Mai 1967
Anbau und Ernte 1966)

Winterkopfsalat			Winterspinat			Frühjahrsspinat			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	
ha	dz		ha	dz		ha	dz		
-	-	-	-	-	-	51	155,8	7 946	1
-	-	-	-	-	-	25	135,0	3 374	2
3	151,8	455	3	115,0	345	89	184,5	16 421	3
2	126,7	253	3	122,0	366	96	175,8	16 877	4
4	116,7	455	186	114,1	21 262	260	132,0	34 286	5
3	107,3	279	256	113,6	29 046	448	108,2	48 474	6
0	.	.	-	-	-	2	.	.	7
-	-	-	-	-	-	2	209,6	442	8
17	127,5	2 167	138	114,8	15 846	352	123,3	43 411	9
7	116,1	813	237	118,1	27 991	343	118,5	40 634	10
4	118,0	472	32	111,0	3 552	56	141,1	7 902	11
11	144,3	1 587	15	105,4	1 581	83	116,3	9 653	12
25	107,6	2 646	220	144,9	31 928	131	128,0	16 809	13
32	130,3	4 203	273	147,0	40 115	132	124,1	16 432	14
47	268,6	12 544	134	150,2	20 142	137	129,4	17 754	15
48	241,6	11 524	156	156,7	24 492	170	126,5	21 490	16
19	102,7	1 951	143	110,3	15 773	85	93,1	7 914	17
23	101,3	2 330	155	107,2	16 616	102	92,8	9 470	18
0	100,3	28	7	119,6	871	16	140,0	2 293	19
0	101,1	47	6	127,4	753	16	139,7	2 292	20
-	-	-	11	80,5	861	8	88,3	698	21
0	.	.	15	91,7	1 347	12	85,0	1 017	22
119	174,1	20 718	874	126,5	110 580	1 187	131,2 ¹⁾	155 698 ¹⁾	23
126	167,0	21 036	1 116	127,5	142 307	1 429	119,1	170 155	24
145	143,0	20 743	948	118,1	111 929	1 548	117,4	181 652	25

3. Ernteschätzung in Hauptanbaubereichen im Mai 1967

dz/ha

Hauptanbaubereich			Advents- wirsing	Winter- kopf- salat	Winter- spinat	Früh- jahrs- spinat
Landkreis	Hannover	Ndsa	-	.	114,0	170,2
	Wolfenbüttel		-	.	90,0	91,0
	Braunschweig		-	.	.	91,7
	Bonn	NW	194,6	116,9	102,7	101,1
	Grevenbroich		.	.	120,6	113,6
	Recklinghausen		.	.	.	149,3
KrfSt	Düsseldorf		.	.	.	152,5
KrfSt u. Ldkr	Frankenthal	RhPf	160,3	110,1	145,2	132,6
	Ludwigshafen		157,1	.	137,5	122,9
	Mainz		.	150,0	172,6	.
	Worms		.	.	.	115,0
Oberes Neckartal und Remstal		BaWü	.	181,4	144,5	133,9
Unteres Neckartal und Kraichgau			-	180,0	123,0	109,1
Unteres Rheintal			-	187,9	144,9	130,5
Breisgau und Kaiserstuhl			-	201,4	141,7	124,2
Konstanz mit Insel Reichenau			-	307,2	243,9	194,6
Oberes Gäugebiet			-	166,7	138,5	175,0
Nördl. Oberrheingebiet u. Ldkr Calw			-	.	136,7	143,3
Landkreis	Regensburg	Bay	-	75,0	.	.
	Straubing		-	.	105,0	79,0
	Neuburg a.d. Donau		-	80,0	.	.
	Bamberg		-	.	100,0	.
	Kitzingen		-	.	149,0	.
	Erding		-	.	.	100,0
	Mühldorf		-	.	.	130,0
KrfSt	München		-	150,0	140,0	100,0
	Regensburg		-	185,0	.	.
	Bamberg		-	102,0	.	.
	Nürnberg		-	.	102,0	88,0