

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **B**

LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI

Reihe 2

Gartenbau und Weinwirtschaft

I. Gemüse

Wachstumstand und Erntevorschätzung

April 1968

Eilbericht



Bestellnummer : 210210 - 680003

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	3
1. Erntevorschätzung von überwinternden Gemüsearten	4
2. Wachstumsstand und voraussichtlicher Hektarertrag von Gemüse im April	6

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden

. = kein Nachweis vorhanden

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet

Erschienen im Mai 1968

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis DM -,50

Ergebnisse für die einzelnen Länder werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer C I 2 veröffentlicht.

Vorbemerkung

Die Auswinterungsschäden waren in diesem Jahr bei den im Freien überwinterten Gemüsearten wesentlich geringer als in den vorangegangenen Jahren.

Übersicht berichtiger Anbauflächen
ha

Land	Adventswirsing		Winterkopfsalat		Winterspinat		Zusammen	
	Gemüse- vorer- hebung 1968	berich- tigt	Gemüse- vorer- hebung 1968	berich- tigt	Gemüse- vorer- hebung 1968	berich- tigt	Gemüse- vorer- hebung 1968	berich- tigt
Schleswig-Holstein	-	-	-	-	-	-	-	-
Hamburg	-	-	2	2	3	3	5	5
Niedersachsen	5	5	2	2	78	76	85	83
Bremen	-	-	-	-	-	-	-	-
Nordrhein-Westfalen	224	224	9	9	139	139	372	372
Hessen	0	0	2	2	23	23	25	25
Rheinland-Pfalz	67	64	25	25	273	270	365	359
Baden-Württemberg	.	-	81	61	102	99	183	160
Bayern	.	-	34	27	147	121	181	148
Saarland	4	3	0	0	5	4	9	7
Berlin (West)	1	1	-	-	7	7	8	8
Bundesgebiet	301	297	155	128	777	742	1 233	1 167
Abnahme	ha	- 4		- 27		- 35		- 66
	%	- 1		- 17		- 5		- 5

Nach den Ergebnissen der Erntevorschätzung ist beim Adventswirsing eine um + 37 % höhere, beim Winterspinat dagegen eine um - 12 % niedrigere Erntemenge als im Vorjahr zu erwarten. Beim Winterkopfsalat kann mit der gleichen Menge wie 1967 gerechnet werden.

Die erste Beurteilung des Wachstumsstandes und Vorschätzung des Hektar-ertrages der frühen Arten von Kohlrabi, Kopfsalat und Spinat ergab im Bundesdurchschnitt geringere Ergebnisse als zur gleichen Zeit des Vorjahres. Die Berichtersteller konnten infolge der für diese Jahreszeit außergewöhnlichen Witterung z.T. überhaupt noch keine Angaben machen. Den Wachstumsstand des Spargels beurteilten sie zum 20. April um zwei Zehntelnoten besser als 1967.

1. Erntevorschätzung von

Lfd. Nr.	Land	Jahr ¹⁾	Adventswirsing		
			Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge
1	Schleswig-Holstein	1968	-	-	-
2		1967	-	-	-
3	Hamburg	1968	-	-	-
4		1967	-	-	-
5	Niedersachsen	1968	5	150,0	750
6		1967	1	136,7	191
7	Bremen	1968	-	-	-
8		1967	-	-	-
9	Nordrhein-Westfalen	1968	224	192,5	43 121
10		1967	157	191,9	30 124
11	Hessen	1968	0	166,7	.
12		1967	9	72,7	654
13	Rheinland-Pfalz	1968	64	164,6	10 483
14		1967	56	158,3	8 886
15	Baden-Württemberg	1968	-	-	-
16		1967	-	-	-
17	Bayern	1968	-	-	-
18		1967	-	-	-
19	Saarland	1968	3	.	.
20		1967	2	129,1	261
21	Berlin (West)	1968	1	.	.
22		1967	-	-	-
23	Bundesgebiet	1968	297	184,7 ²⁾	54 848 ²⁾
24		1967	225	178,3	40 116

1) 1967: Endgültige Ergebnisse.- 2) Einschließlich geschätzter Erträge für Ham

überwinternden Gemüsearten

Winterkopfsalat			Winterspinat			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag je Hektar	Erntemenge	Fläche	Ertrag je Hektar	Erntemenge	
ha	dz		ha	dz		
-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	2
2			3			3
3	151,8	455	3	115,0	345	4
2	124,6	200	76	114,5	8 664	5
4	116,7	455	186	114,1	21 262	6
-	-	-	-	-	-	7
-	-	-	-	-	-	8
9	108,4	976	139	120,6	16 757	9
17	127,5	2 167	138	114,8	15 846	10
2	197,5	395	23	101,4	2 332	11
4	118,0	472	32	111,0	3 552	12
25	99,1	2 431	270	148,7	40 223	13
25	107,6	2 646	220	144,9	31 928	14
61	228,3	13 835	99	154,7	15 253	15
47	268,6	12 544	134	150,2	20 142	16
27	98,1	2 649	121	100,3	12 136	17
19	102,7	1 951	143	110,3	15 773	18
0			4			19
0	100,3	28	7	119,6	871	20
-	-	-	7	76,6	553	21
-	-	-	11	80,5	861	22
128	162,0 ²⁾	20 735 ²⁾	742	130,5 ²⁾	96 857 ²⁾	23
119	174,1	20 718	874	126,5	110 580	24

burg und Saarland.-

2. Wachstumstand und voraussichtlicher
 Noten: 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel,

Lfd. Nr.	Land	Jahr	Spargel	Frühhohlrabi	
			Note	Note	Voraussicht- licher Hektarertrag
					dz
1	Schleswig-Holstein	1968	.	.	.
2		1967	2,9	3,0	.
3	Hamburg	1968	2,0	3,5	190,4
4		1967	.	3,1	255,1
5	Niedersachsen	1968	2,7	3,3	126,2
6		1967	2,9	2,9	145,1
7	Bremen	1968	.	.	.
8		1967	.	.	.
9	Nordrhein-Westfalen	1968	2,8	3,1	.
10		1967	2,8	2,7	188,3
11	Hessen	1968	2,7	3,0	170,5
12		1967	2,9	2,7	244,6
13	Rheinland-Pfalz	1968	2,5	2,8	146,4
14		1967	2,7	3,0	126,4
15	Baden-Württemberg	1968	2,5	2,7	187,0
16		1967	2,8	2,6	196,2
17	Bayern	1968	2,7	3,0	154,2
18		1967	2,6	2,8	195,6
19	Saarland	1968	.	2,1	.
20		1967	2,5	2,4	.
21	Berlin (West)	1968	2,5	2,7	135,0
22		1967	3,1	2,6	148,1
23	Bundesgebiet ¹⁾	1968	2,6	3,1	159,7
24		1967	2,8	2,8	185,6

1) Der Bundesdurchschnitt wurde nur aus den jeweils vorliegenden Länderergeb

Hektarertrag von Gemüse im April

4 = gering, 5 = sehr gering

Frühjahrskopfsalat		Frühjahrsspinat		Lfd. Nr.
Note	Voraussicht- licher Hektarertrag	Note	Voraussicht- licher Hektarertrag	
	dz		dz	
2,6	.	2,5	.	1
4,0	167,6	3,4	143,8	2
3,1	203,7	3,2	216,0	3
3,2	153,0	3,0	106,6	4
2,9	133,1	2,9	145,8	5
.	.	.	.	6
.	.	.	.	7
3,2	.	2,9	.	8
2,8	168,2	2,8	117,9	9
3,0	167,3	2,9	106,2	10
2,7	172,6	2,7	172,6	11
2,8	120,4	2,7	100,9	12
2,8	85,3	2,4	119,0	13
2,5	186,0	2,4	129,8	14
2,5	216,6	2,4	145,7	15
2,8	146,7	2,7	86,1	16
2,7	163,2	2,7	89,3	17
2,0	.	2,0	.	18
2,0	.	2,2	.	19
2,8	93,0	3,0	65,8	20
2,9	96,8	2,5	107,7	21
3,0	154,9	2,8	112,9	22
2,7	163,9	2,7	136,2	23
				24

nissen errechnet.