

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE B

LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI

Reihe 2

Gartenbau und Weinwirtschaft

III. Weinwirtschaft

Stand der Reben

Juni 1967



Bestellnummer: B 2/III - 2/67

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Inhaltsübersicht

	Seite
Erläuterungen zum Tabellenteil	3
Allgemeine Angaben über Witterungsverhältnisse und Entwicklung der Reben	4
Beginn der Blüte	5
Durchschnittliche Dauer der Blüte	6
Stand der Reben	7

Erschienen im Juli 1967

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis DM -,50

Ergebnisse für die einzelnen Länder werden in den "Statistischen
Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer

C II 4 veröffentlicht.

Stand der Reben Ende Juni 1967

In der Berichterstattung von Ende Juni wurde die Witterung der letzten vier Wochen für die Reben überwiegend als mittel bezeichnet, daneben von etwa 30 % der Berichterstatter als gut und nur von 10 % als schlecht. Wetterschäden sind in der Berichtszeit etwas stärker aufgetreten als im vorhergehenden Monat, aber in geringfügigerem Umfang als im Juni 1966. Bei den Witterungsfaktoren Niederschläge, Temperaturverlauf und Sonnenscheindauer, war eine mittlere Beurteilung vorherrschend. Im Gegensatz hierzu wurden die für die Ernteaussichten wichtigen Kennzeichen, der Gescheinansatz und der Verlauf der Blüte, von 60 % der Berichterstatter als gut bewertet. Für den Gescheinansatz ist das ein etwa doppelt so großer Anteil wie 1966.

Der allgemeine Beginn der Blüte lag bei allen einbezogenen Rebsorten später als 1966, und zwar ganz überwiegend in der Zeit zwischen dem 21. und 30. Juni. Für einen Beginn im Juli verblieben nur schwache Anteile. Die durchschnittliche Dauer der Blüte war meist nur kurz und bewegte sich vorwiegend zwischen 5 und 10 Tagen. Die Unterschiede gegenüber dem Vorjahr sind bei den meisten erfaßten Rebsorten nur unerheblich, lassen aber überwiegend für 1967 einen etwas kleineren Anteil einer längeren Blütedauer erkennen.

Die Bewertung des Standes der Reben zu Ende Juni ergab mit der Note 2,1 (fast gut) eine leichte Verbesserung gegenüber dem Vormonat (2,2). Bisher wurde zu Ende Juni seit 1950 viermal die gleiche und in zwei Jahren eine bessere Note (1964 mit 1,8 und 1960 mit 1,9) ermittelt. Vor einem Jahr wurde der Stand der Reben zu Ende Juni mit 2,3 etwas schlechter beurteilt.

Von den bedeutenderen Weinbaugebieten erfuhren eine bessere Bewertung als 2,0 in Rheinhessen: Worms, Wiesbach und Rheinhesische Nahe sowie in der Pfalz: die Unterhaardt. Als schlechteste Note ergab sich eine 3,0 (Aussicht auf einen halben Herbst) vor allem für das Weinbaugebiet Obermosel. Die gleiche Note kam noch in zwei weiteren Weinbaugebieten mit sehr kleiner Rebfläche vor.

Allgemeine Angaben über Witterung und Entwicklung der Reben

Juni 1967

Berichtsgegenstand und Beurteilung	Nordrhein- Westfalen	Hessen	Rheinland- Pfalz	Baden- Württem- berg	Bayern	Saar- land	Insgesamt		
							Juni	Mai	Juni
							1967		1966
in % der Meldungen mit einschlägigen Angaben									
Witterung für die Reben									
schlecht	25	3	8	16	9	-	10	.	2
mittel	50	61	59	68	59	29	61	.	29
gut	25	36	33	16	32	71	29	.	69
Wetterschäden									
keine	50	97	80	62	64	100	76	93	62
schwache	25	3	16	25	16	-	17	5	22
mittlere	25	-	3	10	13	-	5	1	11
starke	-	-	1	3	7	-	2	1	5
Niederschläge									
zu gering	-	3	1	1	2	-	1	19	1
ausreichend	75	97	95	73	96	100	90	81	85
zu hoch	25	-	4	26	2	-	9	0	14
Temperaturverlauf									
ungünstig	50	40	22	45	19	-	28	14	4
normal	25	36	57	46	60	14	54	59	38
günstig	25	24	21	9	21	86	18	27	58
Sonnenscheindauer									
zu gering	75	42	30	53	24	29	36	.	5
genügend	25	49	65	46	64	71	60	.	59
reichlich	-	9	5	1	12	-	4	.	36
Verlauf der Blüte									
schlecht	-	4	2	5	1	-	3	.	1
mittel	50	23	30	38	41	29	32	.	16
gut	50	73	68	57	58	71	65	.	83
Gascheinansatz									
schlecht	-	-	3	1	14	-	3	.	2
mittel	-	20	37	40	49	29	37	.	71
gut	100	80	60	59	37	71	60	.	27
Durchführung der Pflegearbeiten									
vollständig	100	90	78	84	78	-	80	85	69
unvollständig	-	10	22	16	22	100	20	15	31

Allgemeiner Beginn der Blüte
Juni 1967

Rebsorte	Datum	Nordrhein- Westfalen	Heesen	Rheinland- Pfalz	Baden- Württem- berg 1)	Bayern	Saar- land	Insgesamt	
								1967	1966
in % der Meldungen mit einschlägigen Angaben									
Silvaner	bis 10. 6.	-	-	-	2	1	-	0	36
	vom 11. - 20. 6.	33	35	21	13	12	100	20	62
	" 21. - 30. 6.	67	65	74	84	86	-	76	2
	nach dem 30. 6.	-	-	5	1	1	-	4	0
Riesling	bis 10. 6.	-	-	-	1	-	-	0	39
	vom 11. - 20. 6.	25	29	21	18	17	100	21	59
	" 21. - 30. 6.	50	71	72	79	83	-	74	2
	nach dem 30. 6.	25	-	7	2	-	-	5	0
Müller-Thurgau	bis 10. 6.	-	3	-	2	1	-	1	56
	vom 11. - 20. 6.	25	60	41	33	26	100	40	43
	" 21. - 30. 6.	50	37	55	64	73	-	56	1
	nach dem 30. 6.	25	-	4	1	-	-	3	0
Elbling	bis 10. 6.	-	-	-	-	-	-	-	20
	vom 11. - 20. 6.	-	-	7	-	10	100	7	80
	" 21. - 30. 6.	-	-	88	-	90	-	88	-
	nach dem 30. 6.	-	-	5	-	-	-	5	-
Ruländer	bis 10. 6.	-	-	-	3	-	-	2	54
	vom 11. - 20. 6.	-	100	-	32	-	-	44	45
	" 21. - 30. 6.	-	-	-	64	-	-	53	1
	nach dem 30. 6.	-	-	-	1	-	-	1	-
Portugieser	bis 10. 6.	-	-	-	0	-	-	0	51
	vom 11. - 20. 6.	33	29	45	19	17	-	37	47
	" 21. - 30. 6.	33	71	53	80	83	-	61	1
	nach dem 30. 6.	34	-	2	1	-	-	2	1
Burgunder	bis 10. 6.	-	-	-	-	14	-	0	58
	vom 11. - 20. 6.	33	50	29	20	14	100	28	41
	" 21. - 30. 6.	33	50	62	79	72	-	65	1
	nach dem 30. 6.	34	-	9	1	-	-	7	-
Zahl der Meldungen mit Angaben über Beginn der Blüte									
Silvaner		3	26	376	199	79	3	686	
Riesling		4	31	459	205	29	3	731	
Müller-Thurgau		4	30	481	329	88	7	939	
Elbling		-	-	41	-	19	7	67	
Ruländer		-	2	-	155	-	7	164	
Portugieser		3	7	278	172	12	-	472	
Burgunder		3	2	58	77	7	1	148	

1) Ferner: Trollinger 72 Meldungen vom 11. - 20. Juni, 171 Meldungen vom 21. - 30. Juni. -
Limberger 12 Meldungen vom 11. - 20. Juni, 78 Meldungen vom 21. - 30. Juni. -

Durchschnittliche Dauer der Blüte
Juni 1967

Rebsorte	Dauer	Nordrhein- Westfalen	Hessen	Rheinland- Pfalz	Baden- Württem- berg ¹⁾	Bayern	Saar- land	Insgesamt	
								1967	1966
in % der Meldungen mit einschlägigen Angaben									
Silvaner	bis 4 Tage	-	9	11	18	10	-	12	10
	5 " 7 "	100	39	43	40	40	-	42	33
	8 " 10 "	-	43	39	32	38	100	38	43
	11 " 14 "	-	9	7	9	12	-	8	12
	15 Tage und mehr	-	-	-	1	-	-	0	2
Riesling	bis 4 Tage	-	7	8	17	26	-	11	8
	5 " 7 "	-	37	36	37	42	-	36	31
	8 " 10 "	-	49	44	34	16	100	41	46
	11 " 14 "	-	7	11	10	16	-	11	12
	15 Tage und mehr	-	-	1	2	-	-	1	3
Müller-Thurgau	bis 4 Tage	-	7	14	14	21	-	14	11
	5 " 7 "	100	37	44	44	37	-	44	35
	8 " 10 "	-	52	36	34	32	100	36	43
	11 " 14 "	-	4	6	7	10	-	6	9
	15 Tage und mehr	-	-	0	1	-	-	0	2
Elbling	bis 4 Tage	-	-	-	-	-	-	-	4
	5 " 7 "	-	-	9	-	14	-	9	22
	8 " 10 "	-	-	69	-	72	100	71	51
	11 " 14 Tage	-	-	22	-	14	-	20	20
	15 Tage und mehr	-	-	-	-	-	-	-	3
Ruländer	bis 4 Tage	-	-	-	17	-	-	14	7
	5 " 7 "	-	-	-	41	-	-	34	35
	8 " 10 "	-	100	-	35	-	-	46	46
	11 " 14 "	-	-	-	6	-	-	5	8
	15 Tage und mehr	-	-	-	1	-	-	1	4
Portugieser	bis 4 Tage	-	-	16	19	-	-	15	13
	5 " 7 "	100	-	48	41	66	-	45	34
	8 " 10 "	-	100	30	33	17	-	34	43
	11 " 14 "	-	-	4	7	17	-	5	9
	15 Tage und mehr	-	-	2	-	-	-	1	1
Burgunder	bis 4 Tage	-	-	15	18	-	100	14	12
	5 " 7 "	-	-	46	45	60	-	44	30
	8 " 10 "	-	100	36	35	-	-	38	45
	11 " 14 "	-	-	3	2	40	-	4	10
	15 Tage und mehr	-	-	-	-	-	-	-	3
Durchschnittliche Dauer der Blüte									
Silvaner		1	23	236	103	50	3	416	713
Riesling		-	27	273	120	19	3	442	751
Müller-Thurgau		1	27	328	202	62	7	627	894
Elbling		-	-	23	-	7	7	37	71
Ruländer		-	2	-	109	-	-	111	132
Portugieser		1	3	213	97	6	-	320	474
Burgunder		-	2	39	51	5	1	98	221

1) Ferner: Trollinger 2 Meldungen bis 10. Juni, 72 Meldungen vom 11. - 20. Juni, 171 Meldungen vom 21. - 30. Juni, 1 Meldung nach dem 30. Juni. -

Limberger 12 Meldungen vom 11. - 20. Juni, 78 Meldungen vom 21. - 30. Juni, 1 Meldung nach dem 30. Juni.

Stand der Reben 1967

Noten: 1 = sehr gut: mehr als 3/4 Herbst, 2 = gut: mehr als 1/2 bis 3/4 Herbst,
 3 = mittel: 1/2 Herbst, 4 = gering: 1/4 bis 1/2 Herbst, 5 = sehr gering:
 weniger als 1/4 Herbst.

Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Note	
	1967	
	Juni	Mai
<u>Nordrhein-Westfalen</u>	2,5	2,3
<u>Hessen</u>	2,0	2,0
RB Darmstadt (Bergstraße)	2,3	2,0
Wiesbaden (Rheingau)	2,0	2,0
<u>Rheinland-Pfalz</u>	2,1	2,2
Rheinland-Nassau	2,3	2,3
davon: Mittelrhein	2,4	2,3
Nahe (RB Koblenz)	2,1	2,0
Obermosel	3,0	2,7
Saar	2,5	2,4
Ruwer	2,4	2,5
Mittelmosel	2,1	2,3
Untermosel	2,4	2,6
Ahr	2,3	2,2
Lahn	2,8	3,2
Rheinhessen	2,0	2,0
davon: Worms und Umgegend	1,8	2,0
Oppenheim und Umgegend	2,0	1,8
Mainz und Umgegend	2,0	2,1
Ingelheim und Umgegend	2,1	2,2
Wiesbach	1,9	1,9
Bingen und Umgegend	2,1	2,2
Nahe (RB Rheinhessen)	1,9	1,9
Alzey und Umgegend	2,1	2,0
Pfalz	2,1	2,2
davon: Mittelhaardt	2,1	2,2
Oberhaardt	2,2	2,2
Unterhaardt mit Zellertal	1,9	1,9
Nahe (RB Pfalz)	2,5	2,7
<u>Baden-Württemberg</u>	2,2	2,1
<u>Nordwürttemberg</u>	2,4	2,3
davon: Oberes Neckartal	2,3	2,7
Unteres Neckartal	2,5	2,3
Remstal	2,1	2,1
Enztal	2,5	2,6
Zabergäu	2,4	2,3
Kocher- und Jagsttal	2,4	2,2
Taubergegend	2,9	2,6

Stand der Reben 1967

Noten: 1 = sehr gut: mehr als 3/4 Herbst, 2 = gut: mehr als 1/2 bis 3/4 Herbst,
 3 = mittel: 1/2 Herbst, 4 = gering: 1/4 bis 1/2 Herbst, 5 = sehr gering:
 weniger als 1/4 Herbst.

Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Note	
	1967	
	Juni	Mai
Nordbaden	2,2	2,2
davon: Tauber- und Maintal	2,4	2,2
Neckar- und Jagsttal	2,5	2,5
Bergstraße	2,1	2,2
Kraichgau	2,2	2,2
Pfinz-, Enz- und Albtal	2,5	2,4
Südbaden	2,1	2,0
davon: Seegegend	2,3	2,0
Oberes Rheintal	3,0	3,5
Markgräflerland	2,3	2,1
Kaiserstuhl	2,0	1,9
Breisgau	2,2	2,1
Ortenau und Bühlergegend	2,1	2,0
Südwestfalen-Hohenzollern	2,1	2,6
davon: Oberes Neckartal	2,0	2,6
Enztal	2,5	2,0
Bodenseegebiet	2,1	2,9
<u>Bayern</u>	2,4	2,4
RB Unterfranken	2,4	2,4
Mittelfranken	2,8	2,3
Schwaben	3,0	3,0
Oberpfalz	.	2,0
Niederbayern	2,0	.
<u>Saarland</u>	1,7	1,5
<u>Bundesgebiet</u> ¹⁾	2,1	2,2
1966	2,3	2,4
1965	2,1	2,1
1964	1,8	2,0
1963	2,5	2,9
1962	2,3	2,4
1961	2,4	2,4
1960	1,9	2,1
1959	2,2	2,3
1958	2,1	2,1
1957	3,0	3,2
1956	3,8	3,9
1955	2,7	2,7
1954	2,4	2,5
1953	3,0	3,0
1952	2,4	2,3
1951	2,1	2,1
1950	2,1	2,1

1) Länder mit Weinbau, 1959 und früher ohne Saarland. -