

STATISTISCHES  
BUNDESAMT  
WIESBADEN

FACHSERIE **B**

# LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI

Reihe 2

Gartenbau und Weinwirtschaft

III. Weinwirtschaft

Vorschätzung der Weinmosternte

Oktober 1967



Bestellnummer : B 2/III - 6/67

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ



## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Textliche Erläuterungen (mit Tabellen) . . . . .	4
Beginn der Lese . . . . .	7
Vorschätzung der Weinmosternte 1967	
a) Rebflächen, Hektarerträge, Mostmengen, Güte des Mostes . . . . .	8
b) Mostgewicht, Säuregehalt . . . . .	20

Die letzte Darstellung der Methoden dieser Statistik ist in  
"Statistik der Bundesrepublik Deutschland", Band 206, erschienen.

Erschienen im November 1967

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis DM 0,50

Ergebnisse für die einzelnen Länder werden in den "Statistischen  
Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer  
C II 4 veröffentlicht.

Die Vorschätzung des Hektarertrages ergab für den Weinmost insgesamt eine sehr geringfügige Verminderung gegenüber der Vorschätzung vom September, die besonders durch den Weißmost bedingt ist. Trotzdem ist der vorläufige Hektarertrag bemerkenswert hoch und wird seit 1950 nur von den endgültigen Ergebnissen für 1964, 1960 und - kaum nennenswert - für 1963 übertroffen. Der Unterschied zwischen den Vorschätzungen für den Weißmost und für den Rotmost ist mit etwa 2 % des Gesamtergebnisses recht klein.

Die voraussichtliche Mostmenge ist auf Grund der neuen Ermittlung mit 6,13 Mill. hl anzunehmen gegenüber 6,18 Mill. hl nach der Vorschätzung von Ende September.

Die Beurteilung der Qualität ergab vorläufig, daß ein wenig mehr als die Hälfte der Mostmenge als sehr gut oder gut eingestuft wurde. Das ist an sich ein durchaus beachtlicher Anteil. Er war jedoch in den vorhergehenden zehn Jahren nur dreimal niedriger und bleibt daher für 1967 unter dem Durchschnitt.

Das durchschnittliche Mostgewicht ist vorläufig für Weißmost und Rotmost gleich, was selten vorkommt. Höhere durchschnittliche Mostgewichte wurden seit 1955 beim Weißmost viermal und beim Rotmost dreimal ausgewiesen. Der durchschnittliche Säuregehalt deutet auf einen gewissen Anteil verbesserungsbedürftiger Moste hin. Zwischen Weißmost und Rotmost besteht ein Unterschied etwa üblicher Größe. Eine Gegenüberstellung der Ergebnisse bei "Güte des Mostes", "durchschnittlichem Mostgewicht" und "durchschnittlichem Säuregehalt" seit 1950 enthält die nachfolgende Übersicht.

Beurteilung des Weinmostes 1950 - 1967<sup>1)</sup>

Jahr	Güte des Mostes Weinmost insgesamt					Ø Mostgewicht		Ø Säuregehalt	
	sehr gut	gut	mittel	gering	sehr gering	Weiß	Rot	Weiß	Rot
	in % der Mostmenge					Grad Oechsle		Promille	
1950	9	41	39	10	1	.	.	.	.
1951	10	45	35	9	1	75	71	10,7	9,2
1952	19	47	29	5	0	80	81	9,5	8,9
1953	38	44	15	3	0	88	84	8,1	7,5
1954	1	18	49	27	5	.	.	12,7	10,3
1955	3	27	49	19	2	69	65	12,2	11,3
1956	1	17	43	30	9	62	66	13,6	11,2
1957	6	37	46	10	1	69	68	13,0	12,3
1958	12	43	36	8	1	69	68	11,2	9,7
1959	68	27	4	1	-	92	85	7,4	6,6
1960	6	35	45	12	2	68	66	9,8	9,3
1961	13	46	34	7	0	73	70	9,3	7,8
1962	14	46	30	9	1	74	72	10,8	9,5
1963	8	36	41	13	2	69	72	10,5	9,0
1964	23	49	24	4	0	78	75	7,1	6,2
1965	1	14	44	32	9	61	61	13,7	12,6
1966 <sup>2)</sup>	21	52	24	3	0	77	75	8,6	8,3
1967 <sup>2)</sup>	12	41	37	9	1	73	73	10,8	9,5

1) Bundesgebiet.- 2) Vorläufig

Der vorliegende Bericht umfaßt abweichend von den übrigen Berichten im Laufe des Jahres nur drei Wochen (25. September bis 15. Oktober). Er zeigt in seinen Angaben über die Witterungsverhältnisse eine beachtliche Verbesserung gegenüber den vorhergehenden Feststellungen von Ende September. Die Hälfte der Berichtersteller beurteilte die Witterung als gut für die Reben und Trauben, ein fast doppelt so hoher Anteil wie nach dem letzten Bericht. Entsprechend ging der Anteil einer Bewertung der Niederschläge als zu hoch und des Temperaturverlaufes als ungünstig gegenüber dem September auf etwa die Hälfte zurück. Jedoch ist dazu anzumerken, daß die eingetretenen Schäden durch die Wetterbesserung nicht rückgängig gemacht werden konnten.

Allgemeine Angaben über die Witterung  
in % der entsprechenden Meldungen

Berichtsgegenstand	Nordrh.- Westf.	Hessen	Rheinld.- Pfalz	Baden- Württemb.	Bayern	Saar- land	Bundesgebiet 1)		
							Oktober	September	Oktober
							1967	1966	1966
<b>Besondere Wetterschäden</b>									
keine	75	76	80	92	85	100	86	77	100
schwache	-	12	9	5	8	-	7	11	0
mittlere	25	6	8	2	6	-	5	7	0
starke	-	6	3	1	1	-	2	5	-
<b>Witterung für die Reben und Trauben</b>									
schlecht	25	15	20	3	5	-	11	20	-
mittel	50	50	55	25	26	71	39	53	6
gut	25	35	25	72	69	29	50	27	94
<b>Niederschläge</b>									
zu gering	-	3	-	2	3	-	1	1	36
ausreichend	50	53	62	89	86	100	77	58	64
zu hoch	50	44	38	9	11	-	22	41	-
<b>Temperaturverlauf</b>									
ungünstig	25	21	25	6	6	-	14	37	-
normal	75	38	55	35	33	14	44	47	7
günstig	-	41	20	59	61	86	42	16	93
<b>Sonnenscheindauer</b>									
zu gering	25	12	30	8	8	57	18	48	0
genügend	75	62	59	59	57	43	59	47	25
reichlich	-	26	11	33	35	-	23	5	75

1) Länder mit Weinbau

Der Beginn der Lese lag recht früh mit außergewöhnlich geringen Anteilen eines späten und sehr späten Lesebeginnes bei allen erfaßten Rebsorten. Besonders beim Müller-Thurgau und ähnlich beim Portugieser treten die frühesten Termine überaus stark hervor. Angaben über das Ende der Lese gehören nicht zum Programm des Oktober-Berichtes. In diesem Jahr dürfte es aber an sich möglich gewesen sein, bereits in erheblichem Umfange über das Ende der Lese Angaben zu machen.

Vorschätzung der Weinmosternte 1967  
Mostgewicht und Säuregehalt

Berichtsgegenstand	Nordrh.- Westf.	Hessen	Rheinld.- Pfalz	Baden- Württbg.	Bayern	Saar- land	Bundesgebiet <sup>1)</sup>		
							Oktober	Oktober	November
							1967		
Weißmost									
Ertrag hl je ha	60,5	61,0	93,1	85,7	50,4	92,1	88,5	66,9	70,1
Mostmenge in 1 000 hl	1,5	195,3	4 083,7	766,1	112,3	6,3	5 165,3	3 873,4	4 060,8
davon in % mit einem									
Mostgewicht nach Oechsle									
90° und mehr	1	5	5	2	15	-	5	5	6
80° bis unter 90°	62	24	15	32	40	2	18	35	31
70° " " 80°	37	50	32	57	36	11	36	45	43
60° " " 70°	-	20	37	9	8	74	32	13	18
weniger als 60°	-	1	11	0	1	13	9	2	2
Durchschnittl. Mostgewicht									
in Graden nach Oechsle	80	76	72	76	80	61	73	-	-
Oktober 1966	79	79	78	77	78	68	-	78	-
November 1966	77	80	77	76	78	64	-	-	77
Durchschnittl. Säuregehalt									
in von Tausend (‰)	9,5	11,1	11,2	9,1	8,4	14,0	10,8	-	-
Oktober 1966	6,7	9,0	9,0	8,6	7,2	10,0	-	8,9	-
November 1966	8,4	8,5	8,7	8,4	7,2	11,0	-	-	8,6
Rotmost									
Ertrag hl je ha	32,5	45,5	98,0	77,8	51,2	150,0	86,3	67,3	66,5
Mostmenge in 1 000 hl	0,1	2,8	471,0	484,3	1,5	0,0	959,8	617,3	608,6
davon in % mit einem									
Mostgewicht nach Oechsle									
90° und mehr	6	9	1	12	25	-	7	4	2
80° bis unter 90°	37	13	6	31	39	-	19	27	24
70° " " 80°	57	61	34	47	32	100	40	49	53
60° " " 70°	-	11	52	9	4	-	30	17	20
weniger als 60°	-	6	7	1	-	-	4	3	1
Durchschnittl. Mostgewicht									
in Graden nach Oechsle	75	75	69	77	81	72	73	-	-
Oktober 1966	70	84	73	78	81	89	-	75	-
November 1966	74	83	74	77	79	89	-	-	75
Durchschnittl. Säuregehalt									
in von Tausend (‰)	10,7	11,1	9,1	9,9	10,0	8,0	9,5	-	-
Oktober 1966	7,0	9,7	8,3	8,8	8,2	7,0	-	8,5	-
November 1966	7,4	8,9	8,1	8,5	8,7	7,0	-	-	8,3

1) Länder mit Weinbau

Beginn der Lese  
in % der entsprechenden Meldung

Rebsorten Länder mit Weinbau	vor dem 1. Okt.	1. bis 10. Okt.	11. bis 20. Okt.	nach dem 20. Okt.	Rebsorten Länder mit Weinbau	vor dem 1. Okt.	1. bis 10. Okt.	11. bis 20. Okt.	nach dem 20. Okt.
<u>Weißes Gewächs</u>									
<u>Silvaner</u>					<u>Gutedel</u>				
Nordrhein-Westfalen	-	-	100	-	Baden-Württemberg	11	62	27	-
Hessen	12	85	3	-	<u>Ruländer</u>				
Rheinland-Pfalz	10	88	2	-	Baden-Württemberg	8	52	38	2
Baden-Württemberg	6	38	53	3	Saarland	-	100	-	-
Bayern	10	66	22	2	<u>Rotes Gewächs</u>				
Saarland	-	100	-	-	<u>Portugieser</u>				
Bundesgebiet 1967	9	67	23	1	Nordrhein-Westfalen	-	100	-	-
1966	0	38	46	16	Hessen	71	29	-	-
1965	-	-	4	96	Rheinland-Pfalz	96	4	0	-
1964	11	49	37	3	Baden-Württemberg	23	65	11	1
1963	1	33	49	17	Bayern	60	40	-	-
1962	-	7	34	59	Saarland	-	-	-	-
<u>Riesling</u>					Bundesgebiet 1967	62	33	5	0
Nordrhein-Westfalen	-	-	100	-	1966	36	33	29	2
Hessen	-	94	6	-	1965	-	7	34	59
Rheinland-Pfalz	5	56	31	8	1964	54	40	5	1
Baden-Württemberg	6	28	57	9	1963	31	44	20	5
Bayern	-	58	25	17	1962	2	53	36	9
Saarland	-	100	-	-	<u>Burgunder</u>				
Bundesgebiet 1967	5	48	39	8	Nordrhein-Westfalen	-	100	-	-
1966	0	24	46	30	Hessen	50	50	-	-
1965	-	-	2	98	Rheinland-Pfalz	69	31	-	-
1964	6	29	52	13	Baden-Württemberg	7	59	32	2
1963	0	16	34	50	Bayern	86	14	-	-
1962	-	4	22	74	Saarland	100	-	-	-
<u>Müller-Thurgau</u>					Bundesgebiet 1967	16	55	28	1
Nordrhein-Westfalen	50	50	-	-	1966	6	40	51	3
Hessen	84	16	-	-	1965	-	2	15	83
Rheinland-Pfalz	88	12	0	0	1964	13	54	31	2
Baden-Württemberg	57	38	4	1	1963	12	38	27	23
Bayern	57	41	1	1	1962	2	18	50	30
Saarland	100	-	-	-	<u>Schwarzriesling</u>				
Bundesgebiet 1967	70	27	2	1	Baden-Württemberg	7	68	24	1
1966	27	51	21	1	<u>Trollinger</u>				
1965	-	1	40	59	Baden-Württemberg	3	25	65	7
1964	37	55	7	1	<u>Limberger</u>				
1963	22	67	10	1	Baden-Württemberg	4	34	59	3
1962	-	36	48	16					
<u>Elbling</u>									
Hessen	-	100	-	-					
Rheinland-Pfalz	15	81	4	-					
Baden-Württemberg	-	-	-	-					
Bayern	-	-	-	-					
Saarland	-	100	-	-					
Bundesgebiet 1967	12	85	3	-					
1966	-	57	38	5					
1965	-	-	9	91					
1964	49	46	5	-					
1963	4	56	38	2					
1962	-	6	52	42					

Vorschätzung der  
Rebflächen, Hektarerträge,

Lfd. Nr.	Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Jahr	Weinmost		
			Im Ertrag stehende Rebfläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge
			ha	hl	
			1	2	3
1	<u>Nordrhein-Westfalen</u>	1967	27	58,4	1 578
2		1966	29	48,1	1 396
3	<u>Hessen</u>	1967	3 267	60,6	198 107
4		1966	3 309	64,4	213 124
5	RB Wiesbaden	1967	3 057	59,8	182 765
6	RB Darmstadt	1967	210	73,1	15 342
7	<u>Rheinland-Pfalz</u>	1967	48 675	93,6	4 554 720
8		1966	48 145	71,8	3 457 050
9	Rheinland-Nassau	1967	14 509	86,8	1 258 988
10	davon Mittelrhein	1967	985	62,3	61 330
11	Nahe (RB Koblenz)	1967	3 033	82,7	250 710
12	Obermosel	1967	794	85,6	67 966
13	Saar	1967	1 023	76,3	78 055
14	Ruwer	1967	302	90,3	27 271
15	Mittelmosel	1967	5 140	95,9	492 900
16	Untermosel	1967	2 685	89,7	240 845
17	Ahr	1967	534	73,4	39 206
18	Lahn	1967	13	54,2	705
19	Rheinhessen	1967	16 229	91,2	1 480 310
20	davon Worms u. Umgegend	1967	4 864	95,7	465 261
21	Oppenheim u. U.	1967	1 368	90,8	124 242
22	Mainz u. U.	1967	1 063	78,9	83 894
23	Ingelheim u. U.	1967	1 357	78,9	107 032
24	Wiesbach	1967	1 761	95,5	168 226
25	Bingen u. U.	1967	352	77,7	27 336
26	Nahe (RB Rheinl.)	1967	649	77,6	50 366
27	Alzey u. U.	1967	4 815	94,3	453 953
28	Pfalz	1967	17 937	101,2	1 815 422
29	davon Mittelhaardt	1967	5 612	93,8	526 538
30	Oberhaardt	1967	9 697	108,4	1 051 625
31	Unterhaardt	1967	2 096	94,4	197 850
32	Nahe (RB Pfalz)	1967	532	74,1	39 409

Weinmosternte 1967

Mostmengen, Güte des Mostes

insgesamt					Lfd. Nr.
Güte des Mostes					
sehr gut	gut	mittel	gering	sehr gering	
4	5	6	7	8	
-	78	22	-	-	1
5	62	26	7	-	2
15	46	34	5	-	3
17	55	24	4	0	4
14	45	36	5	-	5
27	54	18	1	-	6
10	37	41	11	1	7
21	52	24	3	0	8
6	33	44	15	2	9
6	30	38	22	4	10
9	37	45	8	1	11
-	20	68	12	0	12
2	40	34	22	2	13
6	26	39	25	4	14
7	31	41	18	3	15
4	36	42	15	3	16
5	34	59	2	-	17
-	20	59	21	-	18
10	43	40	7	0	19
13	38	43	6	0	20
14	39	30	17	-	21
12	71	16	1	-	22
7	52	38	3	-	23
7	43	42	7	1	24
24	61	15	-	-	25
22	48	28	2	-	26
6	41	45	8	0	27
11	36	40	12	1	28
23	43	26	7	1	29
6	32	47	14	1	30
10	39	42	9	0	31
12	25	37	21	5	32



Weinmostennte 1967

Mostmengen, Güte des Mostes

insgesamt					Lfd. Nr.
Güte des Mostes					
sehr gut	gut	mittel	gering	sehr gering	
% der Mostmenge					
4	5	6	7	8	
18	53	25	3	1	33
20	54	23	3	0	34
18	60	21	1	0	35
-	43	42	15	-	36
18	62	18	2	-	37
29	45	23	3	-	38
9	68	22	1	0	39
14	60	25	1	-	40
10	61	28	1	-	41
32	43	23	2	0	42
18	51	25	5	1	43
15	60	23	2	-	44
16	50	34	-	-	45
27	46	24	2	1	46
12	54	27	7	0	47
4	56	27	12	1	48
19	47	28	5	1	49
15	40	33	12	-	50
-	47	36	17	-	51
14	64	20	2	-	52
21	40	30	7	2	53
14	46	37	2	1	54
27	49	22	2	-	55
1	59	37	3	-	56
2	68	30	-	-	57
-	-	82	18	-	58
-	68	32	-	-	59
22	48	27	3	0	60
19	53	26	2	0	61
22	48	27	3	0	62
24	50	25	1	-	63
-	-	100	-	-	64
-	28	53	19	-	65
11	68	21	-	-	66
12	41	37	9	1	67
22	55	21	2	0	68
21	52	24	3	0	69
14	40	33	11	2	70

Vorschätzung der  
Rebflächen, Hektarerträge,

Lfd. Nr.	Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Jahr	Weiß		
			Im Ertrag stehende Rebfläche	Ertrag je Hektar	Ernté- menge
			ha	hl	
			9	10	11
1	<u>Nordrhein-Westfalen</u>	1967	25	60,5	1 513
2		1966	27	49,2	1 328
3	<u>Hessen</u>	1967	3 205	61,0	195 285
4		1966	3 245	64,9	210 587
5	RB Wiesbaden	1967	2 997	60,1	180 063
6	RB Darmstadt	1967	208	73,2	15 222
7	<u>Rheinland-Pfalz</u>	1967	43 868	93,1	4 083 720
8		1966	43 255	71,6	3 098 195
9	Rheinland-Nassau	1967	14 155	87,2	1 234 075
10	davon Mittelrhein	1967	970	62,3	60 431
11	Nahe (RB Koblenz)	1967	3 013	82,6	248 874
12	Obermosel	1967	794	85,6	67 966
13	Saar	1967	1 023	76,3	78 055
14	Ruwer	1967	302	90,3	27 271
15	Mittelmosel	1967	5 139	95,9	492 830
16	Untermosel	1967	2 685	89,7	240 845
17	Ahr	1967	217	79,0	17 143
18	Lahn	1967	12	55,0	660
19	Rheinhessen	1967	14 894	91,4	1 360 581
20	davon Worms u. Umgegend	1967	4 454	95,3	424 466
21	Oppenheim u. U.	1967	1 362	91,0	123 942
22	Mainz u. U.	1967	959	79,0	75 761
23	Ingelheim u. U.	1967	1 003	80,1	80 340
24	Wiesbach	1967	1 610	94,8	152 628
25	Bingen u. U.	1967	332	78,0	25 896
26	Nahe (RB Rheinl.)	1967	613	77,4	47 446
27	Alzey u. U.	1967	4 561	94,3	430 102
28	<u>Pfalz</u>	1967	14 819	100,5	1 489 064
29	davon Mittelhaardt	1967	4 000	89,4	357 600
30	Oberhaardt	1967	8 944	108,2	967 741
31	Unterhaardt	1967	1 347	92,5	124 598
32	Nahe (RB Pfalz)	1967	528	74,1	39 125

Weinmosternte 1967

Mostmengen, Güte des Mostes

most					Lfd. Nr.
Güte des Mostes					
sehr gut	gut	mittel	gering	sehr gering	
% der Mostmenge					
12	13	14	15	16	
-	79	21	-	-	1
5	63	24	8	-	2
15	46	34	5	-	3
17	55	24	4	0	4
14	45	36	5	-	5
27	54	18	1	-	6
10	37	41	11	1	7
22	52	23	3	0	8
6	33	43	16	2	9
6	30	38	22	4	10
9	37	45	8	1	11
-	20	68	12	0	12
2	40	34	22	2	13
6	26	39	25	4	14
7	31	41	18	3	15
4	36	42	15	3	16
2	36	62	-	-	17
-	20	60	20	-	18
11	43	39	7	0	19
14	39	42	5	0	20
14	39	30	17	-	21
13	71	15	1	-	22
6	49	42	3	-	23
8	44	40	7	1	24
25	60	15	-	-	25
21	49	28	2	-	26
6	41	45	8	0	27
13	33	40	13	1	28
30	37	23	8	2	29
6	31	47	15	1	30
14	44	35	7	0	31
12	25	37	21	5	32

Vorschätzung der  
Rebflächen, Hektarerträge,

Lfd. Nr.	Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Jahr	Weiß		
			Im Ertrag stehende Rebfläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge
			ha	hl	
			9	10	11
33	<u>Baden-Württemberg</u>	1967	8 941	85,7	766 148
34		1966	9 100	70,3	639 403
35	Nordwürttemberg	1967	2 324	72,8	169 243
36	davon Oberes Neckartal	1967	40	49,4	1 974
37	Unteres Neckartal	1967	1 188	70,1	83 328
38	Remstal	1967	319	66,4	21 185
39	Enztal	1967	89	65,2	5 807
40	Zabergäu	1967	267	83,1	22 200
41	Kocher- und Jagsttal	1967	307	87,2	26 785
42	Tauber- und Jagsttal	1967	114	69,9	7 964
43	Nordbaden	1967	1 325	74,2	98 314
44	davon Tauber- und Maintal	1967	268	55,8	14 964
45	Neckar- und Jagsttal	1967	23	63,2	1 454
46	Bergstraße	1967	433	87,8	38 040
47	Kraichgau	1967	519	71,8	37 289
48	Pfinz-, Enz- und Albtal	1967	82	80,5	6 597
49	Südbaden	1967	5 278	94,3	497 833
50	davon See- und Oberrhein	1967	72	79,2	5 702
51	Oberes Rheintal	1967	4	95,8	383
52	Markgräflerland	1967	1 293	87,3	112 854
53	Kaiserstuhl	1967	1 800	111,9	201 490
54	Breisgau	1967	1 155	85,1	98 286
55	Ortenau und Bühler- und Oberrhein	1967	954	82,9	79 118
56	Südwürttemberg-Hohenzollern	1967	14	54,1	758
57	davon Oberes Neckartal	1967	9	48,9	440
58	Enztal	1967	-	-	-
59	Bodenseegebiet	1967	5	63,6	318
60	<u>Bayern</u>	1967	2 227	50,4	112 325
61		1966	2 224	46,4	103 103
62	RB Unterfranken	1967	1 999	51,8	103 548
63	RB Mittelfranken	1967	224	38,2	8 557
64	Übrige Gebiete	1967	4	55,0	220
65	<u>Saarland</u>	1967	69	92,1	6 351
66		1966	67	122,9	8 229
67	<u>Bundesgebiet</u>	1967	58 335	88,5	5 165 342
68		Oktober 1966	57 918	66,9	3 873 355
69		November 1966	57 918	70,1	4 060 845
70		D1961-66	56 560	75,2	4 251 438

Weinmosternte 1967

Mostmengen, Güte des Mostes

most						Lfd. Nr.
Güte des Mostes						
sehr gut	gut	mittel	gering	sehr gering		
12	13	14	15	16		
17	51	28	3	1	33	
19	54	24	3	0	34	
18	59	22	1	0	35	
-	44	46	10	-	36	
17	61	20	2	-	37	
17	60	21	2	-	38	
16	60	23	1	0	39	
20	52	26	2	-	40	
13	60	27	0	-	41	
34	43	22	1	-	42	
20	53	22	4	1	43	
15	62	21	2	-	44	
29	51	20	-	-	45	
32	46	18	3	1	46	
13	53	28	6	0	47	
2	68	19	11	0	48	
17	48	30	4	1	49	
12	46	34	8	-	50	
-	50	48	2	-	51	
14	64	20	2	-	52	
19	39	33	7	2	53	
9	46	41	3	1	54	
26	49	24	1	-	55	
-	69	31	-	-	56	
-	73	27	-	-	57	
-	-	-	-	-	58	
-	63	37	-	-	59	
22	48	27	3	0	60	
19	53	26	2	0	61	
22	48	27	3	0	62	
24	50	25	1	-	63	
-	-	100	-	-	64	
-	28	53	19	-	65	
11	68	21	-	-	66	
11	40	39	9	1	67	
21	55	21	3	0	68	
21	53	23	3	0	69	
14	40	33	11	2	70	

Vorschätzung der  
Rebflächen, Hektarerträge,

Lfd. Nr.	Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Jahr	Rot		
			Im Ertrag stehende Rebfläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge
			ha	hl	
			17	18	19
1	<u>Nordrhein-Westfalen</u>	1967	2	32,5	65
2		1966	2	34,0	68
3	<u>Hessen</u>	1967	62	45,5	2 822
4		1966	64	39,6	2 537
5	RB Wiesbaden	1967	60	45,0	2 702
6	RB Darmstadt	1967	2	60,0	120
7	<u>Rheinland-Pfalz</u>	1967	4 807	98,0	471 000
8		1966	4 890	73,4	358 855
9					
9	Rheinland-Nassau	1967	354	70,4	24 913
10	davon Mittelrhein	1967	15	59,9	899
11	Nahe (RB Koblenz)	1967	20	91,8	1 836
12	Obermosel	1967	0	.	.
13	Saar	1967	0	.	.
14	Ruwer	1967	0	.	.
15	Mittelmosel	1967	1	70,4	70
16	Untermosel	1967	0	.	.
17	Ahr	1967	317	69,6	22 063
18	Lahn	1967	1	45,0	45
19	Rheinhessen	1967	1 335	89,7	119 729
20	davon Worms u. Umgegend	1967	410	99,5	40 795
21	Oppenheim u. U.	1967	6	50,0	300
22	Mainz u. U.	1967	104	78,2	8 133
23	Ingelheim u. U.	1967	354	75,4	26 692
24	Wiesbach	1967	151	103,3	15 598
25	Bingen u. U.	1967	20	72,0	1 440
26	Nahe (RB Rheinh.)	1967	36	81,1	2 920
27	Alzey u. U.	1967	254	93,9	23 851
28	Pfalz	1967	3 118	104,7	326 358
29	davon Mittelhaardt	1967	1 612	104,8	168 938
30	Oberhaardt	1967	753	111,4	83 884
31	Unterhaardt	1967	749	97,8	73 252
32	Nahe (RB Pfalz)	1967	4	71,0	284

Weinmosternte 1967

Mostmengen, Güte des Mostes

most					Lfd. Nr.
Güte des Mostes					
sehr gut	gut	mittel	gering	sehr gering	
% der Mostmenge					
20	21	22	23	24	
-	45	55	-	-	1
-	50	50	-	-	2
31	45	12	12	-	3
42	47	11	-	-	4
32	43	13	12	-	5
-	100	-	-	-	6
5	44	42	8	1	7
21	52	26	1	0	8
6	34	56	4	0	9
-	56	30	14	-	10
-	37	57	4	2	11
.	.	.	.	.	12
.	.	.	.	.	13
.	.	.	.	.	14
.	.	.	.	.	15
.	.	.	.	.	16
7	33	57	3	-	17
-	20	50	30	-	18
5	40	44	11	0	19
1	26	49	23	1	20
30	70	-	-	-	21
0	73	21	6	-	22
10	62	26	2	-	23
1	29	67	2	1	24
10	70	20	-	-	25
43	36	21	-	-	26
6	32	53	9	-	27
5	47	41	7	0	28
7	57	31	5	0	29
4	40	48	7	1	30
3	31	54	11	1	31
-	-	20	80	-	32

Vorschätzung der  
Rebflächen, Hektarerträge,

Lfd. Nr.	Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Jahr	Rot		
			Im Ertrag stehende Rebfläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge
			ha	hl	
			17	18	19
33	<u>Baden-Württemberg</u>	1967	6 224	77,8	484 322
34		1966	6 264	61,6	386 048
35	Nordwürttemberg	1967	4 030	79,7	321 174
36	davon Oberes Neckartal	1967	7	25,1	176
37	Unteres Neckartal	1967	2 373	80,1	190 134
38	Remstal	1967	363	76,0	27 604
39	Enztal	1967	484	78,5	37 977
40	Zabergäu	1967	622	83,8	52 124
41	Kocher- und Jagsttal	1967	158	77,3	12 213
42	Tauber- und Jagsttal	1967	23	41,1	946
43	Nordbaden	1967	537	69,1	37 104
44	davon Tauber- und Maintal	1967	25	39,0	974
45	Neckar- und Jagsttal	1967	20	61,9	1 238
46	Bergstraße	1967	189	86,0	16 247
47	Kraichgau	1967	228	58,0	13 224
48	Pfinz-, Enz- und Albtal	1967	75	72,3	5 421
49	Südbaden	1967	1 622	76,4	124 001
51	davon See- und Oberrhein- gegend	1967	60	73,4	4 403
51	Oberes Rheintal	1967	18	39,8	716
52	Markgräflerland	1967	80	69,3	5 541
53	Kaiserstuhl	1967	738	90,1	66 461
54	Breisgau	1967	310	60,3	18 694
55	Ortenau und Bühler- gegend	1967	416	67,8	28 186
56	Südwestfalen-Hohenzollern	1967	35	58,4	2 043
57	davon Oberes Neckartal	1967	28	58,6	1 641
58	Enztal	1967	6	58,7	352
59	Bodenseegebiet	1967	1	50,0	50
60	<u>Bayern</u>	1967	30	51,2	1 536
61		1966	28	35,5	994
62	RB Unterfranken	1967	30	51,2	1 536
63	RB Mittelfranken	1967	-	-	-
64	Übrige Gebiete	1967	-	-	-
65	<u>Saarland</u>	1967	0	150,0	21
66		1966	0	80,0	11
67	<u>Bundesgebiet</u>	1967	11 125	86,3	959 766
68		Oktober 1966	11 248	67,3	756 844
69		November 1966	11 248	66,5	748 513
70		D1961-66	11 501	73,3	843 016

1) Einschl. Most aus gemischten Beständen

Wainmosternte 1967

Mostmengen, Güte des Mostes

1) most					Lfd. Nr.
Güte des Mostes					
sehr gut	gut	mittel	gering	sehr gering	
% der Mostmenge					
20	21	22	23	24	
20	56	21	3	0	33
22	54	22	2	0	34
17	61	20	2	0	35
-	32	-	68	-	36
19	63	17	1	-	37
37	35	24	4	-	38
8	69	22	1	-	39
12	64	24	0	-	40
4	64	31	1	-	41
13	43	32	8	4	42
12	47	34	6	1	43
9	26	61	4	-	44
2	49	49	-	-	45
17	43	37	2	1	46
10	55	25	10	-	47
6	42	38	13	1	48
29	45	19	5	2	49
17	33	33	17	-	50
-	45	30	25	-	51
31	56	12	1	-	52
28	42	21	6	3	53
36	48	15	1	-	54
28	49	17	6	-	55
2	56	39	3	-	56
2	67	31	-	-	57
-	-	82	18	-	58
-	100	-	-	-	59
24	45	31	0	-	60
7	44	45	4	-	61
24	45	31	0	-	62
-	-	-	-	-	63
-	-	-	-	-	64
-	100	-	-	-	65
100	-	-	-	-	66
13	50	31	5	1	67
22	52	24	2	-	68
22	53	24	1	0	69
14	41	34	9	2	70

Lfd. Nr.	Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Weißmost						
		Mostgewicht nach Oechsle					Ø Most- gewicht	Ø Säure- gehalt
		Anteil des Mostertrages mit						
		weniger als 60°	60° bis unter 70°	70° bis unter 80°	80° bis unter 90°	90° und mehr	Grad	‰
		%						
1	Nordrhein-Westfalen	-	-	37	62	1	80	9,5
2	Hessen	1	20	50	24	5	76	11,1
3	RB Wiesbaden	1	21	48	24	6	76	11,1
4	RB Darmstadt	0	10	74	16	-	74	10,9
5	Rheinland-Pfalz	11	37	32	15	5	72	11,2
6	Rheinland-Nassau	21	38	27	11	3	69	13,2
7	Mittelrhein	14	49	28	9	0	68	13,4
8	Nahe (RB Koblenz)	7	36	30	19	8	74	10,8
9	Obermosel	77	21	2	-	-	58	14,1
10	Saar	10	42	44	4	-	69	13,3
11	Ruwer	14	24	32	24	6	73	15,3
12	Mittelmosel	22	35	29	11	3	69	13,6
13	Untermosel	27	44	22	6	1	66	14,2
14	Ahr	4	70	26	-	-	67	10,9
15	Lahn	-	60	40	-	-	68	13,3
16	Rheinhessen	2	34	41	17	6	74	9,6
17	Worms u. U.	1	25	40	25	9	77	9,1
18	Oppenheim u. U.	-	19	49	22	10	77	8,3
19	Mainz u. U.	-	7	65	21	7	78	9,2
20	Ingelheim u. U.	2	35	49	11	3	73	9,5
21	Wiesbach	6	47	31	13	3	69	10,8
22	Bingen u. U.	-	10	48	32	10	79	11,4
23	Nahe (RB Rheinl.)	1	38	51	8	2	72	10,1
24	Alzey u. U.	3	49	37	9	2	69	10,0
25	Pfalz	11	38	27	17	7	72	11,1
26	Mittelhardt	2	12	33	37	16	77	10,3
27	Oberhardt	15	49	24	9	3	69	11,4
28	Unterhardt m.Z.	4	24	40	21	11	76	10,4
29	Nahe (RB Pfalz)	22	51	22	4	1	66	11,8

mosternte 1967  
 Säuregehalt

Rotmost							Lfd. Nr.
Mostgewicht nach Oechsle					Ø Most- gewicht	Ø Säure- gehalt	
Anteil des Mostertrages mit							
weniger als 60°	60° bis unter 70°	70° bis unter 80°	80° bis unter 90°	90° und mehr	Grad	‰	
-	-	57	37	6	75	10,7	1
6	11	61	13	9	75	11,1	2
6	11	60	13	10	75	11,1	3
-	-	100	-	-	77	12,0	4
7	52	34	6	1	69	9,1	5
4	49	33	12	2	69	11,6	6
14	36	50	-	-	69	10,8	7
2	12	58	23	5	77	10,5	8
-	-	-	-	-	-	-	9
-	-	-	-	-	-	-	10
-	-	-	-	-	-	-	11
.	.	.	.	.	.	.	12
-	-	-	-	-	-	-	13
4	53	30	11	2	69	11,7	14
-	70	30	-	-	68	11,6	15
3	48	42	5	2	70	8,9	16
4	65	25	5	1	68	9,1	17
-	-	-	65	35	89	.	18
4	29	65	2	-	72	9,0	19
2	22	60	10	6	75	9,1	20
4	34	60	2	-	71	8,3	21
-	50	50	-	-	70	9,1	22
1	57	35	7	-	70	8,6	23
2	66	32	0	-	68	8,9	24
9	53	32	6	0	69	8,9	25
7	56	32	5	0	69	8,7	26
14	64	16	6	-	66	9,3	27
6	35	50	8	1	71	9,1	28
-	80	20	-	-	67	9,3	29



mosternte 1967  
Säuregehalt

Rotmost								Lfd.- Nr.
Mostgewicht nach Oechsle					Ø Most- gewicht	Ø Säure- gehalt		
Anteil des Mostertrages mit								
weniger als 60°	60° bis unter 70°	70° bis unter 80°	80° bis unter 90°	90° und mehr	Grad	‰		
1	9	47	31	12	77	9,9	30	
-	12	69	18	1	74	10,0	31	
-	-	100	-	-	73	9,2	32	
-	10	69	21	-	75	10,1	33	
-	15	77	8	-	76	11,8	34	
-	12	88	-	-	72	10,3	35	
-	26	63	11	-	73	9,0	36	
-	-	59	41	-	77	8,6	37	
-	20	40	20	20	75	8,6	38	
1	21	57	16	5	72	9,6	39	
-	14	14	58	14	78	8,8	40	
-	20	80	-	-	69	5,6	41	
-	26	53	16	5	70	9,7	42	
4	12	76	4	4	74	9,3	43	
-	36	36	28	-	75	10,2	44	
-	1	21	50	28	86	9,9	45	
-	33	67	-	-	76	12,9	46	
-	-	100	-	-	75	10,3	47	
-	-	19	35	46	87	9,8	48	
-	-	8	69	23	88	10,1	49	
-	-	12	62	26	86	9,1	50	
-	-	32	53	15	83	9,5	51	
13	13	37	37	-	76	9,1	52	
20	-	40	40	-	75	9,3	53	
-	50	-	50	-	77	8,2	54	
-	-	100	-	-	77	9,5	55	
-	4	32	39	25	81	10,0	56	
-	4	32	39	25	81	10,0	57	
-	-	-	-	-	-	-	58	
-	-	-	-	-	-	-	59	
-	-	100	-	-	72	8,0	60	
4	30	40	19	7	73	9,5	61	
3	17	49	27	4	75	8,5	62	
43	40	15	2	0	61	12,6	63	