

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE B

LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI

Reihe 2

Gartenbau und Weinwirtschaft

III. Weinwirtschaft

Vorschätzung der Weinmosternte

Oktober 1968



Bestellnummer : 210230 - 680006

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Inhalt

| | Seite |
|---|-------|
| Vorbemerkung | 3 |
| Tabellenteil: | |
| 1. Allgemeine Angaben über die Witterung | 4 |
| 2. Beurteilung des Weinmostes 1955 - 1968 | 4 |
| 3. Beginn der Lese | 5 |
| 4. Rebflächen, Hektarerträge, Mostmengen, Güte des Mostes | |
| Weinmost insgesamt | 6 |
| Weißmost | 10 |
| Rotmost | 14 |
| 5. Mostgewicht und Säuregehalt nach Weinbaugebieten | 18 |
| 6. Mosterträge wichtiger Rebsorten | 22 |
| 7. Mostgewicht und Säuregehalt nach Ländern | 24 |

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Die Angaben beziehen sich auf die Länder mit Weinbau.

Erschienen im Dezember 1968

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis DM 1,--

Ergebnisse für die einzelnen Länder werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer C II 4 veröffentlicht.

Vorbemerkung

In der Berichtszeit vom 25. September bis zum 15. Oktober war der Witterungsverlauf für die diesjährige Weinmosternte ebenso unbefriedigend wie in den davorliegenden 4 Wochen. Seit 1957 wurden die letzte Septemberwoche und die 1. Hälfte Oktober nicht mehr so ungünstig bewertet.

In den vorläufigen Noten über die Güte des Mostes hat auch die Beurteilung des Witterungsverlaufs ihren Ausdruck gefunden. Als gut werden 11 % der Moste bezeichnet; das ist etwas weniger als im gleichen Zeitraum des Jahres 1965. Als mittel wurden 44 %, gering 36 % und sehr gering 9 % der Mostmenge eingestuft.

Das durchschnittliche Mostgewicht ist mit 61° Oechsle für diesen Zeitabschnitt bei Weiß- und Rotmost gleich und entspricht damit auch der endgültigen Bewertung des Jahres 1965. Die Oechsle-Grade liegen erheblich unter und die Säuregehalte über dem Durchschnitt der letzten 10 Jahre.

Bedingt durch die ungünstige Witterung und durch akute Botrytisgefahr setzte die Hauptlese vor allem bei den frühreifenden Rebsorten wie Müller-Thurgau und Portugieser bereits im September und in der 1. Oktoberdekade ein. Bei den späteren Rebsorten wie Silvaner, Riesling und Burgunder erreichte die Lese in der 2. Oktoberdekade den Höhepunkt.

Die Vorschätzung des Hektarertrages ergab für den Weinmost insgesamt eine leichte Erhöhung gegenüber der Vorschätzung vom September.

Die voraussichtliche Mostmenge ist auf Grund der neuen Ermittlung mit 5,45 Mill. hl gegenüber 5,34 Mill. hl nach der Vorschätzung von Ende September anzunehmen. Von der diesjährigen Ernte werden ca. 4,51 Mill. hl auf Weißmost und 0,94 Mill. hl auf Rotmost entfallen.

Mit diesen Mengen übertrifft der diesjährige Jahrgang zwar voraussichtlich die Ernte vom Jahre 1965 (5,0 Mill. hl), wird aber die des Vorjahres von fast 6,1 Mill. hl nicht erreichen können.

1. Allgemeine Angaben über die Witterung

(% der ausgewerteten Meldungen)

| Berichtsgegenstand Beurteilung | Nordrhein- Westfalen | Hessen | Rheinland- Pfalz | Baden- Württem- berg | Bayern | Saar- land | Bundesgebiet | | |
|--|-------------------------|--------|---------------------|----------------------------|--------|---------------|--------------|-----------|---------|
| | | | | | | | Oktober | September | Oktober |
| | | | | | | | 1968 | | 1967 |
| Witterung für die Reben und Trauben | | | | | | | | | |
| schlecht | 100 | 69 | 83 | 59 | 86 | 100 | 73 | 73 | 20 |
| mittel | - | 31 | 17 | 39 | 14 | - | 26 | 26 | 53 |
| gut | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 27 |
| Wetterschäden | | | | | | | | | |
| keine | - | 81 | 88 | 87 | 64 | 100 | 84 | 62 | 77 |
| schwache | - | - | 6 | 7 | 9 | - | 6 | 22 | 11 |
| mittlere | 25 | 13 | 4 | 5 | 13 | - | 6 | 11 | 7 |
| starke | 75 | 6 | 2 | 1 | 14 | - | 4 | 5 | 5 |
| Niederschläge | | | | | | | | | |
| zu gering | - | - | - | - | 1 | - | 0 | - | 1 |
| ausreichend | - | 19 | 5 | 12 | 4 | - | 8 | 6 | 58 |
| zu hoch | 100 | 81 | 95 | 88 | 95 | 100 | 92 | 94 | 41 |
| Temperaturverlauf | | | | | | | | | |
| ungünstig | 100 | 69 | 86 | 81 | 91 | 100 | 84 | 87 | 37 |
| normal | - | 25 | 14 | 17 | 9 | - | 15 | 12 | 47 |
| günstig | - | 6 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 16 |
| Sonnenscheindauer | | | | | | | | | |
| zu gering | 100 | 94 | 98 | 94 | 99 | 100 | 97 | 96 | 48 |
| genügend | - | 6 | 2 | 6 | 1 | - | 3 | 4 | 47 |
| reichlich | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |

2. Beurteilung des Weinmostes 1955 - 1968

| Jahr | Güte des Mostes | | | | | Ø Mostgewicht | | Ø Säuregehalt | |
|--------------------|--------------------|-----|--------|--------|-------------|---------------|-----|---------------|------|
| | Weinmost insgesamt | | | | | weiß | rot | weiß | rot |
| | sehr gut | gut | mittel | gering | sehr gering | | | | |
| | % der Mostmenge | | | | | Grad Oechsle | | Promille | |
| 1955 | 3 | 27 | 49 | 19 | 2 | 69 | 65 | 12,2 | 11,3 |
| 1956 | 1 | 17 | 43 | 30 | 9 | 62 | 66 | 13,6 | 11,2 |
| 1957 | 6 | 37 | 46 | 10 | 1 | 69 | 68 | 13,0 | 12,3 |
| 1958 | 12 | 43 | 36 | 8 | 1 | 69 | 68 | 11,2 | 9,7 |
| 1959 | 63 | 27 | 4 | 1 | - | 92 | 85 | 7,4 | 6,6 |
| 1960 | 6 | 35 | 45 | 12 | 2 | 68 | 66 | 9,8 | 9,3 |
| 1961 | 13 | 46 | 34 | 7 | 0 | 73 | 70 | 9,3 | 7,8 |
| 1962 | 14 | 46 | 30 | 9 | 1 | 74 | 72 | 10,8 | 9,5 |
| 1963 | 8 | 36 | 41 | 13 | 2 | 69 | 72 | 10,5 | 9,0 |
| 1964 | 23 | 49 | 24 | 4 | 0 | 78 | 75 | 7,1 | 6,2 |
| 1965 | 1 | 14 | 44 | 32 | 9 | 61 | 61 | 13,7 | 12,6 |
| 1966 | 21 | 52 | 24 | 3 | 0 | 77 | 75 | 8,6 | 8,3 |
| 1967 ¹⁾ | 12 | 41 | 37 | 9 | 1 | 73 | 73 | 10,8 | 9,5 |
| 1968 ¹⁾ | 0 | 11 | 44 | 36 | 9 | 61 | 61 | 12,6 | 12,1 |

1) Vorläufige Ergebnisse.

3. Beginn der Lese
(% der ausgewerteten Meldungen)

| Rebsorten Länder mit Weinbau | vor dem 1. Okt. | 1. bis 10. Okt. | 11. bis 20. Okt. | nach dem 20. Okt. | Rebsorten Länder mit Weinbau | vor dem 1. Okt. | 1. bis 10. Okt. | 11. bis 20. Okt. | nach dem 20. Okt. |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| <u>Weißes Gewächs</u> | | | | | | | | | |
| <u>Silvaner</u> | | | | | <u>Gutedel</u> | | | | |
| Bundesgebiet 1963 | 1 | 33 | 49 | 17 | Baden-Württemberg 1968 | 2 | 27 | 52 | 19 |
| 1964 | 11 | 49 | 37 | 3 | | | | | |
| 1965 | - | - | 4 | 96 | <u>Ruländer</u> | | | | |
| 1966 | 0 | 38 | 46 | 16 | Baden-Württemberg 1968 | 3 | 44 | 43 | 10 |
| 1967 | 9 | 67 | 23 | 1 | Saarland 1968 | - | 100 | - | - |
| 1968 | 6 | 54 | 31 | 9 | | | | | |
| Nordrhein-Westfalen | . | . | . | . | | | | | |
| Hessen | - | 36 | 64 | - | | | | | |
| Rheinland-Pfalz | 8 | 77 | 13 | 2 | <u>Portugieser</u> | | | | |
| Baden-Württemberg | 2 | 24 | 50 | 24 | Bundesgebiet | 1963 | 31 | 44 | 20 |
| Bayern | 11 | 48 | 38 | 3 | 1964 | 54 | 40 | 5 | 1 |
| Saarland | - | 100 | - | - | 1965 | - | 7 | 34 | 59 |
| | | | | | 1966 | 36 | 33 | 29 | 2 |
| | | | | | 1967 | 62 | 33 | 5 | 0 |
| | | | | | 1968 | 50 | 33 | 15 | 2 |
| <u>Riesling</u> | | | | | Nordrhein-Westfalen | . | . | . | . |
| Bundesgebiet 1963 | 0 | 16 | 34 | 50 | Hessen | 60 | 40 | - | - |
| 1964 | 6 | 29 | 52 | 13 | Rheinland-Pfalz | 85 | 13 | 1 | 1 |
| 1965 | - | - | 2 | 98 | Baden-Württemberg | 9 | 56 | 32 | 3 |
| 1966 | 0 | 24 | 46 | 30 | Bayern | 31 | 63 | 6 | - |
| 1967 | 5 | 48 | 39 | 8 | Saarland | - | - | - | - |
| 1968 | 3 | 31 | 37 | 29 | | | | | |
| Nordrhein-Westfalen | . | . | . | . | <u>Burgunder</u> | | | | |
| Hessen | - | 21 | 76 | 3 | Bundesgebiet | 1963 | 12 | 38 | 27 |
| Rheinland-Pfalz | 4 | 45 | 21 | 30 | 1964 | 13 | 54 | 31 | 2 |
| Baden-Württemberg | 2 | 12 | 54 | 32 | 1965 | - | 2 | 15 | 83 |
| Bayern | 5 | 23 | 63 | 9 | 1966 | 6 | 40 | 51 | 3 |
| Saarland | - | 100 | - | - | 1967 | 16 | 55 | 28 | 1 |
| | | | | | 1968 | 4 | 35 | 55 | 6 |
| <u>Müller-Thurgau</u> | | | | | Nordrhein-Westfalen | . | . | . | . |
| Bundesgebiet 1963 | 22 | 67 | 10 | 1 | Hessen | 25 | 50 | 25 | - |
| 1964 | 37 | 55 | 7 | 1 | Rheinland-Pfalz | 18 | 46 | 36 | - |
| 1965 | - | 1 | 40 | 59 | Baden-Württemberg | 1 | 30 | 61 | 8 |
| 1966 | 27 | 51 | 21 | 1 | Bayern | - | 75 | 25 | - |
| 1967 | 70 | 27 | 2 | 1 | Saarland | - | 100 | - | - |
| 1968 | 58 | 37 | 4 | 1 | | | | | |
| Nordrhein-Westfalen | . | . | . | . | <u>Schwarzriesling</u> | | | | |
| Hessen | 79 | 21 | - | - | Baden-Württemberg 1968 | 1 | 45 | 51 | 3 |
| Rheinland-Pfalz | 78 | 20 | 1 | 1 | | | | | |
| Baden-Württemberg | 39 | 51 | 8 | 2 | <u>Trollinger</u> | | | | |
| Bayern | 42 | 54 | 3 | 1 | Baden-Württemberg 1968 | 1 | 5 | 56 | 38 |
| Saarland | 100 | - | - | - | | | | | |
| <u>Elbling</u> | | | | | <u>Limberger</u> | | | | |
| Bundesgebiet 1963 | 4 | 56 | 38 | 2 | Baden-Württemberg 1968 | - | 10 | 57 | 33 |
| 1964 | 49 | 46 | 5 | - | | | | | |
| 1965 | - | - | 9 | 91 | | | | | |
| 1966 | - | 57 | 38 | 5 | | | | | |
| 1967 | 12 | 85 | 3 | - | | | | | |
| 1968 | 5 | 40 | 50 | 5 | | | | | |
| Hessen | - | - | - | - | | | | | |
| Rheinland-Pfalz | 5 | 40 | 50 | 5 | | | | | |
| Baden-Württbg. | - | - | - | - | | | | | |
| Bayern | - | - | - | - | | | | | |
| Saarland | - | 100 | - | - | | | | | |

4. Rebflächen, Hektarerträge, Most

| Lfd. Nr. | Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet | Jahr ¹⁾ | Weinmost | | |
|-------------|--|--------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------|
| | | | Im Ertrag stehende Rebflächen | Ertrag je Hektar | Ernte- menge |
| | | | ha | hl | |
| 1 | <u>Nordrhein-Westfalen</u> | 1968 | 24 | 40,0 | 960 |
| 2 | | 1967 | 27 | 45,3 | 1 223 |
| 3 | <u>Hessen</u> | 1968 | 3 290 | 58,2 | 191 486 |
| 4 | | 1967 | 3 267 | 55,4 | 180 845 |
| 5 | Hessische Bergstraße | 1968 | 221 | 61,5 | 13 586 |
| 6 | Rheingau | 1968 | 3 069 | 58,0 | 177 900 |
| 7 | <u>Rheinland-Pfalz</u> | 1968 | 49 187 | 79,3 | 3 900 280 |
| 8 | | 1967 | 48 675 | 93,4 | 4 544 235 |
| 9 | Rheinland-Nassau | 1968 | 14 602 | 76,2 | 1 112 428 |
| 10 | Mittelrhein | 1968 | 939 | 53,7 | 50 402 |
| 11 | Nahe (RB Koblenz) | 1968 | 3 039 | 50,5 | 153 372 |
| 12 | Obermosel | 1968 | 808 | 105,1 | 84 905 |
| 13 | Saar | 1968 | 1 034 | 70,0 | 72 390 |
| 14 | Ruwer | 1968 | 304 | 59,8 | 18 164 |
| 15 | Mittelmosel | 1968 | 5 247 | 86,6 | 454 445 |
| 16 | Untermosel | 1968 | 2 687 | 89,3 | 239 841 |
| 17 | Ahr | 1968 | 531 | 72,2 | 38 341 |
| 18 | Lahn | 1968 | 13 | 43,7 | 568 |
| 19 | Rheinhessen | 1968 | 16 373 | 76,5 | 1 252 476 |
| 20 | Worms u. Umgegend | 1968 | 4 907 | 79,4 | 389 851 |
| 21 | Oppenheim u. Umgegend | 1968 | 1 380 | 82,3 | 113 595 |
| 22 | Mainz u. Umgegend | 1968 | 1 046 | 81,6 | 85 340 |
| 23 | Ingelheim u. Umgegend | 1968 | 1 370 | 83,0 | 113 649 |
| 24 | Wiesbach | 1968 | 1 780 | 68,7 | 122 245 |
| 25 | Bingen u. Umgegend | 1968 | 372 | 66,4 | 24 700 |
| 26 | Nahe (Rheinhessen) | 1968 | 640 | 66,7 | 42 691 |
| 27 | Alzey u. Umgegend | 1968 | 4 878 | 73,9 | 360 405 |
| 28 | Pfalz | 1968 | 18 212 | 84,3 | 1 535 376 |
| 29 | Mittelhaardt | 1968 | 5 700 | 83,9 | 478 287 |
| 30 | Oberhaardt | 1968 | 9 900 | 83,8 | 829 247 |
| 31 | Unterhaardt m. Zellertal | 1968 | 2 094 | 94,6 | 198 113 |
| 32 | Nahe (Pfalz) | 1968 | 518 | 57,4 | 29 729 |

1) 1968 vorläufige Ergebnisse.

mengen, Güte des Mostes

| insgesamt | | | | | Lfd. Nr. |
|-----------------|-----|--------|--------|-------------|-------------|
| Güte des Mostes | | | | | |
| sehr gut | gut | mittel | gering | sehr gering | |
| % der Mostmenge | | | | | |
| - | 1 | 20 | 45 | 34 | 1 |
| 10 | 58 | 31 | 1 | - | 2 |
| - | 7 | 35 | 50 | 8 | 3 |
| 17 | 44 | 28 | 10 | 1 | 4 |
| - | 6 | 46 | 35 | 13 | 5 |
| - | 7 | 34 | 51 | 8 | 6 |
| 0 | 8 | 41 | 40 | 11 | 7 |
| 10 | 37 | 42 | 10 | 1 | 8 |
| 0 | 7 | 34 | 46 | 13 | 9 |
| - | 1 | 20 | 45 | 34 | 10 |
| - | 6 | 36 | 47 | 11 | 11 |
| - | 3 | 79 | 16 | 2 | 12 |
| - | 0 | 22 | 52 | 26 | 13 |
| - | 3 | 27 | 40 | 30 | 14 |
| 0 | 6 | 29 | 51 | 14 | 15 |
| 0 | 12 | 30 | 48 | 10 | 16 |
| 1 | 17 | 49 | 31 | 2 | 17 |
| - | - | - | 50 | 50 | 18 |
| 1 | 8 | 50 | 34 | 7 | 19 |
| 1 | 4 | 47 | 37 | 11 | 20 |
| - | 4 | 26 | 57 | 13 | 21 |
| - | 9 | 67 | 20 | 4 | 22 |
| 1 | 6 | 54 | 31 | 8 | 23 |
| 1 | 14 | 45 | 34 | 6 | 24 |
| - | 29 | 54 | 17 | - | 25 |
| - | 2 | 56 | 41 | 1 | 26 |
| 0 | 11 | 56 | 29 | 4 | 27 |
| 0 | 10 | 38 | 41 | 11 | 28 |
| 1 | 12 | 20 | 52 | 15 | 29 |
| 0 | 10 | 45 | 36 | 9 | 30 |
| 1 | 4 | 48 | 35 | 12 | 31 |
| - | 20 | 34 | 33 | 13 | 32 |

4. Rebflächen, Hektarerträge,

| Lfd. Nr. | Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet | Jahr ¹⁾ | Weinmost | | |
|-------------|--|--------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------|
| | | | Im Ertrag stehende Rebfläche | Ertrag je Hektar | Ernte- menge |
| | | | ha | hl | |
| 33 | <u>Baden-Württemberg</u> | 1968 | 15 318 | 79,9 | 1 224 016 |
| 34 | | 1967 | 15 165 | 80,8 | 1 225 261 |
| 35 | Nordwürttemberg | 1968 | 6 327 | 74,7 | 472 821 |
| 36 | davon Oberes Neckartal | 1968 | 46 | 42,3 | 1 947 |
| 37 | Unteres Neckartal | 1968 | 3 563 | 75,4 | 268 519 |
| 38 | Remstal | 1968 | 710 | 77,5 | 55 047 |
| 39 | Enztal | 1968 | 540 | 78,5 | 42 376 |
| 40 | Zabergäu | 1968 | 811 | 76,2 | 61 784 |
| 41 | Kocher- u. Jagsttal | 1968 | 516 | 62,4 | 32 216 |
| 42 | Tauber- u. Jagsttal | 1968 | 141 | 77,5 | 10 932 |
| 43 | Nordbaden | 1968 | 1 897 | 65,8 | 124 788 |
| 44 | davon Tauber- u. Maintal | 1968 | 294 | 48,6 | 14 282 |
| 45 | Neckar- u. Jagsttal | 1968 | 47 | 59,5 | 2 798 |
| 46 | Bergstraße | 1968 | 609 | 69,7 | 42 471 |
| 47 | Kraichgau | 1968 | 803 | 65,9 | 52 882 |
| 48 | Pfinz-, Enz- und Albtal | 1968 | 144 | 85,8 | 12 355 |
| 49 | Südbaden | 1968 | 7 046 | 88,5 | 623 756 |
| 50 | davon See- u. Oberrhein | 1968 | 167 | 94,2 | 15 734 |
| 51 | Oberes Rheintal | 1968 | 24 | 88,5 | 2 125 |
| 52 | Markgräflerland | 1968 | 1 374 | 92,2 | 126 657 |
| 53 | Kaiserstuhl | 1968 | 2 371 | 93,6 | 221 900 |
| 54 | Breisgau | 1968 | 1 703 | 95,4 | 162 410 |
| 55 | Ortenau und Bühler- u. Oberrhein | 1968 | 1 407 | 67,5 | 94 930 |
| 56 | Südwestfalen-Lippe | 1968 | 48 | 55,2 | 2 651 |
| 57 | davon Oberes Neckartal | 1968 | 37 | 52,1 | 1 929 |
| 58 | Enztal | 1968 | 5 | 62,2 | 311 |
| 59 | Bodenseegebiet | 1968 | 6 | 68,5 | 411 |
| 60 | <u>Bayern</u> | 1968 | 2 322 | 56,0 | 129 939 |
| 61 | | 1967 | 2 257 | 49,4 | 111 404 |
| 62 | RB Unterfranken | 1968 | 2 084 | 56,0 | 116 704 |
| 63 | RB Mittelfranken | 1968 | 234 | 55,6 | 13 002 |
| 64 | Übrige Gebiete | 1968 | 4 | 58,3 | 233 |
| 65 | Saarland | 1968 | 73 | 98,8 | 7 221 |
| 66 | | 1967 | 69 | 92,5 | 6 394 |
| 67 | Bundesgebiet | 1968 | 70 214 | 77,7 | 5 453 902 |
| 68 | | November 1967 | 69 460 | 87,4 | 6 069 362 |
| 69 | | D1962/67 | 68 592 | 80,3 | 5 510 267 |

1) 1968 vorläufige Ergebnisse.

Mostmengen, Güte des Mostes

| insgesamt | | | | | Lfd. Nr. |
|-----------------|-----|--------|--------|-------------|-------------|
| Güte des Mostes | | | | | |
| sehr gut | gut | mittel | gering | sehr gering | |
| % der Mostmenge | | | | | |
| 1 | 22 | 56 | 19 | 2 | 33 |
| 21 | 57 | 20 | 2 | 0 | 34 |
| 1 | 22 | 56 | 19 | 2 | 35 |
| - | 7 | 88 | 4 | 1 | 36 |
| 1 | 25 | 58 | 15 | 1 | 37 |
| - | 34 | 51 | 15 | - | 38 |
| - | 21 | 54 | 18 | 7 | 39 |
| - | 14 | 60 | 22 | 4 | 40 |
| - | 3 | 52 | 45 | 0 | 41 |
| - | 11 | 45 | 40 | 4 | 42 |
| 0 | 8 | 55 | 31 | 6 | 43 |
| - | 2 | 73 | 24 | 1 | 44 |
| - | 13 | 49 | 38 | - | 45 |
| 0 | 14 | 47 | 36 | 3 | 46 |
| 8 | 7 | 59 | 27 | 7 | 47 |
| - | 2 | 42 | 34 | 22 | 48 |
| 2 | 23 | 56 | 17 | 2 | 49 |
| - | 18 | 58 | 24 | - | 50 |
| - | 0 | 83 | 16 | 1 | 51 |
| 0 | 23 | 64 | 12 | 1 | 52 |
| 3 | 20 | 61 | 14 | 2 | 53 |
| 2 | 27 | 50 | 20 | 1 | 54 |
| 5 | 24 | 45 | 20 | 6 | 55 |
| 3 | 52 | 24 | 21 | - | 56 |
| 4 | 52 | 16 | 28 | - | 57 |
| - | 77 | 23 | - | - | 58 |
| - | 37 | 63 | - | - | 59 |
| 1 | 8 | 47 | 36 | 8 | 60 |
| 30 | 47 | 21 | 2 | 0 | 61 |
| 1 | 8 | 50 | 34 | 7 | 62 |
| - | 16 | 22 | 54 | 8 | 63 |
| - | - | 100 | - | - | 64 |
| - | - | 30 | 70 | - | 65 |
| 1 | 27 | 60 | 12 | - | 66 |
| 0 | 11 | 44 | 36 | 9 | 67 |
| 13 | 41 | 37 | 8 | 1 | 68 |
| 14 | 40 | 33 | 11 | 2 | 69 |

| Lfd. Nr. | Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet | Jahr ¹⁾ | Weiß | | |
|-------------|--|--------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------|
| | | | Im Ertrag stehende Rebfläche | Ertrag je Hektar | Ernte- menge |
| | | | ha | hl | |
| 1 | <u>Nordrhein-Westfalen</u> | 1968 | 22 | 40,0 | 880 |
| 2 | | 1967 | 25 | 46,7 | 1 168 |
| 3 | <u>Hessen</u> | 1968 | 3 230 | 58,3 | 188 432 |
| 4 | | 1967 | 3 205 | 55,6 | 178 060 |
| 5 | Hessische Bergstraße | 1968 | 220 | 61,5 | 13 526 |
| 6 | Rheingau | 1968 | 3 010 | 58,1 | 174 906 |
| 7 | <u>Rheinland-Pfalz</u> | 1968 | 44 470 | 77,8 | 3 460 225 |
| 8 | | 1967 | 43 868 | 92,9 | 4 076 507 |
| 9 | Rheinland-Nassau | 1968 | 14 252 | 76,5 | 1 090 255 |
| 10 | Mittelrhein | 1968 | 928 | 53,5 | 49 645 |
| 11 | Nahé (RB Koblenz) | 1968 | 3 019 | 50,5 | 152 445 |
| 12 | Obermosel | 1968 | 808 | 105,1 | 84 905 |
| 13 | Saar | 1968 | 1 034 | 70,0 | 72 390 |
| 14 | Ruwer | 1968 | 304 | 59,8 | 18 164 |
| 15 | Mittelmosel | 1968 | 5 246 | 86,6 | 454 391 |
| 16 | Untermosel | 1968 | 2 687 | 89,3 | 239 841 |
| 17 | Ahr | 1968 | 214 | 83,9 | 17 944 |
| 18 | Lahn | 1968 | 12 | 44,2 | 530 |
| 19 | Rheinhessen | 1968 | 15 085 | 75,5 | 1 139 489 |
| 20 | Worms u. U. | 1968 | 4 503 | 77,7 | 349 884 |
| 21 | Oppenheim u. U. | 1968 | 1 373 | 82,3 | 113 040 |
| 22 | Mainz u. U. | 1968 | 950 | 82,1 | 77 970 |
| 23 | Ingelheim u. U. | 1968 | 1 024 | 82,2 | 84 177 |
| 24 | Wiesbach | 1968 | 1 634 | 67,6 | 110 432 |
| 25 | Bingen u. U. | 1968 | 349 | 66,2 | 23 105 |
| 26 | Nahe (Rheinhess.) | 1968 | 604 | 65,9 | 39 789 |
| 27 | Alzey u. U. | 1968 | 4 648 | 73,4 | 341 092 |
| 28 | Pfalz | 1968 | 15 133 | 81,3 | 1 230 481 |
| 29 | Mittelhaardt | 1968 | 4 092 | 81,6 | 333 784 |
| 30 | Oberhaardt | 1968 | 9 163 | 82,0 | 751 479 |
| 31 | Unterhaardt m. Zellertal | 1968 | 1 364 | 84,8 | 115 688 |
| 32 | Nahe (Pfalz) | 1968 | 514 | 57,5 | 29 530 |

1) 1968 vorläufige Ergebnisse.

Mostmengen, Güte des Mostes

| most | | | | | Lfd. Nr. |
|-----------------|-----|--------|--------|-------------|-------------|
| Güte des Mostes | | | | | |
| sehr gut | gut | mittel | gering | sehr gering | |
| % der Mostmenge | | | | | |
| - | 1 | 20 | 45 | 34 | 1 |
| 11 | 60 | 29 | - | - | 2 |
| - | 7 | 35 | 50 | 8 | 3 |
| 17 | 44 | 28 | 10 | 1 | 4 |
| - | 6 | 46 | 35 | 13 | 5 |
| - | 7 | 34 | 51 | 8 | 6 |
| 0 | 9 | 41 | 40 | 10 | 7 |
| 10 | 37 | 42 | 10 | 1 | 8 |
| 0 | 7 | 33 | 46 | 14 | 9 |
| - | 1 | 20 | 45 | 34 | 10 |
| - | 6 | 36 | 47 | 11 | 11 |
| - | 3 | 79 | 16 | 2 | 12 |
| - | 0 | 22 | 52 | 26 | 13 |
| - | 3 | 27 | 40 | 30 | 14 |
| 0 | 6 | 29 | 51 | 14 | 15 |
| 0 | 12 | 30 | 48 | 10 | 16 |
| 1 | 22 | 50 | 27 | - | 17 |
| - | - | - | 50 | 50 | 18 |
| 1 | 8 | 50 | 34 | 7 | 19 |
| 1 | 4 | 48 | 36 | 11 | 20 |
| - | 4 | 26 | 57 | 13 | 21 |
| - | 10 | 66 | 20 | 4 | 22 |
| 1 | 4 | 53 | 34 | 8 | 23 |
| 1 | 15 | 46 | 33 | 5 | 24 |
| - | 30 | 53 | 17 | - | 25 |
| - | 2 | 57 | 41 | - | 26 |
| 0 | 12 | 56 | 28 | 4 | 27 |
| 0 | 10 | 40 | 40 | 10 | 28 |
| 1 | 10 | 24 | 53 | 12 | 29 |
| 0 | 10 | 46 | 35 | 9 | 30 |
| 1 | 5 | 49 | 35 | 10 | 31 |
| - | 20 | 34 | 33 | 13 | 32 |

Mostmengen, Güte des Mostes

| most | | | | | Lfd. Nr. |
|-----------------|-----|--------|--------|-------------|-------------|
| Güte des Mostes | | | | | |
| sehr gut | gut | mittel | gering | sehr gering | |
| % der Mostmenge | | | | | |
| 2 | 19 | 58 | 19 | 2 | 33 |
| 21 | 56 | 21 | 2 | 0 | 34 |
| 0 | 16 | 59 | 23 | 2 | 35 |
| - | 8 | 86 | 5 | 1 | 36 |
| 1 | 17 | 60 | 21 | 1 | 37 |
| - | 17 | 66 | 17 | - | 38 |
| - | 21 | 54 | 7 | 18 | 39 |
| - | 24 | 49 | 24 | 3 | 40 |
| - | 2 | 59 | 39 | 0 | 41 |
| - | 11 | 50 | 35 | 4 | 42 |
| 0 | 9 | 58 | 28 | 5 | 43 |
| - | 2 | 75 | 22 | 1 | 44 |
| - | 19 | 50 | 31 | - | 45 |
| 1 | 15 | 48 | 34 | 2 | 46 |
| - | 7 | 64 | 25 | 4 | 47 |
| - | 2 | 42 | 29 | 27 | 48 |
| 2 | 21 | 58 | 17 | 2 | 49 |
| - | 9 | 71 | 20 | - | 50 |
| - | 1 | 82 | 17 | - | 51 |
| 0 | 23 | 64 | 12 | 1 | 52 |
| 3 | 18 | 64 | 14 | 1 | 53 |
| 1 | 22 | 53 | 22 | 2 | 54 |
| 6 | 24 | 41 | 21 | 8 | 55 |
| 6 | 49 | 39 | 6 | - | 56 |
| 9 | 61 | 20 | 10 | - | 57 |
| - | - | - | - | - | 58 |
| - | 27 | 73 | - | - | 59 |
| 1 | 8 | 47 | 36 | 8 | 60 |
| 30 | 47 | 21 | 2 | 0 | 61 |
| 1 | 8 | 50 | 34 | 7 | 62 |
| - | 16 | 22 | 54 | 8 | 63 |
| - | - | 100 | - | - | 64 |
| - | - | 30 | 70 | - | 65 |
| 1 | 27 | 60 | 12 | - | 66 |
| 0 | 10 | 44 | 37 | 9 | 67 |
| 12 | 40 | 38 | 9 | 1 | 68 |
| 14 | 40 | 33 | 11 | 2 | 69 |

| Lfd. Nr. | Land Verwaltungsbezirk Weinbaugbiet | Jahr ¹⁾ | Rot | | |
|-------------|---|--------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------|
| | | | Im Ertrag stehende Rebfläche | Ertrag je Hektar | Ernte- menge |
| | | | ha | hl | |
| 1 | <u>Nordrhein-Westfalen</u> | 1968 | 2 | 40,0 | 80 |
| 2 | | 1967 | 2 | 27,5 | 55 |
| 3 | <u>Hessen</u> | 1968 | 60 | 50,9 | 3 054 |
| 4 | | 1967 | 62 | 44,9 | 2 785 |
| 5 | Hessische Bergstraße | 1968 | 1 | 60,0 | 60 |
| 6 | Rheingau | 1968 | 59 | 50,7 | 2 994 |
| 7 | <u>Rheinland-Pfalz</u> | 1968 | 4 717 | 93,3 | 440 055 |
| 8 | | 1967 | 4 807 | 97,3 | 467 728 |
| 9 | Rheinland-Nassau | 1968 | 350 | 63,4 | 22 173 |
| 10 | Mittelrhein | 1968 | 11 | 68,8 | 757 |
| 11 | Nahe (RB Koblenz) | 1968 | 20 | 46,4 | 927 |
| 12 | Obermosel | 1968 | 0 | . | . |
| 13 | Saar | 1968 | - | - | - |
| 14 | Ruwer | 1968 | - | - | - |
| 15 | Mittelmosel | 1968 | 1 | 54,3 | 54 |
| 16 | Untermosel | 1968 | 0 | . | . |
| 17 | Ahr | 1968 | 317 | 64,3 | 20 397 |
| 18 | Lahn | 1968 | 1 | 38,0 | 38 |
| 19 | Rheinhessen | 1968 | 1 288 | 87,7 | 112 987 |
| 20 | Worms u.U. | 1968 | 404 | 98,9 | 39 967 |
| 21 | Oppenheim u.U. | 1968 | 7 | 79,3 | 555 |
| 22 | Mainz u.U. | 1968 | 96 | 76,8 | 7 370 |
| 23 | Ingelheim u.U. | 1968 | 346 | 85,2 | 29 472 |
| 24 | Wiesbach | 1968 | 146 | 80,9 | 11 813 |
| 25 | Bingen u.U. | 1968 | 23 | 69,3 | 1 595 |
| 26 | Nahe (Rheinhess.) | 1968 | 36 | 80,6 | 2 902 |
| 27 | Alzey u.U. | 1968 | 230 | 84,0 | 19 313 |
| 28 | Pfalz | 1968 | 3 079 | 99,0 | 304 895 |
| 29 | Mittelhaardt | 1968 | 1 608 | 89,9 | 144 503 |
| 30 | Oberhaardt | 1968 | 737 | 105,5 | 77 768 |
| 31 | Unterhaardt | 1968 | 730 | 112,9 | 82 425 |
| 32 | Nahe (Pfalz) | 1968 | 4 | 49,8 | 199 |

1) 1968 vorläufige Ergebnisse.

Mostmenge, Güte des Mostes

| most | | | | | Lfd. Nr. |
|-----------------|-----|--------|--------|-------------|-------------|
| Güte des Mostes | | | | | |
| sehr gut | gut | mittel | gering | sehr gering | |
| % der Mostmenge | | | | | |
| - | - | 35 | 43 | 22 | 1 |
| - | - | 73 | 27 | - | 2 |
| - | 5 | 45 | 31 | 19 | 3 |
| 27 | 53 | 12 | 8 | - | 4 |
| - | - | 10 | 60 | 30 | 5 |
| - | 5 | 46 | 30 | 19 | 6 |
| 0 | 10 | 35 | 41 | 14 | 7 |
| 6 | 38 | 47 | 8 | 1 | 8 |
| 1 | 12 | 47 | 35 | 5 | 9 |
| - | - | 35 | 43 | 22 | 10 |
| - | 8 | 44 | 40 | 8 | 11 |
| • | • | • | • | • | 12 |
| - | - | - | - | - | 13 |
| - | - | - | - | - | 14 |
| - | 5 | 45 | 45 | 5 | 15 |
| • | • | • | • | • | 16 |
| 1 | 13 | 48 | 34 | 4 | 17 |
| - | - | - | 50 | 50 | 18 |
| 0 | 4 | 50 | 36 | 10 | 19 |
| - | 0 | 40 | 44 | 16 | 20 |
| - | 5 | 75 | 15 | 5 | 21 |
| - | 3 | 76 | 19 | 2 | 22 |
| 1 | 10 | 58 | 22 | 9 | 23 |
| - | 8 | 37 | 46 | 9 | 24 |
| - | 23 | 64 | 13 | - | 25 |
| - | - | 45 | 47 | 8 | 26 |
| - | 1 | 55 | 43 | 1 | 27 |
| 0 | 12 | 28 | 44 | 16 | 28 |
| - | 15 | 12 | 50 | 23 | 29 |
| - | 15 | 38 | 42 | 5 | 30 |
| 1 | 3 | 46 | 35 | 15 | 31 |
| - | - | - | 100 | - | 32 |

| Lfd. Nr. | Land Verwaltungsbezirk Weinbaugbiet | Jahr ²⁾ | Rot | | |
|-------------|---|--------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------|
| | | | Im Ertrag stehende Rebfläche | Ertrag je Hektar | Ernte- menge |
| | | | ha | hl | |
| 33 | <u>Baden-Württemberg</u> | 1968 | 6 256 | 78,9 | 493 883 |
| 34 | | 1967 | 6 224 | 76,6 | 476 841 |
| 35 | Nordwürttemberg | 1968 | 3 944 | 81,1 | 319 843 |
| 36 | davon Oberes Neckartal | 1968 | 6 | 27,2 | 163 |
| 37 | Unteres Neckartal | 1968 | 2 308 | 82,2 | 189 695 |
| 38 | Remstal | 1968 | 382 | 82,8 | 31 638 |
| 39 | Enztal | 1968 | 463 | 79,8 | 36 951 |
| 40 | Zabergäu | 1968 | 576 | 78,9 | 45 473 |
| 41 | Kocher- u. Jagsttal | 1968 | 189 | 75,8 | 14 334 |
| 42 | Tauberregion | 1968 | 20 | 79,5 | 1 589 |
| 43 | | | | | |
| 43 | Nordbaden | 1968 | 501 | 67,4 | 33 767 |
| 44 | davon Tauber- u. Maintal | 1968 | 20 | 42,8 | 856 |
| 45 | Neckar- u. Jagsttal | 1968 | 19 | 50,1 | 951 |
| 46 | Bergstraße | 1968 | 154 | 71,1 | 10 943 |
| 47 | Kraichgau | 1968 | 240 | 65,3 | 15 661 |
| 48 | Pfinz-, Enz- und Albatal | 1968 | 68 | 78,8 | 5 356 |
| 49 | Südbaden | 1968 | 1 776 | 77,9 | 138 409 |
| 50 | davon Seegegend | 1968 | 111 | 92,1 | 10 218 |
| 51 | Oberes Rheintal | 1968 | 18 | 85,8 | 1 544 |
| 52 | Markgräflerland | 1968 | 80 | 72,0 | 5 757 |
| 53 | Kaiserstuhl | 1968 | 648 | 84,2 | 54 549 |
| 54 | Breisgau | 1968 | 498 | 79,9 | 39 773 |
| 55 | Ortenau und Bühlerregion | 1968 | 421 | 63,1 | 26 568 |
| 56 | Südwestfalen-Hohenzollern | 1968 | 35 | 53,3 | 1 864 |
| 57 | davon Oberes Neckartal | 1968 | 28 | 51,0 | 1 427 |
| 58 | Enztal | 1968 | 5 | 62,2 | 311 |
| 59 | Bodenseegbiet | 1968 | 2 | 63,0 | 126 |
| 60 | <u>Bayern</u> | 1968 | 32 | 43,8 | 1 400 |
| 61 | | 1967 | 30 | 40,5 | 1 215 |
| 62 | RB Unterfranken | 1968 | 32 | 43,8 | 1 400 |
| 63 | RB Mittelfranken | 1968 | - | - | - |
| 64 | Übrige Gebiete | 1968 | - | - | - |
| 65 | | | | | |
| 65 | <u>Saarland</u> | 1968 | 0 | 130,8 | 18 |
| 66 | | 1967 | 0 | 150,0 | 21 |
| 67 | <u>Bundesgebiet</u> | 1968 | 11 067 | 84,8 | 938 490 |
| 68 | November | 1967 | 11 125 | 85,3 | 948 645 |
| 69 | | 01962/67 | 11 406 | 78,8 | 898 398 |

1) Einschl. Most aus gemischten Beständen.- 2) 1968, vorläufige Ergebnisse.

Mostmengen, Güte des Mostes

| 1) | | | | | | Lfd. Nr. |
|-----------------|-----|--------|--------|-------------|----|-------------|
| Güte des Mostes | | | | | | |
| sehr gut | gut | mittel | gering | sehr gering | | |
| % der Mostmenge | | | | | | |
| 1 | 26 | 52 | 19 | 2 | 33 | |
| 20 | 58 | 21 | 1 | 0 | 34 | |
| 1 | 26 | 55 | 17 | 1 | 35 | |
| - | - | 100 | - | - | 36 | |
| 1 | 28 | 57 | 13 | 1 | 37 | |
| - | 48 | 39 | 13 | - | 38 | |
| - | 21 | 54 | 20 | 5 | 39 | |
| - | 11 | 64 | 21 | 4 | 40 | |
| - | 4 | 43 | 53 | - | 41 | |
| - | 6 | 18 | 71 | 5 | 42 | |
| 1 | 7 | 44 | 38 | 10 | 43 | |
| - | 0 | 30 | 63 | 7 | 44 | |
| - | 1 | 48 | 51 | - | 45 | |
| - | 10 | 42 | 42 | 6 | 46 | |
| 1 | 6 | 48 | 33 | 12 | 47 | |
| - | 2 | 41 | 40 | 17 | 48 | |
| 3 | 30 | 48 | 17 | 2 | 49 | |
| - | 22 | 51 | 27 | - | 50 | |
| - | - | 84 | 15 | 1 | 51 | |
| 1 | 28 | 61 | 7 | 3 | 52 | |
| 4 | 27 | 50 | 16 | 3 | 53 | |
| 4 | 42 | 38 | 16 | - | 54 | |
| 3 | 26 | 54 | 16 | 1 | 55 | |
| 2 | 54 | 18 | 26 | - | 56 | |
| 3 | 48 | 14 | 35 | - | 57 | |
| - | 77 | 23 | - | - | 58 | |
| - | 60 | 40 | - | - | 59 | |
| - | 16 | 39 | 44 | 1 | 60 | |
| 22 | 48 | 30 | 0 | - | 61 | |
| - | 16 | 39 | 44 | 1 | 62 | |
| - | - | - | - | - | 63 | |
| - | - | - | - | - | 64 | |
| - | - | 100 | - | - | 65 | |
| - | 100 | - | - | - | 66 | |
| 1 | 18 | 44 | 29 | 8 | 67 | |
| 13 | 48 | 34 | 5 | 0 | 68 | |
| 15 | 44 | 32 | 8 | 1 | 69 | |

| Lfd. Nr. | Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet | Weißmost 1) | | | | | | Ø Most- gewicht Grad | Ø Säure- gehalt Promille |
|-------------|--|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----|-------------------------------|-----------------------------------|
| | | Mostgewicht nach Oechsle | | | | | % | | |
| | | Anteil des Mostertrages | | | | | | | |
| | | weniger als 60° | 60° bis unter 70° | 70° bis unter 80° | 80° bis unter 90° | 90° und mehr | | | |
| 1 | Nordrhein-Westfalen | . | . | . | . | . | . | . | |
| 2 | Hessen | 43 | 47 | 8 | 2 | - | 61 | 13,9 | |
| 3 | Bergstraße | 75 | 25 | 0 | - | - | . | . | |
| 4 | Rheingau | 41 | 48 | 9 | 2 | - | . | . | |
| 5 | Rheinland-Pfalz | 59 | 34 | 6 | 1 | 0 | 60 | 12,9 | |
| 6 | Rheinland-Nassau | 70 | 24 | 5 | 1 | 0 | 59 | 14,2 | |
| 7 | Mittelrhein | 70 | 27 | 3 | 0 | - | 58 | 11,8 | |
| 8 | Nahe (RB Koblenz) | 56 | 41 | 3 | 0 | - | 60 | 12,9 | |
| 9 | Obermosel | 94 | 6 | - | - | - | 56 | 15,2 | |
| 10 | Saar | 70 | 28 | 2 | - | - | 58 | 15,1 | |
| 11 | Ruwer | 97 | 3 | - | - | - | 55 | 13,9 | |
| 12 | Mittelmosel | 66 | 27 | 6 | 1 | 0 | 59 | 14,5 | |
| 13 | Untermosel | 80 | 14 | 5 | 1 | - | 58 | 14,5 | |
| 14 | Ahr | 28 | 42 | 27 | 3 | - | 60 | 12,0 | |
| 15 | Lahn | 50 | 50 | - | - | - | 57 | 14,7 | |
| 16 | Rheinhessen | 48 | 45 | 6 | 1 | 0 | 61 | 11,9 | |
| 17 | Worms u. U. | 40 | 52 | 6 | 1 | 1 | 62 | 11,8 | |
| 18 | Oppenheim | 60 | 36 | 4 | - | - | 59 | 10,5 | |
| 19 | Mainz u. U. | 30 | 57 | 12 | 1 | - | 63 | 12,1 | |
| 20 | Ingelheim u.U. | 58 | 37 | 4 | 1 | - | 60 | 12,7 | |
| 21 | Wiesbach | 48 | 47 | 4 | 1 | - | 61 | 12,1 | |
| 22 | Bingen u. U. | 42 | 32 | 23 | 3 | - | 64 | 11,7 | |
| 23 | Nahe (Rheinhess.) | 69 | 29 | 2 | - | - | 58 | 12,3 | |
| 24 | Alzey u.U. | 52 | 42 | 6 | 0 | 0 | 60 | 12,1 | |
| 25 | Pfalz | 61 | 32 | 6 | 1 | 0 | 60 | 12,8 | |
| 26 | Mittelhaardt | 59 | 34 | 6 | 1 | 0 | 60 | 13,4 | |
| 27 | Oberhaardt | 64 | 29 | 6 | 1 | - | 59 | 12,5 | |
| 28 | Unterhaardt m. Zellert | 43 | 44 | 9 | 3 | 1 | 63 | 12,9 | |
| 29 | Nahe (Pfalz) | 49 | 45 | 6 | - | - | 61 | 11,9 | |

1) Vorläufige Ergebnisse.

| Rotmost | | | | | | | Lfd. Nr. |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| Mostgewicht nach Oechsle | | | | | Ø Most- gewicht | Ø Säure- gehalt | |
| Anteil des Mostertrages | | | | | | | |
| weniger als 60° | 60° bis unter 70° | 70° bis unter 80° | 80° bis unter 90° | 90° und mehr | Grad | Promille | |
| . | . | . | . | . | . | . | 1 |
| 32 | 12 | 55 | 1 | - | 68 | 12,4 | 2 |
| 90 | 10 | - | - | - | . | . | 3 |
| 30 | 12 | 57 | 1 | - | . | . | 4 |
| 82 | 16 | 2 | 0 | - | 57 | 12,3 | 5 |
| 48 | 37 | 13 | 2 | - | 62 | 11,2 | 6 |
| 60 | 40 | 0 | - | - | 59 | 11,9 | 7 |
| 62 | 30 | 8 | - | - | 60 | 13,8 | 8 |
| . | . | . | . | . | . | . | 9 |
| - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 60 | 35 | 5 | - | - | 59 | 13,4 | 12 |
| . | . | . | . | . | . | . | 13 |
| 47 | 37 | 14 | 2 | - | 62 | 11,0 | 14 |
| 50 | 50 | - | - | - | 59 | 12,9 | 15 |
| 81 | 17 | 2 | 0 | - | 57 | 11,9 | 16 |
| 86 | 13 | 1 | 0 | - | 57 | 11,8 | 17 |
| 80 | 15 | 5 | - | - | 58 | 12,1 | 18 |
| 82 | 18 | - | - | - | 57 | 11,6 | 19 |
| 76 | 18 | 5 | 1 | - | 58 | 12,0 | 20 |
| 82 | 16 | - | 2 | - | 57 | 12,2 | 21 |
| 63 | 10 | 27 | - | - | 61 | 9,4 | 22 |
| 93 | 7 | - | - | - | 56 | 11,9 | 23 |
| 74 | 26 | 0 | - | - | 58 | 11,9 | 24 |
| 86 | 14 | 0 | - | - | 57 | 12,5 | 25 |
| 91 | 9 | 0 | - | - | 56 | 12,3 | 26 |
| 83 | 17 | 0 | 0 | - | 57 | 11,8 | 27 |
| 79 | 19 | 2 | - | - | 57 | 13,5 | 28 |
| 100 | - | - | - | - | 55 | 15,0 | 29 |

| Lfd. Nr. | Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet | Weißmost | | | | | | |
|-------------|--|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Mostgewicht nach Oechsle | | | | | Ø Most- gewicht | Ø Säure- gehalt |
| | | Anteil des Mostertrages | | | | | | |
| | | weniger als 60° | 60° bis unter 70° | 70° bis unter 80° | 80° bis unter 90° | 90° und mehr | Grad | Promille |
| % | | | | | | | | |
| 30 | Baden-Württemberg | 18 | 61 | 20 | 1 | - | 66 | 10,8 |
| 31 | Nordwürttemberg | 24 | 70 | 6 | - | - | 61 | 12,4 |
| 32 | Oberes Neckartal | - | 60 | 40 | - | - | 63 | 13,3 |
| 33 | Unteres Neckartal | 20 | 76 | 4 | - | - | 61 | 13,1 |
| 34 | Remstal | 14 | 72 | 14 | - | - | 64 | 11,1 |
| 35 | Enztal | 12 | 88 | - | - | - | 61 | 11,6 |
| 36 | Zabergäu | 37 | 63 | - | - | - | 59 | 12,9 |
| 37 | Kocher- und Jagsttal | 33 | 57 | 10 | - | - | 61 | 12,3 |
| 38 | Tauber- und Jagsttal | 57 | 43 | - | - | - | 57 | 9,7 |
| 39 | Nordbaden | 30 | 63 | 7 | - | - | 62 | 11,0 |
| 40 | Tauber- u. Maintal | 26 | 63 | 11 | - | - | 63 | 10,0 |
| 41 | Neckar- und Jagsttal | 50 | 50 | - | - | - | 58 | 10,8 |
| 42 | Bergstraße | 26 | 63 | 11 | - | - | 61 | 10,7 |
| 43 | Kraichgau | 26 | 74 | - | - | - | 62 | 11,6 |
| 44 | Pfinz - Enz- und Albtal | 42 | 42 | 16 | - | - | 62 | 10,8 |
| 45 | Südbaden | 5 | 47 | 46 | 2 | - | 68 | 10,3 |
| 46 | See- und Oberrhein | 14 | 72 | 14 | - | - | 65 | 8,9 |
| 47 | Oberes Rheintal | 100 | - | - | - | - | 58 | - |
| 48 | Markgräflerland | 5 | 56 | 36 | 3 | - | 67 | 10,0 |
| 49 | Kaiserstuhl | - | 12 | 88 | - | - | 71 | 10,5 |
| 50 | Breisgau | 5 | 39 | 51 | 5 | - | 67 | 10,5 |
| 51 | Ortenau u. Bühler- und Oberrhein | 3 | 59 | 38 | - | - | 67 | 10,4 |
| 52 | Südwestfalen-Lippe | - | 83 | 17 | - | - | 64 | 11,0 |
| 53 | Oberes Neckartal | - | 75 | 25 | - | - | 63 | 12,1 |
| 54 | Enztal | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | Bodenseeregion | - | 100 | - | - | - | 65 | 9,1 |
| 56 | Bayern | 41 | 46 | 11 | 2 | 0 | 63 | 10,9 |
| 57 | Unterfranken | 43 | 45 | 11 | 1 | 0 | 63 | 10,8 |
| 58 | Mittelfranken | 25 | 59 | 12 | 4 | - | 64 | 11,5 |
| 59 | Übrige Gebiete | 39 | 61 | - | - | - | 55 | 11,0 |
| 60 | Saarland | 70 | 30 | - | - | - | 50 | 18,0 |
| 61 | Bundesgebiet 1966 | 2 | 18 | 43 | 31 | 6 | 77 | 8,6 |
| 62 | 1967 | 6 | 28 | 39 | 21 | 6 | 75 | 10,7 |
| 63 | 1968 | 51 | 39 | 9 | 1 | 0 | 61 | 12,6 |

| Rotmost | | | | | | | | Lfd. Nr. |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|------|-------------|
| Mostgewicht nach Oechsle | | | | | Ø Most- gewicht | Ø Säure- gehalt | | |
| Anteil des Mostertrages | | | | | | | Grad | |
| weniger als 60° | 60° bis unter 70° | 70° bis unter 80° | 80° bis unter 90° | 90° und mehr | % | | | |
| 25 | 46 | 26 | 3 | - | 65 | 11,9 | 30 | |
| 36 | 61 | 3 | - | - | 61 | 12,1 | 31 | |
| . | . | . | . | . | . | . | 32 | |
| 23 | 76 | 1 | - | - | 62 | 12,4 | 33 | |
| 54 | 38 | 8 | - | - | 63 | 11,3 | 34 | |
| 25 | 75 | - | - | - | 59 | 11,9 | 35 | |
| 58 | 42 | - | - | - | 58 | 11,9 | 36 | |
| 50 | 44 | 6 | - | - | 59 | 10,8 | 37 | |
| 60 | 20 | 20 | - | - | 55 | 11,0 | 38 | |
| 46 | 48 | 6 | - | - | 59 | 12,4 | 39 | |
| 20 | 70 | 10 | - | - | 63 | 11,3 | 40 | |
| 60 | 40 | - | - | - | 56 | 11,7 | 41 | |
| 33 | 56 | 11 | - | - | 59 | 12,1 | 42 | |
| 63 | 37 | - | - | - | 57 | 12,8 | 43 | |
| 50 | 40 | 10 | - | - | 62 | 11,9 | 44 | |
| 1 | 22 | 68 | 9 | - | 74 | 11,4 | 45 | |
| - | 86 | 14 | - | - | 67 | 11,7 | 46 | |
| - | 100 | - | - | - | 65 | 14,5 | 47 | |
| 5 | 10 | 76 | 9 | - | 74 | 11,2 | 48 | |
| - | 13 | 87 | - | - | 75 | 11,9 | 49 | |
| - | 15 | 73 | 12 | - | 74 | 11,2 | 50 | |
| - | 22 | 67 | 11 | - | 74 | 10,4 | 51 | |
| - | 63 | 25 | 12 | - | 66 | 11,1 | 52 | |
| - | 75 | - | 25 | - | 65 | 11,0 | 53 | |
| - | 50 | 50 | - | - | 70 | 11,9 | 54 | |
| - | 50 | 50 | - | - | 68 | 9,8 | 55 | |
| 15 | 50 | 27 | 8 | - | 69 | 12,5 | 56 | |
| 15 | 50 | 27 | 8 | - | 69 | 12,5 | 57 | |
| - | - | - | - | - | - | - | 58 | |
| - | - | - | - | - | - | - | 59 | |
| - | 100 | - | - | - | 60 | 7,0 | 60 | |
| 1 | 20 | 53 | 24 | 2 | 75 | 8,3 | 61 | |
| 4 | 27 | 44 | 20 | 5 | 74 | 9,4 | 62 | |
| 51 | 32 | 15 | 2 | - | 61 | 12,1 | 63 | |

| Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet | Jahr ¹⁾ | Silvaner | Riesling | Müller- Thurgau | Portugieser | Burgunder |
|--|--------------------|----------|----------|--------------------|-------------|-----------|
| Nordrhein-Westfalen | 1968 | . | . | . | . | . |
| | 1967 | 60,0 | 49,1 | 40,1 | 25,0 | 30,0 |
| Hessen | 1968 | 52,5 | 58,6 | 57,8 | 60,0 | 50,0 |
| | 1967 | 56,5 | 54,5 | 64,0 | 72,0 | 39,3 |
| Hess. Bergstraße | 1968 | 64,8 | 56,9 | 66,6 | - | - |
| Rheingau | 1968 | 49,2 | 58,7 | 56,7 | 60,0 | 50,0 |
| Rheinland-Pfalz | 1968 | 75,4 | 74,1 | 82,1 | 95,5 | 55,4 |
| | 1967 | 96,7 | 84,4 | 97,6 | 98,8 | 70,9 |
| Rheinland-Nassau | 1968 | 46,0 | 75,5 | 84,8 | 71,2 | 52,8 |
| Mittelrhein | 1968 | 56,6 | 52,3 | 62,7 | 79,7 | 55,8 |
| Nahe (RB Koblenz) | 1968 | 45,3 | 51,5 | 56,9 | 44,4 | 50,0 |
| Obermosel | 1968 | 74,2 | 58,4 | 81,9 | - | - |
| Saar | 1968 | . | 67,8 | 87,4 | - | - |
| Ruwer | 1968 | . | 59,4 | 67,6 | - | - |
| Mittelmosel | 1968 | 92,6 | 82,7 | 119,9 | . | . |
| Untermosel | 1968 | . | 83,1 | 110,9 | - | . |
| Ahr | 1968 | . | 90,0 | 76,6 | 72,8 | 52,8 |
| Lahn | 1968 | . | 50,0 | 40,0 | . | 38,0 |
| Rheinhausen | 1968 | 75,1 | 65,0 | 78,4 | 89,0 | 57,8 |
| Worms u. Umg. | 1968 | 77,4 | 61,8 | 81,8 | 99,6 | 63,7 |
| Oppenheim u. Umg. | 1968 | 86,8 | 72,7 | 79,5 | 84,6 | 74,6 |
| Mainz u. Umg. | 1968 | 80,7 | 71,4 | 86,2 | 76,9 | . |
| Ingelheim u. Umg. | 1968 | 83,7 | 66,0 | 82,3 | 88,4 | 51,5 |
| Wiesbach | 1968 | 66,9 | 62,1 | 69,3 | 81,2 | 70,0 |
| Bingen u. Umg. | 1968 | 65,0 | 67,0 | 70,0 | 70,0 | 62,3 |
| Nahe (Rheinhausen) | 1968 | 65,8 | 50,6 | 68,8 | 80,9 | 70,3 |
| Alzey u. Umg. | 1968 | 71,9 | 62,4 | 76,5 | 84,4 | 72,0 |
| Pfalz | 1968 | 80,9 | 72,5 | 86,2 | 99,8 | 60,4 |
| Mittelhaardt | 1968 | 82,9 | 77,1 | 88,2 | 90,2 | 51,7 |
| Oberhaardt | 1968 | 81,0 | 67,2 | 85,8 | 107,8 | 63,9 |
| Unterhaardt mit Zellertal | 1968 | 85,6 | 67,8 | 92,5 | 113,4 | 65,6 |
| Nahe (Pfalz) | 1968 | 54,3 | 61,5 | 60,3 | 50,0 | 49,7 |

1) 1968 Vorläufige Ergebnisse.

wichtiger Rebsorten

je ha

| Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet | Jahr | Silvaner | Riesling | Müller- Thurgau | Portugieser | Burgunder |
|--|------------------|----------|----------|--------------------|-------------|-----------|
| Baden-Württemberg | 1968 | 80,4 | 61,1 | 91,3 | 87,2 | 77,6 |
| | 1967 | 85,9 | 70,4 | 99,8 | 83,5 | 74,5 |
| Nordwürttemberg | 1968 | 68,3 | 62,4 | 62,4 | 88,0 | 77,2 |
| | Oberes Neckartal | 1968 | 44,7 | . | 42,0 | 20,0 |
| Unteres Neckartal | 1968 | 67,7 | 61,6 | 63,4 | 83,7 | 78,5 |
| Remstal | 1968 | 74,1 | 69,5 | 68,4 | 73,2 | . |
| Enztal | 1968 | 78,8 | 63,6 | 76,1 | 95,3 | 71,6 |
| Zabergäu | 1968 | 91,3 | 66,4 | 55,2 | 93,8 | 79,6 |
| Kocher- u. Jagsttal | 1968 | 60,8 | 51,0 | 35,6 | 88,9 | 64,4 |
| Tauber- u. Jagsttal | 1968 | 75,7 | 64,9 | 79,9 | 119,5 | . |
| Nordbaden | 1968 | 63,7 | 48,7 | 73,8 | 87,0 | 63,0 |
| Tauber- u. Maintal | 1968 | 47,4 | 25,6 | 46,7 | 56,3 | . |
| Neckar- u. Jagsttal | 1968 | 68,5 | 60,3 | 63,8 | 55,3 | 27,5 |
| Bergstraße | 1968 | 76,5 | 48,0 | 79,7 | 70,0 | 77,6 |
| Kraichgau | 1968 | 64,9 | 47,9 | 81,7 | 99,3 | 57,2 |
| Pfinz-, Enz- u. Alb- tal | 1968 | 87,0 | 75,6 | 99,4 | 114,9 | 60,2 |
| Südbaden | 1968 | 108,6 | 61,8 | 105,0 | 81,4 | 78,1 |
| Seegegend | 1968 | 130,0 | 61,8 | 107,3 | 100,0 | 92,3 |
| Oberes Rheintal | 1968 | 80,0 | - | 97,0 | - | 85,8 |
| Markgräflerland | 1968 | 89,1 | 57,6 | 100,0 | 80,0 | 71,8 |
| Kaiserstuhl | 1968 | 115,8 | 52,4 | 111,7 | . | 84,4 |
| Breisgau | 1968 | 80,5 | 62,8 | 106,6 | . | 79,8 |
| Ortenau u. Bühler- gegend | 1968 | 61,7 | 62,4 | 87,8 | 73,1 | 63,0 |
| Südwürttemberg-Hohenzollern | 1968 | 56,5 | 20,0 | 68,7 | 41,6 | 57,8 |
| Oberes Neckartal | 1968 | 56,5 | 20,0 | 61,8 | 41,6 | 52,7 |
| Enztal | 1968 | - | - | - | - | - |
| Bodenseegebiet/ | 1968 | - | - | 80,8 | - | 63,0 |
| Bayern | 1968 | 55,0 | 57,6 | 57,3 | 51,0 | 37,8 |
| | 1967 | 40,0 | 42,1 | 45,2 | 40,1 | 32,8 |
| Unterfranken | 1968 | 55,0 | 58,0 | 57,1 | 51,0 | 37,8 |
| Mittelfranken | 1968 | 54,7 | 40,0 | 61,3 | - | - |
| Übrige Gebiete | 1968 | - | - | 57,5 | - | - |
| Saarland | 1968 | . | . | 95,5 | - | 130,8 |
| | 1967 | 100,0 | 100,0 | 101,7 | - | 150,0 |
| Bundesgebiet | 1968 | 74,1 | 70,7 | 81,9 | 94,0 | 74,3 |
| | 1967 | 91,7 | 78,9 | 94,6 | 96,0 | 73,0 |

7. Mostgewicht und Säuregehalt nach Ländern

| Berichtsgegenstand | Nordrh.- Westf. | Hessen | Rheinld.- Pfalz | Baden- Württbq. | Bayern | Saar- land | Bundesgebiet | | |
|--|--------------------|--------|--------------------|--------------------|--------|---------------|--------------|---------|----------|
| | | | | | | | Oktober | Oktober | November |
| | | | | | | | 1968 1) | | |
| Weißmost | | | | | | | | | |
| Ertrag hl je ha | 40,0 | 58,3 | 77,8 | 80,6 | 56,1 | 98,7 | 76,3 | 88,5 | 87,8 |
| Mostmenge in 1 000 hl | 1 | 188 | 3 460 | 730 | 129 | 7 | 4 515 | 5 165,3 | 5 120,7 |
| " " % | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 90° und mehr | . | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 5 | 6 |
| 80° bis unter 90° | . | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 18 | 21 |
| 70° " " 80° | . | 8 | 6 | 20 | 11 | - | 9 | 36 | 39 |
| 60° " " 70° | . | 47 | 34 | 61 | 46 | 30 | 39 | 32 | 28 |
| weniger als 60° Oechsle | . | 43 | 59 | 18 | 41 | 70 | 51 | 9 | 6 |
| Durchschnittl. Mostgewicht in Graden nach Oechsle | . | 61 | 60 | 66 | 63 | 50 | 61 | - | - |
| Oktober 1967 | 80 | 76 | 72 | 76 | 80 | 61 | - | 73 | - |
| November 1967 | 76 | 75 | 74 | 80 | 81 | 63 | - | - | 75 |
| Durchschnittl. Säuregehalt in von Tausend (‰) | . | 13,9 | 12,9 | 10,8 | 10,9 | 18,0 | 12,6 | - | - |
| Oktober 1967 | 9,5 | 11,1 | 11,2 | 9,1 | 8,4 | 14,0 | - | 10,8 | - |
| November 1967 | 9,6 | 11,5 | 11,0 | 9,0 | 8,3 | 15,0 | - | - | 10,7 |
| Rotmost | | | | | | | | | |
| Ertrag hl je ha | 40,0 | 50,9 | 93,3 | 78,9 | 43,8 | 130,8 | 84,8 | 86,3 | 85,3 |
| Mostmenge in 1 000 hl | 0 | 3 | 440 | 494 | 1 | 0 | 938 | 959,8 | 948,6 |
| " " % | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 90° und mehr | . | - | - | - | - | - | - | 7 | 5 |
| 80° bis unter 90° | . | 1 | 0 | 3 | 8 | - | 2 | 19 | 20 |
| 70° " " 80° | . | 55 | 2 | 26 | 27 | - | 15 | 40 | 44 |
| 60° " " 70° | . | 12 | 16 | 46 | 50 | 100 | 32 | 30 | 27 |
| weniger als 60° Oechsle | . | 32 | 82 | 25 | 15 | - | 51 | 4 | 4 |
| Durchschnittl. Mostgewicht in Graden nach Oechsle | . | 68 | 57 | 65 | 69 | 60 | 61 | - | - |
| Oktober 1967 | 75 | 75 | 69 | 77 | 81 | 72 | - | 73 | - |
| November 1967 | 78 | 80 | 70 | 78 | 81 | 72 | - | - | 74 |
| Durchschnittl. Säuregehalt in von Tausend (‰) | . | 12,4 | 12,3 | 11,9 | 12,5 | 7,0 | 12,1 | - | - |
| Oktober 1967 | 10,7 | 11,1 | 9,1 | 9,9 | 10,0 | 8,0 | - | 9,5 | - |
| November 1967 | 12,9 | 10,3 | 9,1 | 9,8 | 10,1 | 8,0 | - | - | 9,4 |

1) 1968 Vorläufige Ergebnisse.