

STATISTISCHES  
BUNDESAMT  
WIESBADEN

FACHSERIE **B**

# LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI

**Reihe 2**

**Gartenbau und Weinwirtschaft**

**III. Weinwirtschaft**

**Stand der Reben**

**Juni 1969**



Bestellnummer : 210230 - 690002

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

## Inhalt

	Seite
Vorbemerkung . . . . .	3
Tabellenteil	
1. Allgemeine Angaben über Witterung und Entwicklung der Reben . . . . .	4
2. Allgemeiner Beginn der Blüte . . . . .	5
3. Durchschnittliche Dauer der Blüte . . . . .	6
4. Begutachtung des Standes der Reben . . . . .	7

### Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden

. = kein Nachweis vorhanden

Die Angaben beziehen sich auf die Länder mit Weinbau

Erschienen im Juli 1969

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis DM -,50

Ergebnisse für die einzelnen Länder werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer C II 4 veröffentlicht.

### Vorbemerkung

In fast zwei Drittel aller Bezirksbezirke wurde die Sonnenscheindauer als zu gering und in reichlich der Hälfte der Bezirke der Temperaturverlauf als ungünstig bezeichnet. Die Niederschläge wurden in 42 % der Meldungen als zu hoch angesehen. Die Wetterschäden hatten etwa den gleichen Umfang wie vor einem Jahr. Im Bericht vom Vormonat und im Juni des Vorjahres fanden Sonnenscheindauer, Temperaturverlauf und Niederschläge eine deutlich günstigere Beurteilung.

Der Gescheinsansatz wurde weniger gut benotet als 1968, und zwar in 2 % der abgegebenen Meldungen als schlecht, in 70 % als mittel und in 28 % als gut. Der Verlauf der Blüte wurde von 31 % der Berichterstatter als schlecht, von 62 % als mittel und nur von 7 % als gut bezeichnet. Im Juni 1968 war eine wesentlich bessere Benotung abgegeben worden.

Der allgemeine Beginn der Blüte lag bei den in die Feststellung einbezogenen Rebsorten etwas später als 1968, und zwar überwiegend in der Zeit vom 21. - 30. Juni. Die durchschnittliche Dauer der Blüte war geringfügig länger als 1968. In den Meldungen überwogen die Angaben über eine 8- bis 10-tägige Blühdauer.

Die Note für den Stand der Reben war im Durchschnitt der weinbautreibenden Länder mit 2,5 etwas schwächer als im Vormonat und im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Besonders ungünstige Benotungen gegenüber dem Vormonat erfuhren vor allem die Weinbaugebiete Kaiserstuhl und Enztal. Die Weinbaugebiete Hessische Bergstraße, Mittelrhein, Nahe (Rhh.), Obermosel, Mainz und Umgebung, Bingen und Umgebung sowie das Neckar- und Jagsttal wurden geringfügig besser eingestuft.

1. Allgemeine Angaben über Witterung und Entwicklung der Reben Juni 1969

% der ausgewerteten Meldungen

Berichtsgegenstand und Beurteilung	Nord- rhein- West- falen	Hessaen	Rhein- land- Pfalz	Baden- Württem- berg	Bayern	Saar- land	Insgesamt		
							Juni	Mai	Juni
							1969		1968
<b>Wetterschäden</b>									
keine	100	91	77	80	66	100	78	92	71
schwache	-	6	16	16	19	-	16	6	18
mittlere	-	-	5	3	10	-	4	2	8
starke	-	3	2	1	5	-	2	0	3
<b>Niederschläge</b>									
zu gering	-	-	-	-	-	-	-	0	1
ausreichend	75	68	58	53	81	100	58	82	81
zu hoch	25	32	42	47	19	-	42	18	18
<b>Temperaturverlauf</b>									
ungünstig	50	38	56	52	26	29	51	28	37
normal	50	56	44	43	66	71	46	58	56
günstig	-	6	-	5	8	-	3	14	7
<b>Sonnenscheindauer</b>									
zu gering	50	59	67	62	44	71	62	.	51
genügend	50	38	33	37	56	29	37	.	48
reichlich	-	3	-	1	-	-	1	.	1
<b>Witterung für die Reben</b>									
schlecht	25	12	28	19	10	-	22	.	13
mittel	75	76	72	71	77	100	72	.	71
gut	-	12	-	10	13	-	6	.	16
<b>Geschehensansatz</b>									
schlecht	-	3	1	2	2	-	2	.	1
mittel	50	55	75	71	44	100	70	.	31
gut	50	42	24	27	54	-	28	.	68
<b>Verlauf der Blüte</b>									
schlecht	25	16	41	29	15	-	31	.	10
mittel	75	72	56	62	78	-	62	.	64
gut	-	12	3	9	7	100	7	.	26
<b>Durchführung der Pflegearbeiten</b>									
vollständig	75	87	57	80	76	100	70	73	77
unvollständig	25	13	43	20	24	-	30	27	23

2. Allgemeiner Beginn der Blüte Juni 1969

% der ausgewerteten Meldungen

Rebsorte	Datum	Nord- rhein- West- falen	Hessen	Rhein- land- Pfalz	Baden- Württem- berg	Bayern	Saar- land	Insgesamt	
								1969	1968
Silvaner	bis 10.6.	-	-	-	-	-	-	-	1
	vom 11. - 20.6.	100	39	12	26	17	-	19	47
	" 21. - 30.6.	-	61	63	56	74	-	62	49
	nach dem 30.6.	-	-	25	18	9	-	19	3
Riesling	bis 10.6.	-	-	-	0	-	-	0	1
	vom 11. - 20.6.	25	34	17	31	25	-	23	43
	" 21. - 30.6.	75	63	61	54	69	-	59	51
	nach dem 30.6.	-	3	22	15	6	-	18	5
Müller-Thurgau	bis 10.6.	-	3	-	1	-	-	0	3
	vom 11. - 20.6.	25	55	26	53	36	-	39	60
	" 21. - 30.6.	75	42	63	38	61	100	52	35
	nach dem 30.6.	-	-	11	8	3	-	9	2
Elbling	bis 10.6.	-	-	-	-	-	-	-	-
	vom 11. - 20.6.	-	-	9	-	-	-	8	7
	" 21. - 30.6.	-	-	78	-	-	-	64	75
	nach dem 30.6.	-	-	13	-	-	100	28	18
Ruländer	bis 10.6.	-	-	-	-	-	-	-	4
	vom 11. - 20.6.	-	-	-	43	-	-	41	69
	" 21. - 30.6.	-	-	-	45	-	100	47	27
	nach dem 30.6.	-	-	-	12	-	-	12	-
Portugieser	bis 10.6.	-	-	-	-	-	-	-	2
	vom 11. - 20.6.	33	66	25	39	29	-	31	66
	" 21. - 30.6.	67	34	64	48	71	-	58	31
	nach dem 30.6.	-	-	11	13	-	-	11	1
Burgunder	bis 10.6.	-	-	-	1	11	-	1	3
	vom 11. - 20.6.	-	50	20	48	33	100	43	66
	" 21. - 30.6.	100	50	57	40	56	-	44	30
	nach dem 30.6.	-	-	23	11	-	-	12	1

Zahl der Meldungen mit Angaben über Beginn der Blüte

Silvaner	2	23	330	264	81	-	700	794
Riesling	4	32	422	257	32	-	747	797
Müller-Thurgau	4	31	455	398	92	7	937	1 051
Elbling	-	-	32	-	-	7	39	28
Ruländer	-	-	-	185	-	7	192	222
Portugieser	3	3	242	187	14	-	449	492
Burgunder	1	4	49	247	9	1	311	321

3. Durchschnittliche Dauer der Blüte Juni 1969

% der ausgewerteten Meldungen

Rebsorte	Dauer	Nord- rhein- West- falen	Hessen	Rhein- land- Pfalz	Bade- n- Württem- berg	Bayern	Saar- land	Insgesamt	
								1969	1968
Silvaner	bis 4 Tage	-	-	3	14	-	-	6	5
	5 " 7 "	-	20	16	13	15	-	15	21
	8 " 10 "	-	47	48	46	47	-	47	46
	11 " 14 "	-	33	29	23	38	-	29	23
	15 Tage u.m.	-	-	4	4	-	-	3	3
Riesling	bis 4 Tage	-	-	2	8	-	-	4	4
	5 " 7 "	-	-	10	16	8	-	11	19
	8 " 10 "	-	57	40	43	58	-	43	45
	11 " 14 "	-	43	33	26	34	-	31	26
	15 Tage u.m.	-	-	15	7	-	-	11	6
Müller-Thurgau	bis 4 Tage	-	-	1	8	-	-	4	7
	5 " 7 "	-	24	16	17	21	-	17	21
	8 " 10 "	-	52	47	45	53	100	48	48
	11 " 14 "	-	24	30	25	26	-	26	20
	15 Tage u.m.	-	-	6	5	-	-	5	4
Elbling	bis 4 Tage	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 " 7 "	-	-	14	-	-	-	7	-
	8 " 10 "	-	-	43	-	-	100	72	82
	11 " 14 "	-	-	29	-	-	-	14	18
	15 Tage u.m.	-	-	14	-	-	-	7	-
Ruländer	bis 4 Tage	-	-	-	3	-	-	3	4
	5 " 7 "	-	-	-	19	-	-	17	23
	8 " 10 "	-	-	-	38	-	100	43	47
	11 " 14 "	-	-	-	27	-	-	25	20
	15 Tage u.m.	-	-	-	13	-	-	12	6
Portugieser	bis 4 Tage	-	-	3	13	-	-	6	8
	5 " 7 "	-	-	21	20	16	-	20	24
	8 " 10 "	-	-	45	42	67	-	45	49
	11 " 14 "	-	100	28	23	17	-	27	17
	15 Tage u.m.	-	-	3	2	-	-	2	2
Burgunder	bis 4 Tage	-	-	5	3	-	-	3	5
	5 " 7 "	-	-	20	17	25	-	18	21
	8 " 10 "	-	-	35	38	25	100	37	49
	11 " 14 "	-	100	20	33	50	-	32	21
	15 Tage u.m.	-	-	20	9	-	-	10	4

Zahl der Meldungen mit Angaben über durchschnittliche Dauer der Blüte

Silvaner	-	15	79	70	34	-	198	515
Riesling	-	14	133	74	12	-	233	481
Müller-Thurgau	-	21	182	168	47	7	425	703
Elbling	-	-	7	-	-	7	14	11
Ruländer	-	-	-	69	-	7	76	173
Portugieser	-	1	107	56	6	-	170	344
Burgunder	-	2	20	94	4	1	121	234

#### 4. Begutachtung des Standes der Reben 1969

Noten: 1,0 (sehr gut) = mehr als 3/4 Herbst, 2,0 (gut) = mehr als 1/2 bis 3/4 Herbst, 3,0 (mittel) = 1/2 Herbst, 4,0 (gering) = 1/4 bis 1/2 Herbst, 5,0 (sehr gering) = weniger als 1/4 Herbst.

Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Note		
	1969		1968
	Juni	Mai	Juni
Nordrhein-Westfalen	3,0	2,8	2,4
Hessen	2,4	2,2	2,1
Hessische Bergstraße	2,2	2,3	2,1
Rheingau	2,4	2,2	2,1
Rheinland-Pfalz	2,5	2,3	2,3
Rheinland-Nassau <sup>1)</sup>	.	.	2,3
Mittelrhein	2,4	2,5	2,2
Nahe (Koblenz)	2,7	2,6	2,3
Obermosel	2,2	2,3	2,4
Saar	2,4	2,2	2,3
Ruwer	2,4	2,4	2,5
Mittelmosel	2,2	2,1	2,2
Untermosel	2,3	2,2	2,3
Ahr	2,7	2,2	2,1
Lahn	2,8	2,2	2,3
Rheinhausen <sup>1)</sup>	.	.	2,3
Worms und Umgegend	2,5	2,4	2,3
Oppenheim und Umgegend	2,6	2,3	2,2
Mainz und Umgegend	2,4	2,5	2,1
Ingelheim und Umgegend	2,6	2,2	2,3
Wiesbach	2,7	2,3	2,4
Bingen und Umgegend	2,4	2,5	2,3
Nahe (Rheinhausen)	2,8	2,9	2,2
Alzey und Umgegend	2,7	2,5	2,2
Pfalz <sup>1)</sup>	.	.	2,3
Mittelhaardt	2,6	2,1	2,2
Oberhaardt	2,5	2,3	2,4
Unterhaardt mit Zellertal	2,7	2,2	2,1
Nahe (Pfalz)	2,7	2,6	2,6
Baden-Württemberg	2,6	2,3	2,2
Nordwürttemberg	2,6	2,2	2,2
Oberes Neckartal	2,6	2,6	2,7
Unteres Neckartal	2,6	2,2	2,3
Remstal	2,4	2,1	2,1
Enztal	2,8	2,4	2,2
Zabergäu	2,5	2,2	2,2
Kocher- und Jagsttal	2,3	2,3	2,4
Taubergengegend	2,4	2,2	1,6

1) Wegen Gebietsreform nicht nachgewiesen.-

#### 4. Begutachtung des Standes der Reben 1969

Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Note		
	1969		1968
	Juni	Mai	Juni
Nordbaden	2,6	2,4	2,2
Tauber- und Maintal	2,4	2,2	2,7
Neckar- und Jagsttal	2,0	2,3	2,9
Bergstraße	2,6	2,5	2,1
Kraichgau	2,7	2,4	2,1
Pfinz-, Enz- und Albthal	2,6	2,5	2,3
Südbaden	2,7	2,3	2,2
Seegegend	2,1	2,0	1,8
Oberes Rheintal	2,3	2,0	1,7
Markgräflerland	2,7	2,3	2,2
Kaiserstuhl	3,0	2,4	2,3
Breisgau	2,5	2,3	2,2
Ortenau und Bühlergegend	2,4	2,2	2,1
Südwürttemberg-Hohenzollern	2,5	2,2	2,8
Oberes Neckartal	2,4	2,2	3,0
Enztal	3,0	2,2	2,5
Bodenseegebiet	.	.	2,0
Bayern	2,4	2,2	2,2
Unterfranken	2,4	2,2	2,1
Mittelfranken	2,4	2,4	2,4
übrige Gebiete	2,6	2,6	.
Saarland	2,1	2,0	1,8
Bundesgebiet <sup>2)</sup>	2,5	2,3	2,3
1950	2,1	2,1	
1951	2,1	2,1	
1952	2,4	2,3	
1953	3,0	3,0	
1954	2,4	2,5	
1955	2,7	2,7	
1956	3,8	3,9	
1957	3,0	3,2	
1958	2,1	2,1	
1959	2,2	2,3	
1960	1,9	2,1	
1961	2,4	2,4	
1962	2,3	2,4	
1963	2,5	2,9	
1964	1,8	2,0	
1965	2,1	2,1	
1966	2,3	2,4	
1967	2,1	2,2	
1968	2,3	2,3	

2) 1959 und früher ohne Saarland.-