

FACHSERIE **B**

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI

Reihe 2

Gartenbau und Weinwirtschaft

III. Weinwirtschaft

Vorschätzung der Weinmosternte

Oktober 1969



Bestellnummer : 210230 - 690006

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	3
Tabellenteil:	
1. Allgemeine Angaben über die Witterung	4
2. Beurteilung des Weinmostes 1956 - 1969	4
3. Beginn der Lese	5
4. Rebflächen, Hektarerträge, Mostmengen, Güte des Mostes	
a) Weinmost insgesamt	6
b) Weißmost	10
c) Rotmost	14
5. Mostgewicht und Säuregehalt nach Weinbaugebieten . . .	18
6. Schätzung der Weinmosternte 1969 für ausgewählte Rebsorten	22
7. Mostgewicht und Säuregehalt nach Ländern	32

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden
- O = mehr als nichts, aber weniger als
die Hälfte der kleinsten Einheit,
die in der Tabelle zur Darstellung
gebracht wird.

Die Angaben beziehen sich auf die Länder mit Weinbau

Erschienen im Dezember 1969

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis: DM 2,--

Ergebnisse für die einzelnen Länder werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer C II 4 veröffentlicht.

Vorbemerkung

In der Berichtszeit vom 25. September bis zum 15. Oktober wurde der Witterungsverlauf für die diesjährige Weinmosternte günstiger als in den vorausgegangenen 4 Wochen beurteilt. Lediglich in der Benotung der Niederschläge, die von 50 % der Berichterstatter als zu gering angesehen wurden, kommt eine gewisse Abschwächung zum Ausdruck.

In den vorläufigen Noten über die Güte des Mostes ist die Beurteilung des Witterungsverlaufs eingegangen. Als sehr gut werden 9 % der Moste bezeichnet; das ist eine etwas günstigere Beurteilung als in dem etwa gleich gelagerten Jahr 1963. Als gut wurden 33 %, mittel 48 % und gering 10 % der Mostmenge eingestuft.

Das durchschnittliche Mostgewicht ist mit 69° Oechsle bei Weißmost und 72° bei Rotmost angegeben. Es entspricht damit genau der endgültigen Bewertung des Jahres 1963. Die Angaben über den Säuregehalt liegen in diesem Jahr dagegen geringfügig höher als 1963.

In diesem Jahre wurde erstmalig neben der vorläufigen Ertragsschätzung ausgewählter Rebsorten für diese das durchschnittliche Mostgewicht und der durchschnittliche Säuregehalt ermittelt. Die absolut höchsten durchschnittlichen Mostgewichte wurden aus der "Seegegend" für Silvaner mit 95° und aus dem "Remstal" für Gewürztraminer mit ebenfalls 95° Oechsle gemeldet. Diese Angaben sind jedoch von relativ kleinen Flächen ermittelt worden und können somit nicht als Maßstab für die übrigen Meldungen herangezogen werden.

Die Hauptlese setzte bei den frühreifenden Rebsorten wie Müller-Thurgau und Portugieser bereits im September und in der ersten Oktoberdekade ein. Bei den späteren Rebsorten wie Silvaner, Riesling und Burgunder erreichte die Lese in der 2. Oktoberdekade den Höhepunkt.

Die Vorschätzung des Hektarertrages ergab für den Weinmost insgesamt eine Abnahme gegenüber der Vorschätzung vom September. Die voraussichtliche Mostmenge wird sich aufgrund der neuen Ermittlung auf 5,64 Mill. hl gegenüber 5,78 Mill. hl im September belaufen. Von der diesjährigen Ernte werden ca 4,88 Mill. hl auf Weißmost und ca 0,76 Mill. hl auf Rotmost entfallen. Mit diesen Mengen scheint der diesjährige Jahrgang voraussichtlich nicht die endgültigen Ergebnisse aus den "Ergänzenden Erntetermineitlungen" (6,05 Mill. hl) des Vorjahres zu erreichen.

Während der Lese werden neben den Ertragsschätzungen mittels objektiver Messungen die endgültigen Ernteergebnisse festgestellt. Diese "Ergänzenden Erntetermineitlungen" können daher möglicherweise die durch Schätzung ermittelten Mosterträge sowohl nach oben als auch nach unten korrigieren.

1. Allgemeine Angaben über die Witterung

% der ausgewerteten Meldungen

Berichtsgegenstand und Beurteilung	Nordrhein- West- falen	Hessen	Rhein- land- Pfalz	Baden- Württem- berg	Bayern	Saar- land	Bundesgebiet		
							Oktober	September	September
							1969		1968
Wetterschäden									
keine	100	93	100	100	99	100	100	89	84
schwache	-	7	-	-	1	-	0	8	6
mittlere	-	-	-	-	-	-	-	2	6
starke	-	-	-	-	-	-	-	1	4
Niederschläge									
zu gering	-	42	48	47	70	-	50	4	0
ausreichend	100	58	52	53	30	100	50	93	8
zu hoch	-	-	-	-	-	-	-	3	92
Temperaturverlauf									
ungünstig	-	-	-	-	1	-	0	3	84
normal	25	18	18	11	15	-	15	38	15
günstig	75	82	82	89	84	100	85	59	1
Sonnenscheindauer									
zu gering	-	4	-	1	-	-	0	5	97
genügend	75	54	42	31	29	-	36	62	3
reichlich	25	42	58	68	71	100	64	33	-
Witterung für die Reben und Trauben									
schlecht	-	-	-	0	-	-	0	1	73
mittel	25	12	11	11	18	-	12	31	26
gut	75	88	89	89	82	100	88	68	1

2. Beurteilung des Weinmostes 1956 - 1969

Jahr	Güte des Mostes Weinmost insgesamt					Ø Mostgewicht		Ø Säuregehalt	
	sehr gut	gut	mittel	gering	sehr gering	weiß	rot	weiß	rot
	% der Mostmenge					Grad Oechsle		Promille	
1956	1	17	43	30	9	62	66	13,6	11,2
1957	6	37	46	10	1	69	68	13,0	12,3
1958	12	43	36	8	1	69	68	11,2	9,7
1959	68	27	4	1	-	92	85	7,4	6,6
1960	6	35	45	12	2	68	66	9,8	9,3
1961	13	46	34	7	0	73	70	9,3	7,8
1962	14	46	30	9	1	74	72	10,8	9,5
1963	8	36	41	13	2	69	72	10,5	9,0
1964	23	49	24	4	0	78	75	7,1	6,2
1965	1	14	44	32	9	61	61	13,7	12,6
1966	21	52	24	3	0	77	75	8,6	8,3
1967	12	41	37	9	1	73	73	10,8	9,5
1968 ¹⁾	0	11	44	36	9	61	61	12,6	12,1
1969 ¹⁾	9	33	48	10	0	69	72	11,3	10,7

1) Vorläufige Ergebnisse.

3. Beginn der Lese

% der ausgewerteten Meldungen

Rebsorten		vor dem	1. bis	11. bis	nach	Rebsorten		vor dem	1. bis	11. bis	nach
Länder mit Weinbau		1. Oktober	10. Okt.	20. Okt.	dem 20. Okt.	Länder mit Weinbau		1. Oktober	10. Okt.	20. Okt.	dem 20. Okt.
<u>Weißes Gewächs</u>						<u>Ruländer</u>					
<u>ilvaner</u>						Baden-Württemberg	1969	2	32	54	12
Bundesgebiet	1964	11	49	37	3	Saarland	1969	-	100	-	-
	1965	-	-	4	96						
	1966	0	38	46	16						
	1967	9	67	23	1						
	1968	6	54	31	9						
	1969	2	49	37	12						
<u>Portugieser</u>						<u>Rotes Gewächs</u>					
Nordrhein-Westfalen		-	50	50	-	Bundesgebiet	1964	54	40	5	1
Hessen		4	40	56	-		1965	-	7	34	59
Rheinland-Pfalz		2	74	19	5		1966	36	33	29	2
Baden-Württemberg		2	24	48	26		1967	62	33	5	0
Bayern		2	31	59	8		1968	50	33	15	2
Saarland		-	-	-	-		1969	46	42	14	1
						Nordrhein-Westfalen		-	50	50	-
<u>iesling</u>						Hessen	
Bundesgebiet	1964	6	29	52	13	Rheinland-Pfalz		80	18	1	1
	1965	-	-	2	98	Baden-Württemberg		12	67	20	1
	1966	0	24	46	30	Bayern		29	41	30	-
	1967	5	48	39	8	Saarland		-	-	-	-
	1968	3	31	37	29						
	1969	1	28	47	24						
Nordrhein-Westfalen		-	-	100	-	<u>Burgunder</u>					
Hessen		3	24	66	7	Bundesgebiet	1964	13	54	31	2
Rheinland-Pfalz		-	36	42	22		1965	-	2	15	83
Baden-Württemberg		2	15	52	31		1966	6	40	51	3
Bayern		-	19	66	15		1967	16	55	28	1
Saarland		-	-	-	-		1968	4	35	55	6
							1969	2	37	53	8
<u>Müller-Thurau</u>						Nordrhein-Westfalen		-	-	-	-
Bundesgebiet	1964	37	55	7	1	Hessen	
	1965	-	1	40	59	Rheinland-Pfalz	
	1966	27	51	21	1	Baden-Württemberg		1	36	54	9
	1967	70	27	2	1	Bayern		10	60	30	-
	1968	58	37	4	1	Saarland		100	-	-	-
	1969	57	38	4	1						
Nordrhein-Westfalen		-	75	25	-	<u>Schwarzriesling</u>					
Hessen		58	42	-	-	Baden-Württemberg	1969	6	52	37	5
Rheinland-Pfalz		73	24	2	1						
Baden-Württemberg		48	46	5	1	<u>Trollinger</u>					
Bayern		29	63	8	-	Baden-Württemberg	1969	0	11	69	20
Saarland		-	100	-	-						
<u>Elbling</u>						<u>Limberger</u>					
Saarland		-	100	-	-	Baden-Württemberg	1969	3	17	64	16
<u>Gutedel</u>											
Baden-Württemberg	1969	3	38	56	3						

4. Rebflächen, Hektarerträge, Most

a) Weinmost

Lfd. Nr.	Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Jahr ¹⁾	Im Ertrag stehende Rebfläche	Ertrag je Hektar	Erntemenge
			ha	hl	
1	<u>Nordrhein-Westfalen</u>	1969	22	41,5	912
2		1968	24	51,6	1 238
3	<u>Hessen</u>	1969	3 294	73,2	241 195
4		1968	3 290	64,5	212 189
5	Hessische Bergstraße Rheingau	1969	228	80,8	18 504
6		1969	3 066	72,6	222 691
7	<u>Rheinland-Pfalz</u>	1969	49 977	82,8	4 139 240
8		1968	49 187	88,2	4 339 136
9	Rheinland-Nassau ²⁾	1969	.	.	.
10	Mittelrhein	1969	932	70,5	65 698
11	Nahe (Koblenz)	1969	3 054	75,6	230 753
12	Obermosel	1969	820	106,1	86 981
13	Saar	1969	1 052	82,8	87 082
14	Ruwer	1969	431	70,7	30 485
15	Mittelmosel	1969	5 209	91,4	475 908
16	Untermosel	1969	2 695	85,5	230 421
17	Ahr	1969	533	71,8	38 280
18	Lahn	1969	12	68,3	820
19	Rheinhessen ²⁾	1969	.	.	.
20	Worms- und Umgegend	1969	5 054	83,5	421 923
21	Oppenheim und Umgegend	1969	1 403	64,0	89 816
22	Mainz und Umgegend	1969	898	66,2	59 468
23	Ingelheim und Umgegend	1969	1 386	78,0	108 140
24	Wiesbach	1969	1 817	82,9	150 606
25	Bingen und Umgegend	1969	374	75,7	28 320
26	Nahe (Rheinhessen)	1969	657	67,3	44 231
27	Alzey und Umgegend	1969	5 188	74,1	384 655
28	Pfalz ²⁾	1969	.	.	.
29	Mittelhaardt	1969	5 721	93,4	534 187
30	Oberhaardt	1969	10 110	86,0	868 969
31	Unterhaardt mit Zellertal	1969	2 123	80,0	169 843
32	Nahe (Pfalz)	1969	508	64,3	32 654

1) 1968 endgültige Ergebnisse (Ergänzende Erntemittlung).-- 2) Wegen Gebietsreform nicht nachgewiesen.

nennt die Güte des Mostes

insgesamt

Güte des Mostes					Lfd. Nr.
sehr gut	gut	mittel	gering	sehr gering	
A der Mostmenge					
-	36	64	-	-	1
1	2	65	30	2	2
11	64	22	3	-	3
1	8	46	36	9	4
9	59	32	-	-	5
11	64	22	3	-	6
5	26	56	13	0	7
1	10	47	34	8	8
.	9
5	30	50	15	-	10
6	27	53	14	-	11
2	23	61	14	0	12
4	26	52	18	-	13
2	19	65	14	-	14
4	27	53	16	0	15
8	25	59	8	-	16
5	28	52	15	-	17
2	18	64	16	-	18
.	19
7	30	55	8	-	20
6	23	65	6	-	21
7	30	57	6	-	22
8	28	61	3	-	23
5	28	52	15	-	24
1	28	58	13	-	25
6	26	51	17	-	26
4	25	61	10	0	27
.	28
2	20	59	19	0	29
6	27	55	12	0	30
4	24	57	15	0	31
9	29	50	12	-	32

4. Rebflächen, Hektarerträge, Most

a) Weinmost

Lfd. Nr.	Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Jahr ¹⁾	Im Ertrag stehende Rebfläche	Ertrag je Hektar	Ertomenge
			ha	hl	
33	<u>Baden-Württemberg</u>	1969	15 614	71,6	1 117 224
34		1968	15 318	83,1	1 349 822
35	Nordwürttemberg	1969	6 250	69,2	432 659
36	Oberes Neckartal	1969	40	47,9	1 914
37	Unteres Neckartal	1969	3 448	67,8	233 713
38	Remstal	1969	766	72,2	55 300
39	Enztal	1969	529	60,8	32 151
40	Zabergäu	1969	858	74,6	64 014
41	Kocher- und Jagsttal	1969	475	74,4	35 341
42	Tauberregion	1969	134	76,3	10 226
43	Nordbaden	1969	1 856	64,7	120 058
44	Tauber- und Maintal	1969	318	72,8	23 162
45	Neckar- und Jagsttal	1969	48	63,9	3 065
46	Bergstraße	1969	600	67,2	40 306
47	Kraichgau	1969	772	59,7	46 060
48	Pfinz-, Enz- und Albatal	1969	118	63,3	7 465
49	Südbaden	1969	7 482	75,3	563 049
50	Seegegend	1969	139	67,2	9 343
51	Oberes Rheintal	1969	26	85,2	2 216
52	Markgräflerland	1969	1 405	74,5	104 681
53	Kaiserstuhl	1969	2 722	74,1	201 649
54	Breisgau	1969	1 734	83,1	144 084
55	Ortenau- und Bühlerregion	1969	1 456	69,4	101 076
56	Südwestfalen-Hohenzollern ²⁾	1969	26	56,1	1 458
57	Oberes Neckartal	1969	20	65,1	1 301
58	Enztal	1969	5	13,6	68
59	<u>Bayern</u>	1969	2 353	57,9	136 313
60		1968	2 322	59,0	136 998
61	Unterfranken	1969	2 060	59,0	121 519
62	Mittelfranken	1969	287	50,6	14 510
63	Übrige Gebiete	1969	6	47,3	284
64	<u>Saarland</u>	1969	73	114,6	8 378
65		1968	73	112,4	8 215
66	<u>Bundesgebiet</u>	1969	71 333	79,1	5 643 262
67		November 1968	70 214	86,1	6 047 598
68		D 1963/68 ³⁾	69 105	83,9	5 797 396

1) 1968 endgültige Ergebnisse (Ergänzende Erntemittlung).- 2) Einschl. Tettng.- 3) Durchschnitt errechnet aus den end

mengen, Güte des Mostes

Insgesamt

Güte des Mostes					Lfd. Nr.
sehr gut	gut	mittel	gering	sehr gering	
% der Mostmenge					
20	51	25	3	1	33
1	26	55	16	2	34
20	60	18	2	0	35
13	55	25	7	-	36
20	63	16	1	0	37
31	57	12	0	-	38
15	54	28	3	-	39
17	54	21	8	-	40
9	61	28	2	0	41
38	38	21	3	0	42
19	54	23	4	0	43
4	58	34	4	0	44
12	73	14	1	-	45
25	48	23	4	-	46
23	60	16	1	-	47
3	33	37	27	-	48
21	44	30	4	1	49
55	22	17	6	-	50
6	84	10	-	-	51
2	38	52	8	-	52
32	35	27	3	3	53
18	58	23	1	-	54
23	46	27	4	-	55
8	59	25	8	-	56
9	55	27	9	-	57
2	79	19	-	-	58
16	52	29	3	0	59
1	18	47	29	5	60
15	54	28	3	0	61
27	37	36	0	-	62
-	23	77	-	-	63
31	54	15	-	-	64
-	-	22	78	-	65
9	33	48	10	0	66
0	14	49	30	7	67
12	35	36	14	3	68

gültigen Ergebnissen der Berichterstatterschätzungen.

4. Rebflächen, Hektarerträge, Most

b) Weiß

Lfd. Nr.	Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Jahr ¹⁾	Im Ertrag stehende Rebfläche	Ertrag je Hektar	Erntemenge
			ha	hl	
1	<u>Nordrhein-Westfalen</u>	1969	21	42,0	882
2		1968	22	48,3	1 062
3	<u>Hessen</u>	1969	3 233	73,7	238 194
4		1968	3 230	64,6	208 521
5	Hessische Bergstraße	1969	227	81,3	18 455
6	Rheingau	1969	3 006	73,1	219 739
7	<u>Rheinland-Pfalz</u>	1969	45 367	82,9	3 761 134
8		1968	44 470	85,9	3 820 357
9	Rheinland-Nassau ²⁾	1969	.	.	.
10	Mittelrhein	1969	921	70,5	64 934
11	Nahe (Koblenz)	1969	3 034	75,5	229 159
12	Obermosel	1969	820	106,1	86 981
13	Saar	1969	1 052	82,8	87 082
14	Ruwer	1969	431	70,7	30 485
15	Mittelmosel	1969	5 208	91,4	475 828
16	Untermosel	1969	2 695	85,5	230 421
17	Ahr	1969	213	74,6	15 896
18	Lahn	1969	11	69,1	760
19	Rheinhessen ²⁾	1969	.	.	.
20	Worms und Umgegend	1969	4 659	84,0	391 276
21	Oppenheim und Umgegend	1969	1 398	64,0	89 440
22	Mainz und Umgegend	1969	823	66,7	54 887
23	Ingelheim und Umgegend	1969	1 052	82,3	86 536
24	Wiesbach	1969	1 677	84,6	141 794
25	Bingen und Umgegend	1969	352	76,2	26 823
26	Nahe (Rheinhessen)	1969	622	67,4	41 916
27	Alzey und Umgegend	1969	4 952	74,1	367 060
28	Pfalz ²⁾	1969	.	.	.
29	Mittelhaardt	1969	4 179	93,1	389 258
30	Oberhaardt	1969	9 373	86,3	809 091
31	Unterhaardt mit Zellertal	1969	1 390	78,5	109 048
32	Nahe (Pfalz)	1969	505	64,3	32 459

1) 1968 endgültige Ergebnisse (Ergänzende Erntemittlung).- 2) Wegen Gebietsreform nicht nachgewiesen.

mengen, Güte des Mostes

most

Güte des Mostes					Lfd. Nr.
sehr gut	gut	mittel	gering	sehr gering	
% der Mostmenge					
-	34	66	-	-	1
1	2	65	29	3	2
11	64	22	3	-	3
1	8	46	36	9	4
9	59	32	-	-	5
11	64	22	3	-	6
5	27	56	12	0	7
0	11	46	34	9	8
.	9
5	30	50	15	-	10
6	27	53	14	-	11
2	23	61	14	0	12
4	26	52	18	-	13
2	19	65	14	-	14
4	27	53	16	0	15
8	25	59	8	-	16
4	28	55	13	-	17
2	18	64	16	-	18
.	19
7	31	55	7	-	20
6	23	65	6	-	21
7	31	57	5	-	22
8	31	61	-	-	23
5	29	51	15	-	24
1	28	58	13	-	25
6	26	51	17	-	26
4	25	61	10	0	27
.	28
2	20	60	18	0	29
6	27	55	12	-	30
5	27	53	15	0	31
9	29	50	12	-	32

4. Rebflächen, Hektarerträge, Most

b) Weiß

Lfd. Nr.	Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Jahr ¹⁾	Im Ertrag stehende Rebfläche	Ertrag je Hektar	Erntemenge	
			ha	hl		
33	Baden-Württemberg	1969	9 769	75,3	735 236	
34		1968	9 062	86,2	781 326	
35	Nordwürttemberg	1969	2 743	73,1	200 455	
36		Oberes Neckartal	1969	39	47,9	1 867
37		Unteres Neckartal	1969	1 399	70,1	98 035
38		Remstal	1969	341	76,2	25 986
39		Enztal	1969	108	69,5	7 508
40		Zabergäu	1969	342	82,4	28 189
41		Kocher- und Jagsttal	1969	393	75,7	29 740
42		Tauber- und Jagsttal	1969	121	75,5	9 130
43	Nordbaden	1969	1 447	66,1	95 613	
44		Tauber- und Maintal	1969	285	75,0	21 365
45		Neckar- und Jagsttal	1969	38	67,0	2 547
46		Bergstraße	1969	479	68,0	32 551
47		Kraichgau	1969	587	59,7	35 037
48		Pfinz-, Enz- und Albtal	1969	58	70,9	4 113
49		Südbaden	1969	5 569	78,7	438 525
50			Seegegend	1969	76	72,4
51	Oberes Rheintal		1969	4	122,5	490
52	Markgräflerland		1969	1 309	75,0	98 147
53	Kaiserstuhl		1969	1 980	77,5	153 410
54	Breisgau		1969	1 222	90,2	110 168
55	Ortenau und Bühler- und Oberrhein		1969	978	72,4	70 804
56	Südwestfalen-Lippe		1969	10	64,3	643
57		Oberes Neckartal	1969	8	68,1	545
58		Enztal	1969	1	23,0	23
59	Bayern	1969	2 320	58,1	134 890	
60		1968	2 290	59,1	135 303	
61		Unterfranken	1969	2 027	59,2	130 096
62		Mittelfranken	1969	287	50,6	14 510
63		Übrige Gebiete	1969	6	47,3	284
64	Saarland	1969	73	114,6	8 359	
65		1968	73	112,3	8 197	
66	Bundesgebiet	1969	60 783	80,3	4 878 695	
67		November	1968	59 147	83,8	4 954 766
68		D 1963/68 ³⁾	1963/68	57 800	83,8	4 844 438

1) 1968 endgültige Ergebnisse (Ergänzende Erntemittlung).- 2) Einschl. Tettnang.- 3) Durchschnitt errechnet aus den

mengen, Güte des Mostes

most

Güte des Mostes					Lfd. Nr.
sehr gut .	gut	mittel	gering	sehr gering	
% der Mostmenge					
18	50	28	3	1	33
1	25	55	17	2	34
16	60	21	3	0	35
12	55	26	7	-	36
18	62	18	2	0	37
19	67	14	0	-	38
19	41	33	7	-	39
7	57	25	11	-	40
9	62	27	1	1	41
41	35	22	2	-	42
18	57	22	3	0	43
4	61	32	3	0	44
14	75	11	-	-	45
23	51	23	3	-	46
24	61	15	0	-	47
3	37	43	17	-	48
20	43	32	4	1	49
48	24	17	11	-	50
29	62	9	-	-	51
2	37	53	3	-	52
32	36	27	2	3	53
15	58	25	2	-	54
22	47	27	4	-	55
6	67	24	3	-	56
7	64	26	3	-	57
-	48	52	-	-	58
16	52	29	3	0	59
1	18	47	29	5	60
15	54	28	3	0	61
27	37	36	0	-	62
-	23	77	-	-	63
31	54	15	-	-	64
-	-	22	78	-	65
8	33	49	10	0	66
0	13	48	31	8	67
11	35	36	15	3	68

endgültigen Ergebnissen der Berichterstatterschätzungen.

4. Rebflächen, Hektarerträge, Most

c) Rot

Lfd. Nr.	Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Jahr ¹⁾	Im Ertrag stehende Rebfläche	Ertrag je Hektar	Erntemenge
			ha	hl	
1	<u>Nordrhein-Westfalen</u>	1969	1	30,0	30
2		1968	2	88,0	176
3	<u>Hessen</u>	1969	61	49,2	3 001
4		1968	60	61,1	3 668
5	Hessische Bergstraße	1969	1	49,2	49
6	Rheingau	1969	60	49,2	2 952
7	<u>Rheinland-Pfalz</u>	1969	4 610	82,0	378 106
8		1968	4 717	110,0	518 779
9	Rheinland-Nassau ²⁾	1969	.	.	.
10	Mittelrhein	1969	11	69,5	764
11	Nahe (Koblenz)	1969	20	79,7	1 594
12	Obermosel	1969	0	.	.
13	Saar	1969	-	-	-
14	Ruwer	1969	0	.	.
15	Mittelmosel	1969	1	.	.
16	Untermosel	1969	0	.	.
17	Ahr	1969	320	70,0	22 384
18	Lahn	1969	1	.	.
19	Rheinhessen ²⁾	1969	.	.	.
20	Worms und Umgegend	1969	395	77,6	30 647
21	Oppenheim und Umgegend	1969	5	.	.
22	Mainz und Umgegend	1969	75	61,1	4 581
23	Ingelheim und Umgegend	1969	334	64,7	21 604
24	Wiesbach	1969	140	62,9	8 812
25	Bingen und Umgegend	1969	22	68,0	1 497
26	Nahe (Rheinhessen)	1969	35	66,1	2 315
27	Alzey und Umgegend	1969	236	74,6	17 595
28	Pfalz ²⁾	1969	.	.	.
29	Mittelhaardt	1969	1 542	94,0	144 929
30	Oberhaardt	1969	737	81,2	59 878
31	Unterhaardt	1969	733	82,9	60 795
32	Nahe (Pfalz)	1969	3	.	.

*) Einschl. Most aus gemischten Beständen.- 1) 1968 endgültige Ergebnisse.- (Ergänzende Erntermittlung).- 2) Wegen Gebiets

menge, Güte des Mostes

most*)

Güte des Mostes					Lfd. Nr.
sehr gut	gut	mittel	gering	sehr gering	
% der Mostmenge					
-	100	-	-	-	1
-	-	63	37	-	2
2	55	36	7	-	3
-	5	51	27	17	4
-	72	28	-	-	5
2	55	36	7	-	6
4	20	58	18	0	7
0	7	50	38	5	8
.	9
4	25	59	12	-	10
0	19	62	19	-	11
.	12
-	-	-	-	-	13
.	14
.	15
.	16
6	28	50	16	-	17
.	18
.	19
4	20	62	14	-	20
.	21
4	19	64	13	-	22
7	17	61	15	-	23
0	18	64	18	-	24
-	20	60	20	-	25
6	22	55	17	-	26
4	23	58	15	-	27
.	28
3	20	56	21	0	29
5	21	55	19	0	30
3	19	64	14	0	31
.	32

reform nicht nachgewiesen.

4. Rebflächen, Hektarerträge, Most

c) Rot

Lfd. Nr.	Land Verwaltungsbezirk Weinbauggebiet	Jahr ¹⁾	Im Ertrag stehende Rebfläche	Ertrag je Hektar	Erntemenge
			ha		hl
33	<u>Baden-Württemberg</u>	1969	5 845	65,4	381 988
34		1968	6 256	90,9	568 496
35	Nordwürttemberg	1969	3 507	66,2	232 204
36	Oberes Neckartal	1969	1	47,0	47
37	Unteres Neckartal	1969	2 049	66,2	135 678
38	Remstal	1969	425	69,0	29 134
39	Enztal	1969	421	58,5	24 643
40	Zabergäu	1969	516	69,4	35 825
41	Kocher- und Jagsttal	1969	82	68,3	5 601
42	Tauber- und Jagsttal	1969	13	84,3	1 096
43	Nordbaden	1969	409	59,8	24 445
44	Tauber- und Maintal	1969	33	54,5	1 797
45	Neckar- und Jagsttal	1969	10	51,8	518
46	Bergstraße	1969	121	64,1	7 755
47	Kraichgau	1969	185	59,6	11 023
48	Pfinz-, Enz- und Albtal	1969	60	55,9	3 352
49	Südbaden	1969	1 913	65,1	124 524
50	See- und Oberrhein- gegend	1969	63	60,9	3 837
51	Oberes Rheintal	1969	22	78,5	1 726
52	Markgräflerland	1969	96	68,1	6 534
53	Kaiserstuhl	1969	742	65,0	48 239
54	Breisgau	1969	512	66,2	33 916
55	Ortenau- und Bühler- gegend	1969	478	63,3	30 272
56	Südwestfalen-Lippe Hohenzollern ²⁾	1969	16	50,9	815
57	Oberes Neckartal	1969	12	63,0	756
58	Enztal	1969	4	11,3	45
59	<u>Bayern</u>	1969	33	43,1	1 423
60		1968	32	53,0	1 695
61	Unterfranken	1969	33	43,1	1 423
62	Mittelfranken	1969	-	-	-
63	Übrige Gebiete	1969	-	-	-
64	<u>Saarland</u>	1969	0	135,0	19
65		1968	0	130,8	18
66	<u>Bundesgebiet</u>	1969	10 550	72,5	764 567
67		November 1968	11 067	98,7	1 092 832
68		D 1963/68 ³⁾	11 305	84,3	952 958

*) Einschl. Most aus gemischten Beständen.- 1) 1968 endgültige Ergebnisse (Ergänzende Erntemittlung).- 2) Einschl.

mengen, Güte des Mostes
most*)

Güte des Mostes					Lfd. Nr.
sehr gut	gut	mittel	gering	sehr gering	
% der Mostmenge					
25	53	19	3	0	33
2	27	55	14	2	34
24	59	15	2	0	35
64	34	2	-	-	36
22	64	13	1	-	37
42	49	9	-	-	38
13	58	27	2	-	39
25	52	18	5	-	40
10	56	29	4	1	41
18	61	14	5	2	42
22	43	26	9	-	43
5	33	57	5	-	44
3	58	32	7	-	45
33	36	24	7	-	46
23	54	22	1	-	47
3	27	30	40	-	48
29	44	23	3	1	49
66	19	15	-	-	50
-	90	10	-	-	51
4	60	33	3	-	52
34	31	28	4	3	53
28	57	15	0	-	54
24	47	25	4	-	55
11	52	25	12	-	56
11	49	27	13	-	57
2	96	2	-	-	58
14	42	42	1	1	59
0	23	40	24	13	60
14	42	42	1	1	61
-	-	-	-	-	62
-	-	-	-	-	63
-	100	-	-	-	64
-	-	100	-	-	65
15	37	38	10	0	66
1	18	53	25	3	67
13	37	36	12	2	68

Tettnang.- 3) Durchschnitt errechnet aus den endgültigen Ergebnissen der Berichterstatterschätzungen.

5. Mostgewicht und Säure

Lfd. Nr.	Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Weißmost						
		Mostgewicht nach Oechsle					Ø Most- gewicht	Ø Säure- gehalt
		Anteil des Mostertrages						
		weniger als 60°	60° bis unter 70°	70° bis unter 80°	80° bis unter 90°	90° und mehr	%	%
							Grad	‰
1	Nordrhein-Westfalen	10	20	66	4	-	70	10,3
2	Hessen	13	35	43	7	2	74	12,2
3	Bergstraße	4	47	45	4	-	72	13,0
4	Rheingau	13	35	43	7	2	74	12,2
5	Rheinland-Pfalz	14	52	30	4	0	67	11,5
6	Rheinland-Nassau ¹⁾
7	Mittelrhein	17	65	16	2	0	65	11,4
8	Nahe (Koblenz)	12	61	22	5	0	67	10,5
9	Obermosel	71	28	1	0	-	58	13,3
10	Saar	14	66	17	3	-	66	13,5
11	Ruwer	22	58	18	2	-	65	14,9
12	Mittelmosel	21	48	24	7	0	67	12,0
13	Untermosel	28	45	19	8	0	66	12,9
14	Ahr	6	73	21	0	-	67	10,3
15	Lahn	23	68	9	0	-	64	12,0
16	Rheinhessen ¹⁾
17	Worms und Umgegend	1	60	36	3	0	69	10,6
18	Oppenheim u. Umgebung	-	48	48	4	0	71	10,3
19	Mainz und Umgegend	0	43	51	6	0	71	10,9
20	Ingelheim und Umgegend	0	42	51	7	0	72	10,5
21	Wiesbach	11	46	40	3	-	69	10,4
22	Bingen und Umgegend	10	58	30	2	-	67	10,2
23	Nahe (Rheinhessen)	10	51	36	3	0	68	11,0
24	Alzey und Umgegend	5	54	39	2	0	69	10,7
25	Pfalz ¹⁾
26	Mittelhaardt	11	48	33	8	0	69	11,6
27	Oberhaardt	16	54	29	1	0	67	11,6
28	Unterhaardt m. Zellertal	11	58	29	2	0	67	11,7
29	Nahe (Pfalz)	17	69	14	0	-	65	11,7

1) Wegen Gebietsreform nicht nachgewiesen.

gehalt nach Weinbaugebieten

Rotmost								Lfd. Nr.
Mostgewicht nach Uechsle					Ø Most- gewicht	Ø Säure- gehalt		
Anteil des Mostertrages								
weniger als 60°	60° bis unter 70°	70° bis unter 80°	80° bis unter 90°	90° und mehr	Grad	‰		
-	71	29	-	-	71	9,5		1
-	37	35	25	3	76	8,0	2	
.	3	
-	37	35	25	3	76	8,0	4	
13	52	31	4	0	68	10,9	5	
.	6	
-	66	33	1	-	69	11,7	7	
-	64	33	3	-	69	10,5	8	
.	9	
-	-	-	-	-	-	-	10	
.	11	
.	12	
.	13	
6	70	20	4	0	67	10,7	14	
.	15	
.	16	
8	53	38	1	-	68	9,9	17	
.	18	
11	59	22	8	-	68	10,8	19	
8	62	27	3	-	68	10,0	20	
9	48	40	3	-	69	10,0	21	
-	92	8	-	-	66	10,8	22	
12	51	32	5	-	68	10,6	23	
10	68	22	0	-	66	10,6	24	
.	25	
16	45	34	5	-	68	11,5	26	
14	55	26	5	-	67	10,6	27	
14	50	31	5	-	68	10,6	28	
.	29	

Lfd. Nr.	Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Weißmost						Ø Säure- gehalt ‰
		Mostgewicht nach Oechsle					Ø Most- gewicht Grad	
		Anteil des Mostertrages						
		weniger als 60°	60° bis unter 70°	70° bis unter 80°	80° bis unter 90°	90° und mehr		
%								
30	Baden-Württemberg	-	19	64	17	-	74	10,1
31	Nordwürttemberg	-	18	71	11	-	73	10,6
32	Oberes Neckartal	-	20	60	20	-	75	9,0
33	Unteres Neckartal	-	11	78	11	-	72	11,3
34	Remstal	-	-	82	18	-	75	10,2
35	Enztal	-	13	80	7	-	75	9,0
36	Zabergäu	-	64	36	-	-	69	11,3
37	Kocher- und Jagsttal	-	12	71	17	-	75	8,9
38	Tauber- und Jagsttal	-	-	75	25	-	76	8,6
39	Nordbaden	-	19	69	12	-	74	9,8
40	Tauber- und Maintal	-	14	77	9	-	74	9,6
41	Neckar- und Jagsttal	-	38	62	-	-	72	10,2
42	Bergstraße	-	9	73	18	-	74	9,9
43	Kraichgau	-	17	69	14	-	75	9,9
44	Pfinz-, Enz- u. Alb- tal	-	40	50	10	-	72	9,7
45	Südbaden	-	17	53	30	-	75	9,9
46	See- und Oberrhein- land	-	-	20	80	-	79	9,6
47	Oberes Rheintal	-	-	100	-	-	74	8,5
48	Markgräflerland	-	41	59	-	-	69	10,4
49	Kaiserstuhl	-	-	45	55	-	79	9,4
50	Breisgau	-	8	45	47	-	75	10,3
51	Ortenau u. Bühler- gegend	-	6	61	33	-	76	9,8
52	Südwestfalen-Hohenzollern	-	41	53	6	-	70	11,0
53	Oberes Neckartal	-	40	53	7	-	69	11,0
54	Enztal	-	50	50	-	-	70	10,0
55	Bayern	0	17	53	27	3	74	9,6
56	Unterfranken	-	20	58	22	0	73	9,6
57	Mittelfranken	0	-	18	58	23	83	9,9
58	Übrige Gebiete	31	-	41	28	-	65	9,4
59	Saarland	-	38	32	16	14	73	12,0
60	Bundesgebiet 1967	6	28	39	21	6	75	10,7
61	1968	45	42	11	2	0	62	12,6
62	1969	11	45	37	7	0	69	11,3

1) Einschl. Tottmang.

gehalt nach Weinbaugebieten

Rotmost								Lfd. Nr.
Mostgewicht nach Dechsele					Ø Most- gewicht	Ø Säure- gehalt		
Anteil des Mostertrages								
weniger als 60°	60° bis unter 70°	70° bis unter 80°	80° bis unter 90°	90° und mehr	Grad	‰		
-	15	56	27	2	76	10,6	30	
-	15	73	11	1	73	10,6	31	
-	-	50	50	-	78	9,2	32	
-	11	84	4	1	73	10,8	33	
-	25	50	25	-	76	11,2	34	
-	13	74	13	-	75	9,8	35	
-	45	50	5	-	70	9,9	36	
-	5	65	30	-	76	8,9	37	
-	-	80	-	20	77	10,5	38	
-	24	65	11	-	72	10,8	39	
-	31	54	15	-	71	10,5	40	
-	57	43	-	-	71	10,0	41	
-	15	70	15	-	71	11,2	42	
-	17	71	12	-	73	10,5	43	
-	29	71	-	-	74	11,5	44	
-	4	22	70	4	82	10,5	45	
-	-	-	100	-	84	11,0	46	
-	-	-	100	-	81	.	47	
-	9	27	59	5	80	11,0	48	
-	-	10	70	20	84	10,3	49	
-	7	24	66	3	81	11,2	50	
-	-	24	76	-	82	9,9	51	
-	25	69	6	-	71	11,8	52	
-	20	73	7	-	71	11,8	53	
-	100	-	-	-	65	11,0	54	
-	12	42	46	-	77	10,2	55	
-	12	42	46	-	77	10,2	56	
-	-	-	-	-	-	-	57	
-	-	-	-	-	-	-	58	
-	-	100	-	-	74	10,0	59	
4	27	44	20	5	74	9,4	60	
41	38	17	3	1	62	11,9	61	
6	33	44	16	1	72	10,7	62	

6. Schätzung der Weinmosternte

Lfd. Nr.	Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Silvaner			
		Mostertrag		Ø Most- gewicht Grad	Ø Säure- gehalt ‰
		je ha	insgesamt		
		hl			
1	Nordrhein-Westfalen	20,0	40	75	11,0
2	Hessen	75,0	19 114	74	11,5
3	Hessische Bergstraße	80,0	4 240	72	12,9
4	Rheingau	74,0	14 874	74	11,1
5	Rheinland-Pfalz	78,7	1 133 040	68	11,6
6	Rheinland-Nassau ¹⁾
7	Mittelrhein	72,4	2 824	66	12,2
8	Nahe (Koblenz)	76,3	82 404	68	11,0
9	Obermosel
10	Saar
11	Ruwer	-	-	-	-
12	Mittelmosel	71,1	711	60	11,5
13	Untermosel
14	Ahr
15	Lahn	-	-	-	-
16	Rheinhessen ¹⁾
17	Worms und Umgegend	79,9	143 740	70	11,2
18	Oppenheim und Umgegend	60,6	41 996	70	10,9
19	Mainz und Umgegend	67,9	23 765	71	11,1
20	Ingelheim und Umgegend	81,8	42 945	70	10,8
21	Wiesbach	81,8	69 530	68	10,6
22	Bingen und Umgegend	78,0	16 068	67	10,2
23	Nahe (Rheinhessen)	67,0	22 445	68	10,0
24	Alzey und Umgegend	76,1	164 680	69	11,5
25	Pfalz ¹⁾
26	Mittelhaardt	90,6	149 581	68	11,5
27	Oberhaardt	81,1	316 209	66	12,8
28	Unterhaardt m. Zellertal	76,3	41 431	67	11,0
29	Nahe (Pfalz)	58,7	14 499	64	12,2

1) Wegen Gebietsreform nicht nachgewiesen.

1969 für ausgewählte Rebsorten

Riesling				Müller-Thurgau				Lfd. Nr.
Mostertrag		Ø Most- gewicht	Ø Säure- gehalt	Mostertrag		Ø Most- gewicht	Ø Säure- gehalt	
je ha	insgesamt			je ha	insgesamt			
hl		Grad	%	hl		Grad	%	
38,3	421	69	11,8	54,2	379	71	8,8	1
74,0	159 622	73	13,0	77,0	27 021	76	9,8	2
80,0	6 960	72	13,8	79,0	3 081	72	10,2	3
74,0	152 662	73	13,0	76,0	23 940	76	9,8	4
80,9	1 070 86	67	12,9	90,6	1 132 710	68	9,8	5
.	6
70,1	56 010	65	12,3	74,4	5 134	67	9,5	7
69,2	58 820	68	13,2	80,0	69 920	68	9,3	8
.	.	.	.	116,7	3 151	61	10,6	9
80,6	72 782	67	13,9	96,0	11 712	65	11,0	10
69,7	27 880	65	15,3	84,5	2 535	65	10,2	11
86,7	372 983	67	12,4	119,8	91 767	61	9,8	12
80,5	174 202	66	13,5	119,7	39 381	60	10,3	13
74,3	8 545	66	11,5	75,3	6 099	66	9,5	14
.	15
.	16
69,4	28 107	70	12,6	91,0	172 536	71	9,6	17
59,8	13 216	72	10,5	70,4	27 104	72	9,6	18
64,1	4 615	76	10,6	65,7	23 389	71	8,7	19
72,3	3 760	73	10,2	85,7	36 165	72	10,1	20
69,7	4 112	72	11,7	83,8	51 537	70	10,0	21
73,0	3 723	66	10,9	71,0	4 402	68	9,5	22
59,4	2 079	73	11,9	69,7	15 195	70	8,3	23
67,9	10 117	70	13,6	72,8	153 608	70	9,7	24
.	25
94,1	141 997	69	13,1	109,6	62 691	68	10,1	26
78,8	62 016	67	12,9	102,8	313 129	68	10,1	27
72,2	15 379	68	12,1	85,0	35 785	71	9,9	28
68,3	9 904	61	12,1	70,5	7 050	68	9,9	29

6. Schätzung der Weinmosternte

Lfd. Nr.	Land Verwaltungsbezirk Weinbauggebiet	Silvaner			
		Mostertrag		Ø Most- gewicht Grad	Ø Säure- gehalt ‰
		je ha	insgesamt		
		hl			
1	Baden-Württemberg	76,3	114 069	74	9,8
2	Nordwürttemberg	76,2	61 718	74	9,6
3	Oberes Neckartal	47,8	1 800	75	9,0
4	Unteres Neckartal	69,9	16 781	72	10,6
5	Remstal	75,0	11 609	75	9,9
6	Enztal	76,2	2 876	75	8,0
7	Zabergäu	104,4	6 440	68	10,6
8	Kocher- und Jagsttal	81,9	18 432	75	8,7
9	Tauber- und Jagsttal	71,2	3 780	76	9,0
10	Nordbaden	67,7	13 965	72	10,3
11	Tauber- und Maintal	70,2	5 250	73	10,7
12	Neckar- und Jagsttal	70,5	1 046	71	10,6
13	Bergstraße	73,9	5 057	70	10,4
14	Kraichgau	52,2	2 168	75	9,1
15	Pfinz-, Enz- und Alb- tal	67,1	444	69	9,7
16	Südbaden	80,3	38 067	76	9,8
17	Seegegend	105,0	26	95	.
18	Oberes Rheintal	80,0	2	.	.
19	Markgräflerland	72,0	3 707	73	12,0
20	Kaiserstuhl	81,6	31 950	76	9,6
21	Breisgau	95,0	1 376	78	9,0
22	Ortenau und Bühler- gegend	62,5	1 006	72	10,0
23	Südwestfalen-Hohenzollern ¹⁾	60,0	259	65	10,5
24	Oberes Neckartal	60,1	257	65	10,5
25	Enztal	54,0	2	.	.
26	Bayern	57,8	74 086	76	10,2
27	Unterfranken	59,5	62 713	74	10,3
28	Mittelfranken	50,1	11 373	83	9,0
29	Übrige Gebiete	-	-	-	-
30	Saarland	-	-	-	-
31	Bundesgebiet 1969 ²⁾	76,9	1 340 289	69	11,4
32	1968 ²⁾	74,1	1 424 105	.	.

1) Einschl. Tettnang.- 2) 1968 Endgültige Berichterstatterschätzung.

1969 für ausgewählte Rebsorten

Riesling				Müller-Thurgau				Lfd. Nr.
Mostertrag		Ø Most- gewicht	Ø Säure- gehalt	Mostertrag		Ø Most- gewicht	Ø Säure- gehalt	
je ha	insgesamt			je ha	insgesamt			
hl		Grad	‰	hl		Grad	‰	
70,1	147 035	72	11,3	83,2	244 161	75	9,4	1
70,4	101 136	72	11,5	80,0	31 219	73	9,4	2
30,0	2	.	.	55,0	57	75	.	3
70,1	64 571	72	11,7	73,5	12 311	75	10,2	4
76,8	10 444	76	11,0	79,2	3 655	72	9,0	5
61,4	2 906	75	9,8	83,2	1 504	73	9,5	6
74,3	16 128	69	12,0	99,7	4 852	68	9,9	7
60,3	6 427	74	9,8	82,0	4 580	76	8,5	8
75,0	658	75	10,0	80,1	4 260	77	8,0	9
61,8	10 903	73	10,8	72,3	49 431	74	9,4	10
60,0	185	74	10,0	80,4	13 657	74	9,3	11
64,4	403	71	12,5	65,3	829	73	8,7	12
62,2	4 062	74	10,6	70,7	15 975	74	9,2	13
61,8	6 028	73	10,8	67,8	16 085	74	9,6	14
54,4	225	67	10,7	76,9	2 885	72	9,3	15
72,4	34 982	73	10,8	96,6	163 228	75	9,4	16
74,8	3	.	.	80,6	4 153	76	9,3	17
-	-	-	-	130,0	456	74	8,5	18
46,2	223	71	9,2	90,7	21 681	70	11,1	19
78,5	698	83	11,0	100,4	67 610	76	9,2	20
86,2	589	75	12,0	99,1	50 429	76	9,7	21
72,3	33 469	73	10,8	88,7	18 899	75	8,7	22
66,7	14	64	12,0	65,7	283	72	11,6	23
69,1	7	64	12,0	68,4	250	72	11,7	24
68,0	7	.	.	30,0	13	70	10,0	25
57,2	5 206	77	10,4	62,9	46 337	72	9,2	26
58,0	5 046	77	10,4	63,2	43 292	72	9,1	27
45,0	90	85	.	59,0	2 891	83	10,7	28
35,0	70	45	.	51,3	154	66	10,0	29
-	-	-	-	125,0	1 280	74	11,0	30
78,6	1 383 170	68	12,7	88,6	1 451 888	69	9,7	31
70,7	1 243 540	.	.	81,9	1 196 814	.	.	32

6. Schätzung der Weinmosternte 1969 für ausgewählte Rebsorten

Land Verwaltungsbezirk Weinbauggebiet	Portugieser				Burgunder			
	Mostertrag		Ø Most- gewicht	Ø Säure- gehalt	Mostertrag		Ø Most- gewicht	Ø Säure- gehalt
	je ha	ins- gesamt			je ha	ins- gesamt		
	hl		Grad	‰	hl		Grad	‰
Nordrhein-Westfalen	30,0	30	71	9,5	-	-	-	-
Hessen	61,0	244	73	8,0	48,0	2 112	80	8,0
Hessische Bergstraße	-	-	-	-	-	-	-	-
Rheingau	61,0	244	73	8,0	48,0	2 112	80	8,0
Rheinland-Pfalz	83,8	354 736	68	10,8
Rheinland-Nassau ¹⁾
Mittelrhein
Nahe (Koblenz)	81,0	1 053	69	8,9
Obermosel	-	-	-	-
Saar	-	-	-	-
Ruwer	-	-	-	-
Mittelmosel
Untermosel	-	-	-	-
Ahr	77,2	13 433	67	9,9
Lahn	-	-	-	-
Rhein Hessen ¹⁾
Worms und Umgegend	77,9	29 213	69	10,0
Oppenheim und Umgegend
Mainz und Umgegend	61,0	4 514	68	10,8
Ingelheim und Umgegend	65,3	19 133	67	10,0
Wiesbach	62,9	8 617	68	10,0
Bingen und Umgegend	69,0	1 242	66	10,8
Nahe (Rhein Hessen)	66,2	2 251	68	10,6
Alzey und Umgegend	74,9	16 927	66	10,6
Pfalz ¹⁾
Mittelhaardt	94,8	142 674	67	11,5
Oberhaardt	80,8	54 702	70	10,6
Unterhaardt mit Zellertal	83,2	60 070	68	10,6
Nahe (Pfalz)

1) Wegen Gebietsreform nicht nachgewiesen.

6. Schätzung der Weinmostenite 1969 für ausgewählte Rebsorten

Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Portugieser				Burgunder			
	Mostertrag		Ø Most- gewicht	Ø Säure- gehalt	Mostertrag		Ø Most- gewicht	Ø Säure- gehalt
	je ha	ins- gesamt			je ha	ins- gesamt		
	hl		Grad	%	hl		Grad	%
Baden-Württemberg	72,1	54 847	70	10,1	64,8	132 550	82	10,5
Nordwürttemberg	72,8	48 079	70	10,1	63,7	8 304	78	10,4
Oberes Neckartal	60,0	33	80	9,0	-	-	-	-
Unteres Neckartal	69,0	16 227	70	10,6	61,8	5 728	78	10,8
Romstal	69,2	4 597	73	9,3	65,4	491	81	.
Enztal	67,3	8 462	72	10,4	59,1	606	79	8,5
Zabergäu	81,1	16 878	69	9,7	77,0	915	73	9,9
Kocher- und Jagsttal	75,0	1 612	74	10,1	69,7	562	85	9,0
Tauber- und Jagsttal	97,4	265	77	6,5	80,0	2	80	9,0
Nordbaden	67,8	5 837	73	10,0	61,9	2 777	77	10,6
Tauber- und Maintal	76,1	417	76	9,6	80,0	112	63	.
Neckar- und Jagsttal	68,3	46	68	9,2	48,7	109	73	10,8
Bongstraße	59,1	1 922	74	9,7	59,0	1 107	75	11,1
Kraichgau	74,2	2 993	73	10,2	65,0	1 394	80	10,2
Pfinz-, Enz- und Alb- tal	64,5	459	67	10,7	52,8	55	70	10,0
Südbaden	58,7	425	68	8,8	65,0	121 429	82	10,5
Seegegend	80,0	20	.	.	61,1	3 755	84	11,0
Oberes Rheintal	-	-	-	-	77,0	1 726	81	.
Markgräflerland	60,0	15	60	.	68,0	6 483	80	11,0
Kaiserstuhl	100,0	48	70	14,0	64,8	47 399	84	10,3
Breisgau	45,0	173	.	.	66,2	32 524	81	11,1
Ortenau und Bühler- gegend	69,9	169	68	7,3	63,4	29 542	82	9,9
Südwürttemberg-Hohen- zollern ¹⁾	67,8	506	71	12,0	51,9	40	73	12,0
Oberes Neckartal	68,0	505	71	12,0	46,0	26	75	12,0
Enztal	30,0	1	65	11,0	-	-	-	-
Bayern	48,0	672	75	10,4	37,9	644	79	10,1
Unterfranken	48,0	672	75	10,4	37,9	644	79	10,1
Mittelfranken	-	-	-	-	-	-	-	-
Übrige Gebiete	-	-	-	-	-	-	-	-
Saarland	-	-	-	-	135,0	19	74	10,0
Bundesgebiet 1969	81,5	410 529	68	10,7	64,3	135 325	82	10,5
1968 ²⁾	94,0	503 854	.	.	74,3	158 822	.	.

1) Einschl. Tettnang.- 2) 1968 endgültige Berichterstatterschätzung.

1969 für ausgewählte Rebsorten

Weißer Burgunder				Gewürztraminer				Lfd. Nr.
Mostertrag		Ø Most- gewicht	Ø Säure- gehalt	Mostertrag		Ø Most- gewicht	Ø Säure- gehalt	
je ha	ins- gesamt			je ha	ins- gesamt			
hl		Grad	%	hl		Grad	%	
66,6	20 348	80	9,8	46,1	7 928	86	8,4	1
43,0	46	87	9,2	52,1	1 073	83	9,8	2
-	-	-	-	-	-	-	-	3
42,5	19	.	.	56,0	704	81	10,0	4
-	-	-	-	50,0	29	95	10,0	5
40,0	4	75	.	28,2	32	88	9,5	6
45,0	15	90	9,2	50,0	239	85	9,2	7
43,8	8	.	.	32,8	26	85	9,5	8
-	-	-	-	57,9	43	.	.	9
58,6	3 158	77	9,8	54,8	235	81	8,8	10
72,4	183	77	8,7	-	-	-	-	11
70,0	6	.	.	75,0	38	.	.	12
64,6	1 687	77	9,9	59,3	170	81	9,2	13
50,7	1 244	77	9,8	25,0	21	85	5,5	14
62,0	38	60	11,0	61,9	6	.	.	15
68,4	17 143	80	9,8	45,0	6 620	87	8,2	16
60,0	41	.	.	43,9	91	.	.	17
-	-	-	-	-	-	-	-	18
62,8	3 301	74	10,3	43,3	1 400	85	9,0	19
67,2	8 111	82	9,4	36,4	1 216	91	8,0	20
75,2	5 595	80	10,2	48,9	1 087	89	8,7	21
45,0	95	80	10,0	49,5	2 826	85	7,7	22
30,0	1	65	.	-	-	-	-	23
30,0	1	65	.	-	-	-	-	24
-	-	-	-	-	-	-	-	25

1969 für ausgewählte Rebsorten

Schwarzriesling				Limberger				Lfd. Nr.
Mostertrag		Ø Most- gewicht	Ø Säure- gehalt	Mostertrag		Ø Most- gewicht	Ø Säure- gehalt	
je ha	ins- gesamt			je ha	ins- gesamt			
hl		Grad	‰	hl		Grad	‰	
64,6	27 580	75	10,9	64,5	24 697	75	10,1	1
66,8	24 019	75	10,8	64,8	24 155	75	10,1	2
-	-	-	-	30,0	1	.	.	3
69,0	19 739	75	11,0	71,2	12 384	75	10,6	4
55,0	41	74	.	35,0	13	78	10,0	5
48,2	1 944	76	10,1	57,7	5 341	78	9,3	6
73,2	2 073	72	9,9	59,5	5 669	72	9,6	7
51,8	128	77	8,8	70,0	747	76	.	8
65,4	94	79	10,0	-	-	-	-	9
51,9	2 837	78	10,7	54,6	536	76	8,3	10
60,0	195	70	.	-	-	-	-	11
43,7	52	70	9,9	63,0	50	71	10,4	12
70,0	141	90	.	60,0	14	75	8,8	13
52,3	735	77	9,5	53,5	456	76	8,0	14
50,1	1 714	79	11,2	62,0	16	79	10,8	15
78,2	594	81	13,8	-	-	-	-	16
51,5	5	.	.	-	-	-	-	17
-	-	-	-	-	-	-	-	18
-	-	-	-	-	-	-	-	19
75,8	20	.	.	-	-	-	-	20
79,5	555	81	14,0	-	-	-	-	21
50,0	14	69	6,0	-	-	-	-	22
24,5	130	74	10,0	54,5	6	73	14,0	23
46,1	93	74	10,0	45,0	5	73	14,0	24
11,0	37	.	.	60,6	1	.	.	25

7. Mostgewicht und Säuregehalt nach Ländern

Berichtsgegenstand	Nordrh. Westfalen	Hessen	Rheinl.- Pfalz	Baden- Württbg.	Bayern	Saar- land	Bundesgebiet		
							Oktober	Oktober	November
							1968		
Weißmost									
Ertrag hl je ha	42,0	73,7	82,9	75,3	58,1	114,6	80,3	76,3	83,8
Mostmenge in 1 000 hl	1	238	3 761	735	135	8	4 879	4 515	4 955
Mostmenge in %									
90° und mehr	-	2	0	-	3	14	0	0	0
80° bis unter 90°	4	7	4	17	27	16	7	1	2
70° bis unter 80°	66	43	30	64	53	32	37	9	11
60° bis unter 70°	20	35	52	19	17	38	45	39	42
weniger als 60° Oechsle	10	13	14	-	0	-	11	51	45
Durchschn. Mostgewicht in Graden nach Oechsle	70	74	67	74	74	73	69	-	-
Oktober 1968	70	61	60	66	63	50	-	61	-
November 1968	64	65	61	65	65	48	-	-	62
Durchschn. Säuregehalt in von Tausend (‰)	10,3	12,2	11,5	10,1	9,6	12,0	11,3	-	-
Oktober 1968	10,3	13,9	12,9	10,3	10,9	18,0	-	12,6	-
November 1968	12,0	14,5	13,0	10,6	10,8	16,0	-	-	12,6
Rotmost									
Ertrag hl je ha	30,0	49,2	82,0	65,4	43,1	135,0	72,5	84,8	98,7
Mostmenge in 1 000 hl	0	3	378	382	1	0	765	938	1 093
Mostmenge in %									
90° und mehr	-	3	0	2	-	-	1	-	1
80° bis unter 90°	-	25	4	27	46	-	16	2	3
70° bis unter 80°	29	35	31	56	42	100	44	15	17
60° bis unter 70°	71	37	52	15	12	-	33	32	38
weniger als 60° Oechsle	-	-	13	-	-	-	6	51	41
Durchschn. Mostgewicht in Graden nach Oechsle	71	76	67	76	77	74	72	-	-
Oktober 1968	71	68	57	65	69	60	-	61	-
November 1968	59	68	59	65	67	60	-	-	62
Durchschn. Säuregehalt in von Tausend (‰)	9,5	8,0	10,9	10,6	10,2	10,0	10,7	-	-
Oktober 1968	9,5	12,4	12,3	11,9	12,5	7,0	-	12,1	-
November 1968	11,0	13,8	12,3	11,6	11,4	7,0	-	-	11,9