

STATISTISCHES  
BUNDESAMT  
WIESBADEN

FACHSERIE **B**

# LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI

**Reihe 2**

**Gartenbau und Weinwirtschaft**

**III. Weinwirtschaft**

**Stand der Reben**

**Juni 1970**



Bestellnummer : 210230 - 700002

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

## Inhalt

	Seite
Vorbemerkung . . . . .	3
Tabellenteil	
1. Allgemeine Angaben über Witterung und Entwicklung der Reben . . . . .	4
2. Allgemeiner Beginn der Blüte . . . . .	5
3. Durchschnittliche Dauer der Blüte . . . . .	6
4. Begutachtung des Standes der Reben . . . . .	7

### Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden
- 0 - mehr als nichts, aber weniger als die  
Hälfte der kleinsten Einheit, die in  
der Tabelle zur Darstellung ge-  
bracht wird.

Die Angaben beziehen sich auf die Länder mit Weinbau

Erschienen im Juli 1970

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis DM -,50

Ergebnisse für die einzelnen Länder werden in den "Statistischen Be-  
richten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer C II 4  
veröffentlicht.

### Vorbemerkung

In der Berichtszeit vom 24. 5. bis 30. 6. 1970 haben sich die Reben günstig entwickelt. Die Witterung für den Stand der Reben wurde von den Berichterstattern überwiegend als gut bezeichnet. Starke und mittlere Wetterschäden traten nur in geringem Umfang auf. Die Niederschläge waren allgemein ausreichend, die Sonnenscheindauer genügend und reichlich und der Temperaturverlauf wurde von fast 75 % aller Berichterstatter als günstig beurteilt.

Zu diesen günstigen Aspekten trifft noch eine gute Bewertung des Gescheinsansatzes, der in 78 % der Angaben als gut und in 22 % als mittel bezeichnet wird. Der Verlauf der Blüte wird von 75 % der Berichterstatter als gut und von 25 % als mittel bewertet. Diese Ergebnisse übertreffen die des Vorjahres und eröffnen günstige Aussichten für eine reichliche Ernte.

Der Beginn der Blüte bei den in die Feststellung einbezogenen Rebsorten lag infolge der weit in das Frühjahr reichenden Winterperiode hauptsächlich in der Zeit vom 21. bis 30. Juni. Die durchschnittliche Blühdauer war erheblich kürzer als im Vorjahr. In den Meldungen überwogen die Angaben von einer 5 - 7 tägigen Dauer der Blüte.

Aufgrund der günstigen Bedingungen hat sich die Note für den Stand der Reben gegenüber dem Vormonat von 2,4 auf 2,0 verbessert. Besonders günstige Benotungen wurden aus der Seegegend (1,5), dem Oberen Rheintal und Remstal mit 1,7 und aus dem Rheingau, der Mittelhaardt und der Oberhaardt mit jeweils 1,8 gemeldet.

1. Allgemeine Angaben über Witterung und Entwicklung der Reben

% der ausgewerteten Meldungen

Berichtsgegenstand und Beurteilung	Nord- rhein- West- falen	Hessen	Rhein- land- Pfalz	Baden- Württem- berg	Bayern	Saar- land	Insgesamt		
							Juni	Mai	Juni
							1970		1969
<b>Wetterschäden</b>									
keine	100	79	80	72	72	57	76	82	78
schwache	-	15	13	21	18	29	17	11	16
mittlere	-	3	5	5	5	14	5	5	4
starke	-	3	2	2	5	-	2	2	2
<b>Niederschläge</b>									
zu gering	-	11	12	6	25	-	10	0	-
ausreichend	100	89	86	88	73	100	86	40	58
zu hoch	-	-	2	6	2	-	4	60	42
<b>Temperaturverlauf</b>									
ungünstig	-	-	-	2	1	14	1	65	51
normal	50	22	20	30	27	29	25	33	46
günstig	50	78	80	68	72	57	74	2	3
<b>Sonnenscheindauer</b>									
zu gering	-	-	-	2	1	14	1	-	62
genügend	100	39	39	56	40	29	47	-	37
reichlich	-	61	61	42	59	57	52	-	1
<b>Witterung für die Reben</b>									
schlecht	-	-	-	0	-	-	0	-	22
mittel	-	11	11	22	20	43	17	-	72
gut	100	89	89	78	80	57	83	-	6
<b>Gescheinsansatz</b>									
schlecht	-	-	-	0	3	-	0	-	2
mittel	75	25	15	22	60	14	22	-	70
gut	25	75	85	78	37	86	78	-	28
<b>Verlauf der Blüte</b>									
schlecht	-	-	-	1	1	-	0	-	31
mittel	-	21	17	30	48	29	25	-	62
gut	100	79	83	69	51	71	75	-	7
<b>Durchführung der Pflegearbeiten</b>									
vollständig	50	83	69	80	75	86	75	64	70
unvollständig	50	17	31	20	25	14	25	36	30

2. Allgemeiner Beginn der Blüte Juni 1970

% der ausgewerteten Meldungen

Rebsorte	Datum	Nord- rhein- West- falen	Hessen	Rhein- land- Pfalz	Baden- Württem- berg	Bayern	Saar- land	Insgesamt	
								1970	1969
Silvaner	bis 10.6.	-	-	-	0	1	-	0	-
	vom 11. - 20.6.	-	52	20	13	6	-	17	19
	vom 21. - 30.6.	100	48	78	71	83	-	75	62
	nach dem 30.6.	-	-	2	16	10	-	8	19
Riesling	bis 10.6.	-	-	-	-	-	-	-	0
	vom 11. - 20.6.	50	33	16	10	7	-	14	23
	vom 21. - 30.6.	50	67	80	77	86	-	79	59
	nach dem 30.6.	-	-	4	13	7	-	7	18
Müller-Thurgau	bis 10.6.	-	-	-	-	1	-	0	0
	vom 11. - 20.6.	50	65	37	27	15	-	31	39
	vom 21. - 30.6.	50	35	60	64	78	100	63	52
	nach dem 30.6.	-	-	3	9	6	-	6	9
Elbling	bis 10.6.	-	-	-	-	-	-	-	-
	vom 11. - 20.6.	-	-	7	-	-	-	6	8
	vom 21. - 30.6.	-	-	84	-	-	100	86	64
	nach dem 30.6.	-	-	9	-	-	-	8	28
Ruländer	bis 10.6.	-	-	-	1	-	-	0	-
	vom 11. - 20.6.	-	-	-	24	-	-	23	41
	vom 21. - 30.6.	-	100	-	64	-	100	66	47
	nach dem 30.6.	-	-	-	11	-	-	11	12
Portugieser	bis 10.6.	-	-	-	-	-	-	-	-
	vom 11. - 20.6.	-	67	43	14	20	-	30	31
	vom 21. - 30.6.	100	33	55	77	80	-	65	58
	nach dem 30.6.	-	-	2	9	-	-	5	11
Burgunder	bis 10.6.	-	-	-	1	-	-	1	1
	vom 11. - 20.6.	-	100	24	22	20	-	23	43
	vom 21. - 30.6.	-	-	69	71	80	100	70	44
	nach dem 30.6.	-	-	7	6	-	-	6	12

Zahl der Meldungen mit Angaben über Beginn der Blüte

Silvaner	1	25	352	309	82	-	769	700
Riesling	4	33	422	291	27	-	777	747
Müller-Thurgau	4	34	468	450	91	7	1 054	987
Elbling	-	-	44	-	-	7	51	39
Ruländer	-	2	-	241	-	7	250	192
Portugieser	2	3	242	203	15	-	465	449
Burgunder	-	3	59	279	10	1	352	311

### 3. Durchschnittliche Dauer der Blüte

% der ausgewerteten Meldungen

Rebsorte	Datum	Nord- rhein- West- falen	Hessen	Rhein- land- Pfalz	Baden- Württem- berg	Bayern	Saar- land	Insgesamt	
								1970	1969
Silvaner	bis 4 Tage	-	15	15	12	4	-	13	6
	5 - 7 "	-	50	46	36	40	-	43	15
	8 - 10 "	-	30	36	39	46	-	38	47
	11 - 14 "	-	5	3	12	8	-	6	29
	15 Tage u.mehr	-	-	-	1	2	-	0	3
Riesling	bis 4 Tage	-	12	8	13	19	-	10	4
	5 - 7 "	-	46	41	41	57	-	42	11
	8 - 10 "	-	35	44	37	19	-	41	43
	11 - 14 "	-	7	7	8	5	-	7	31
	15 Tage u.mehr	-	-	-	1	-	-	0	11
Müller- Thurgau	bis 4 Tage	-	15	15	16	2	-	15	4
	5 - 7 "	-	54	45	39	54	-	43	17
	8 - 10 "	-	27	37	37	35	100	37	48
	11 - 14 "	-	4	3	8	7	-	5	26
	15 Tage u.mehr	-	-	-	0	2	-	0	5
Elbling	bis 4 Tage	-	-	14	-	-	-	10	-
	5 - 7 "	-	-	23	-	-	-	17	7
	8 - 10 "	-	-	54	-	-	100	66	72
	11 - 14 "	-	-	9	-	-	-	7	14
	15 Tage u.mehr	-	-	-	-	-	-	-	7
Ruländer	bis 4 Tage	-	-	-	11	-	-	10	3
	5 - 7 "	-	50	-	41	-	-	39	17
	8 - 10 "	-	50	-	41	-	100	44	43
	11 - 14 "	-	-	-	7	-	-	7	25
	15 Tage u.mehr	-	-	-	-	-	-	-	12
Portugieser	bis 4 Tage	-	-	20	24	20	-	22	6
	5 - 7 "	-	50	51	38	10	-	45	20
	8 - 10 "	-	-	29	31	60	-	30	45
	11 - 14 "	-	50	-	7	10	-	3	27
	15 Tage u.mehr	-	-	-	-	-	-	-	2
Burgunder	bis 4 Tage	-	-	20	14	13	-	15	3
	5 - 7 "	-	-	55	41	62	-	43	18
	8 - 10 "	-	67	25	35	25	100	34	37
	11 - 14 "	-	33	-	10	-	-	8	32
	15 Tage u.mehr	-	-	-	-	-	-	-	10

Zahl der Meldungen mit Angaben über durchschnittliche Dauer der Blüte

Silvaner	-	20	243	145	48	-	456	198
Riesling	-	26	281	147	21	-	475	233
Müller-Thurgau	-	26	320	274	54	7	681	425
Elbling	-	-	22	-	-	7	29	14
Ruländer	-	2	-	145	-	7	154	76
Portugieser	-	3	40	185	8	1	237	121
Burgunder	-	3	40	185	8	1	237	121

#### 4. Begutachtung des Standes der Reben

Noten: 1,0 (sehr gut) = mehr als 3/4 Herbst, 2,0 (gut) = mehr als 1/2 bis 3/4 Herbst, 3,0 (mittel) = 1/2 Herbst, 4,0 (gering) = 1/4 bis 1/2 Herbst, 5,0 (sehr gering) = weniger als 1/4 Herbst

Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Note		
	1970		1969
	Juni	Mai	Juni
Nordrhein-Westfalen	2,0	3,4	3,0
Hessen	1,8	2,5	2,4
Hessische Bergstraße	2,0	2,2	2,2
Rheingau	1,8	2,5	2,4
Rheinland-Pfalz	2,0	2,4	2,5
Rheinland-Nassau <sup>1)</sup>	.	.	.
Mittelrhein (einschl. Lahn)	2,0	2,3	.
Nahe (Koblenz)	2,0	2,4	2,7
Obermosel	1,9	2,2	2,2
Saar	2,1	2,4	2,4
Ruwer	2,2	2,6	2,4
Mittelmosel	2,0	2,3	2,2
Untermosel	2,1	2,3	2,3
Ahr	2,0	2,2	2,7
Rhein Hessen <sup>1)</sup>	.	.	.
Worms u. Umgegend	2,0	2,5	2,5
Oppenheim u. Umgegend	2,1	2,2	2,6
Mainz u. Umgegend	2,0	2,4	2,4
Ingelheim u. Umgegend	1,9	2,3	2,6
Wiesbach	2,1	2,3	2,7
Bingen u. Umgegend	2,0	2,2	2,4
Nahe (Rhein Hessen)	1,9	2,4	2,8
Alzey u. Umgegend	2,1	2,4	2,7
Pfalz <sup>1)</sup>	.	.	.
Mittelhaardt	1,8	2,3	2,6
Oberhaardt	1,8	2,4	2,5
Unterhaardt mit Zellertal	2,0	2,2	2,7
Nahe (Pfalz)	2,2	2,5	2,7
Baden-Württemberg	2,0	2,3	2,6
Nordwürttemberg	1,9	2,2	2,6
Oberes Neckartal	2,9	2,3	2,6
Unteres Neckartal	1,9	2,2	2,6
Remstal	1,7	2,3	2,4
Enztal	2,0	2,3	2,8
Zabergäu	1,9	2,3	2,5
Kocher- und Jagsttal	1,9	2,3	2,3
Taubergengegend	2,2	1,9	2,4

1) Wegen Gebietsreform nicht nachgewiesen.

#### 4. Begutachtung des Standes der Reben

Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Note		
	1970		1969
	Juni	Mai	Juni
Nordbaden	2,1	2,4	2,6
Tauber- und Maintal	2,3	2,5	2,4
Neckar- und Jagsttal	2,3	2,4	2,0
Bergstraße	1,9	2,4	2,6
Kraichgau	2,1	2,4	2,7
Pfinz-, Enz- und Albthal	2,1	2,3	2,6
Südbaden	2,0	2,3	2,7
Seegegend	1,5	1,9	2,1
Oberes Rheintal	1,7	1,4	2,3
Markgräflerland	2,1	2,5	2,7
Kaiserstuhl	2,0	2,3	3,0
Breisgau	2,0	2,3	2,5
Ortenau u. Bühlergegend	1,9	2,2	2,4
Südwürttemberg-Hohenzollern	2,1	2,2	2,5
Oberes Neckartal	2,0	2,1	2,4
Enztal	2,5	3,0	3,0
Bayern	2,3	3,0	2,4
Unterfranken	2,3	3,0	2,4
Mittelfranken	2,4	3,0	2,4
Übrige Gebiete	3,4	3,0	2,6
Saarland	2,3	2,5	2,1
Bundesgebiet	2,0	2,4	2,5
1960	1,9	2,1	
1961	2,4	2,4	
1962	2,3	2,4	
1963	2,5	2,9	
1964	1,8	2,0	
1965	2,1	2,1	
1966	2,3	2,4	
1967	2,1	2,2	
1968	2,3	2,3	