

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **B**

LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI

Reihe 2

Gartenbau und Weinwirtschaft

III. Weinwirtschaft

Stand der Reben

Juli 1970



Bestellnummer : 210230 - 700003

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	3
Tabellenteil	
1. Allgemeine Angaben über Witterung und Entwicklung der Reben	4
2. Verrieselungsschäden	5
3. Stand der Reben Ende Juli 1970	6

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden

. = kein Nachweis vorhanden

0 = mehr als nichts, aber weniger als
die Hälfte der kleinsten Einheit,
die in der Tabelle zur Dar-
stellung gebracht wird.

Die Angaben beziehen sich auf die Länder mit Weinbau

Erschienen im August 1970

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis: DM -,50

Ergebnisse für die einzelnen Länder werden in den "Statistischen
Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer C II 4
veröffentlicht.

Vorbemerkung

In der Berichtszeit vom 1. bis 24. Juli 1970 fielen in den weinbautreibenden Ländern überwiegend genügend Niederschläge, so daß der Boden für das Wachstum der Reben ausreichend mit Feuchtigkeit versorgt war. Die Mehrzahl der Berichterstatter in Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Bayern sah die Temperatur und die Sonnenscheindauer in dieser Zeit als normal bzw. genügend an, in Nordrhein-Westfalen hingegen als ungünstig bzw. zu gering. Im Saarland wurden die Temperaturen meist sogar als günstig, die Sonnenscheindauer jedoch als zu gering bezeichnet.

Im Ganzen gesehen beurteilten die Berichterstatter die Witterung in der Berichtszeit zu 45 % als "gut" gegenüber 83 % im Vormonat bzw. 63 % in der Vergleichszeit des Vorjahres. In 50 % der Meldungen wurde sie als "mittel" und in 5 % als "schlecht" bewertet.

	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970
Ansatz der Trauben in %												
schlecht	1	3	8	2	2	-	1	1	2	3	1	0
mittel	39	16	79	70	27	12	41	65	29	52	62	20
gut	60	81	13	28	71	88	58	34	69	45	37	80
Mosternte in Mill. hl.	4,3	7,4	3,6	3,9	6,0	7,2	5,0	4,8	6,1	6,0	5,9	.

Der hohe Anteil der Meldungen über einen guten Ansatz der Trauben läßt einen entsprechenden Ertrag erwarten. Voraussetzung hierfür ist allerdings, daß die Witterung weiterhin günstig verläuft.

In diesem Jahr wurden zur Zeit der Blüte bei den wichtigsten Weiß- und Rotweinsorten - mit Ausnahme beim Gutedel - geringere Verrieselungsschäden als 1969 festgestellt.

Den Stand der Reben beurteilten die Berichterstatter im Durchschnitt des Bundesgebietes mit der Note 1,9, d.h. um eine Zehntelnote besser als im Vormonat und um drei Zehntelnoten günstiger als im Juli 1969. Diese Durchschnittsnote wurde in den letzten 10 Jahren nur 1964 erzielt.

1. Allgemeine Angaben über Witterung und Entwicklung der Reben

% der ausgewerteten Meldungen

Berichts- gegenstand und Beurteilung	Nordrh- Westfl.	Hessen	Rheinl- Pfalz	Baden- Württbg.	Bayern	Saar- land	Bundesgebiet		
							1970		1969
							Juli	Juni	Juli
Wetterschäden									
keine	50	69	73	74	75	86	73	76	77
schwache	50	9	19	19	21	14	19	17	15
mittlere	-	13	7	6	4	-	7	5	6
starke	-	9	1	1	-	-	1	2	2
Niederschläge									
zu gering	-	-	5	5	20	-	6	10	6
ausreichend	25	84	85	89	78	71	86	86	91
zu hoch	75	16	10	6	2	29	8	4	3
Temperaturverlauf									
ungünstig	75	28	21	10	22	29	18	1	7
normal	-	59	57	55	56	14	55	25	38
günstig	25	13	22	35	22	57	27	74	55
Sonnenscheindauer									
zu gering	100	44	27	13	21	71	22	1	9
genügend	-	47	65	70	70	29	67	47	52
reichlich	-	9	8	17	9	-	11	52	39
Witterung für die Reben									
schlecht	50	13	6	2	8	29	5	0	2
mittel	50	47	56	41	59	14	50	17	35
gut	-	40	38	57	33	57	45	83	63
Ansatz der Trauben									
schlecht	25	-	-	-	5	-	0	.	1
mittel	-	19	14	20	48	71	20	.	62
gut	75	81	86	80	47	29	80	.	37
Durchführung der Pflegearbeiten									
vollständig	-	75	70	86	80	86	78	75	80
unvollständig	100	25	30	14	20	14	22	25	20

2. Verrieselungsschäden

% der Ertragsreiblefläche

Land	Schäden 1)	Weißweinsorten						Rotweinsorten		
		Silvaner	Riesling	Müller-Thurgau	Elbling	Gutedel	Ruländer	Portugieser	Burgunder	Trollinger
Nordrhein-Westfalen	keine	100	100	100	-	-	-	100	100	-
	schwache	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	mittlere	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	starke	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hessen	keine	87	69	82	-	-	-	67	96	-
	schwache	11	27	15	-	-	-	33	4	-
	mittlere	2	3	3	-	-	-	-	-	-
	starke	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Rheinland-Pfalz	keine	90	86	91	-	-	-	96	.	-
	schwache	8	12	8	-	-	-	4	.	-
	mittlere	2	2	1	-	-	-	0	.	-
	starke	-	-	-	-	-	-	-	.	-
Baden-Württemberg	keine	89	77	84	-	55	79	92	79	91
	schwache	9	17	14	-	29	15	7	14	8
	mittlere	2	5	2	-	14	6	1	6	1
	starke	0	1	0	-	2	-	0	1	0
Bayern	keine	82	79	79	-	-	-	86	78	-
	schwache	16	19	17	-	-	-	14	22	-
	mittlere	2	2	3	-	-	-	-	-	-
	starke	0	-	1	-	-	-	-	-	-
Saarland	keine	-	-	100	100	-	100	-	100	-
	schwache	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	mittlere	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	starke	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bundesgebiet 1970	keine	89	82	88	100	55	79	96	79	91
	schwache	9	15	10	-	29	15	4	14	8
	mittlere	2	3	2	-	14	6	0	6	1
	starke	0	0	0	-	2	-	-	1	0
1969	keine	80	75	79	63	60	59	85	65	81
	schwache	14	18	15	18	31	24	11	20	13
	mittlere	5	6	5	15	9	13	3	13	6
	starke	1	1	1	4	0	4	1	2	-

1) schwach = Schäden von 10 bis unter 25 %
mittel = " " 25 " " 50 %
stark = " " 50 % und mehr.

3. Stand der Reben

Noten: 1,0 (sehr gut) = mehr als 3/4 Herbst, 2,0 (gut) = mehr als 1/2 bis 3/4 Herbst, 3,0 (mittel) = 1/2 Herbst, 4,0 (gering) = 1/4 bis 1/2 Herbst, 5,0 (sehr gering) = weniger als 1/4 Herbst

Land Verwaltungsbezirk Weinbauggebiet	Note			
	1970			1969
	Juli	Juni	Mai	Juli
Nordrhein-Westfalen	2,2	2,0	3,4	2,0
Hessen	1,9	1,8	2,5	2,1
Hessische Bergstraße	1,9	2,0	2,2	2,1
Rheingau	1,9	1,8	2,5	2,1
Rheinland-Pfalz	1,9	2,0	2,4	2,3
Rheinland-Nassau 1)
Mittelrhein (einschl. Lahn)	2,0	2,0	2,3	.
Nahe (Koblenz)	2,0	2,0	2,4	2,3
Obermosel	1,9	1,9	2,2	2,2
Saar	2,1	2,1	2,4	2,2
Ruwer	2,2	2,2	2,6	1,9
Mittelmosel	1,9	2,0	2,3	2,1
Untermosel	2,0	2,1	2,3	2,3
Ahr	1,9	2,0	2,2	2,0
Rhein Hessen 1)
Worms u. Umg.	1,9	2,0	2,5	2,3
Oppenheim u. Umg.	1,6	2,1	2,2	2,5
Mainz u. Umg.	2,0	2,0	2,4	2,4
Ingelheim u. Umg.	1,9	1,9	2,3	2,5
Wiesbach	2,0	2,1	2,3	2,6
Bingen u. Umg.	2,0	2,0	2,2	2,4
Nahe (Rhein Hessen)	1,6	1,9	2,4	2,5
Alzey u. Umg.	2,0	2,1	2,4	2,3
Pfalz 1)
Mittelhaardt	1,7	1,8	2,3	2,2
Oberhaardt	1,8	1,8	2,4	2,2
Unterhaardt m. Zellertal	1,9	2,0	2,2	2,4
Nahe (Pfalz)	2,1	2,2	2,5	2,5
Baden-Württemberg	2,0	2,0	2,3	2,4
Nordwürttemberg	1,9	1,9	2,2	2,3
Oberes Neckartal	2,5	2,9	2,3	2,6
Unteres "	1,8	1,9	2,2	2,4
Remstal	1,8	1,7	2,3	2,2
Enztal	2,1	2,0	2,3	2,4
Zabergäu	1,9	1,9	2,3	2,2
Kocher- u. Jagsttal	1,9	1,9	2,3	2,1
Tauber- u. Jagsttal	1,8	2,2	1,9	2,1

1) Wegen Gebietsreform nicht nachgewiesen.-

3. Stand der Reben

Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Note			
	1970			1969
	Juli	Juni	Mai	Juli
Nordbaden	2,1	2,1	2,4	2,5
Tauber- u. Maintal	2,4	2,3	2,5	2,3
Neckar- u. Jagsttal	2,1	2,3	2,4	2,0
Bergstraße	2,0	1,9	2,4	2,4
Kraichgau	2,1	2,1	2,4	2,6
Pfinz-, Enz- u. Albthal	2,2	2,1	2,3	2,6
Südbaden	2,0	2,0	2,3	2,5
Seegegend	1,6	1,5	1,9	2,0
Oberes Rheintal	2,2	1,7	1,4	2,1
Markgräflerland	2,3	2,1	2,5	2,6
Kaiserstuhl	1,9	2,0	2,3	2,5
Breisgau	2,1	2,0	2,3	2,5
Ortenau u. Bühlergegend	2,0	1,9	2,2	2,4
Südwürttemberg-Hohenzollern	2,0	2,1	2,2	2,3
Oberes Neckartal	2,0	2,0	2,1	2,2
Enztal	2,3	2,5	3,0	3,0
Bayern	2,3	2,3	3,0	2,1
Unterfranken	2,3	2,3	3,0	2,1
Mittelfranken	2,3	2,4	3,0	2,2
Übrige Gebiete	3,4	3,4	3,0	2,6
Saarland	2,2	2,3	2,5	2,3
<u>Bundesgebiet</u>	1,9	2,0	2,4	2,3
1960	2,0	1,9	2,1	
61	2,8	2,4	2,4	
62	2,5	2,3	2,4	
63	2,3	2,5	2,9	
64	1,9	1,8	2,0	
65	2,3	2,1	2,1	
66	2,3	2,3	2,4	
67	2,0	2,1	2,2	
68	2,4	2,3	2,3	
69	2,3	2,5	2,3	