

STATISTISCHES  
BUNDESAMT  
WIESBADEN

FACHSERIE **B**

# LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI


Reihe 2

Gartenbau und Weinwirtschaft

III. Weinwirtschaft

**Vorschätzung der Weinmoststernte**

Oktober 1971



Bestellnummer: 210230 – 710006

VERLAG W. KOHLHAMMER, STUTTGART UND MAINZ

## Inhalt

	Seite
Vorbemerkung . . . . .	3
Tabellenteil:	
1. Allgemeine Angaben über die Witterung . . . . .	4
2. Beurteilung des Weinmostes 1959 - 1971 . . . . .	4
3. Beginn der Lese . . . . .	5
4. Mostertrag, Mostgewicht und Güte des Mostes	
a) Weinmost insgesamt . . . . .	6
b) Weißmost . . . . .	10
c) Rotmost . . . . .	14
5. Mostertrag und Mostgewicht nach Rebsorten . . . . .	18

### Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden
- 0 = mehr als nichts, aber weniger als die Hälfte der kleinsten Einheit, die in der Tabelle zur Darstellung gebracht werden kann.

Die Angaben beziehen sich auf die Länder mit Weinbau

Erschienen im Dezember 1971

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis: DM 2,--

Ergebnisse für die einzelnen Länder werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer C II 4 veröffentlicht.

### Vorbemerkung

In der Berichtszeit vom 25. September bis 15. Oktober wurde der Witterungsverlauf von 90 % der Berichterstatter als gut und von 10 % als mittel beurteilt.

Aufgrund der allgemeinen für die Reife der Trauben sehr günstigen Witterungsbedingungen setzte die Lese etwas früher als im vorigen Jahr ein. Bei Frühsorten wie Müller-Thurgau und Portugieser begann die Hauptlese bereits im September und in der ersten Oktoberdekade. Die Lese der späterreifenden Rebsorten wie Silvaner, Riesling und Burgunder setzte überwiegend im Zeitraum vom 1. bis 20. Oktober ein.

Die Beurteilung der Güte des Mostes durch die Berichterstattung erreichte - obwohl es sich hinsichtlich der Güte um einen der besten Jahrgänge im Beobachtungszeitraum seit 1950 handelt - nicht ganz die Werte des berühmten Jahrgangs 1959. Es wurden 49 % sehr gute, 42 % gute und 9 % mittlere Moste erwartet. Das durchschnittliche Mostgewicht wird nach der gegenwärtigen Beurteilung bei Weißmost (81 ° Oechsle) um ca. 10° unter dem endgültigen des Jahres 1959 vermutet. Bei Rotmost liegt das durchschnittliche Mostgewicht mit 82° um ca. 3° unter dem 1959er Ergebnis. Der durchschnittliche Säuregehalt wird in diesem Jahr besonders günstig bewertet. Die Durchschnittswerte von 8,5 ‰ bei Weißmost und 7,9 ‰ bei Rotmost liegen um einiges höher als im Jahr 1959 und eröffnen somit günstige Aussichten auf besonders harmonische Weine.

Die vorliegende zweite Vorschätzung des Hektarertrages brachte gegenüber den Angaben des Vormonats eine leichte Erhöhung. Bei Weißmost stiegen die Erträge von 74,2 hl/ha auf 77,0 hl/ha und bei Rotmost von 73,2 hl/ha auf 74,9 hl/ha. Es kann demnach mit einem durchschnittlichen Hektarertrag von 76,7 hl und einer Erntemenge von 5,8 Mill. hl für Weinmost insgesamt gerechnet werden. Auf Weißmost entfällt davon eine Erntemenge von 5,0 Mill. hl und auf Rotmost 0,8 Mill. hl.

1. Allgemeine Angaben über die Witterung

% der ausgewerteten Meldungen

Berichtsgegenstand und Beurteilung	Nordrhein- West- falen	Hessen	Rhein- land- Pfalz	Baden- Württem- berg	Bayern	Saar- land	Bundesgebiet		
							Oktober	September	Oktober
							1971		1970
<b>Wetterschäden</b>									
keine	100	86	83	95	95	25	89	86	95
schwache	-	11	12	3	4	-	7	8	4
mittlere	-	3	4	2	-	-	3	4	1
starke	-	-	1	0	1	75	1	2	-
<b>Niederschläge</b>									
zu gering	75	74	78	81	73	-	78	75	11
ausreichend	25	26	22	19	27	100	22	25	86
zu hoch	-	-	-	-	-	-	-	-	3
<b>Temperaturverlauf</b>									
ungünstig	-	-	-	-	3	-	0	0	6
normal	-	11	15	7	10	-	11	11	46
günstig	100	89	85	93	87	100	89	89	48
<b>Sonnenscheindauer</b>									
zu gering	-	-	-	-	-	-	-	-	16
genügend	50	20	16	7	16	-	12	13	62
reichlich	50	80	84	93	84	100	88	87	22
<b>Witterung für die Reben und Trauben</b>									
schlecht	-	-	-	-	-	-	-	0	1
mittel	-	6	13	7	16	-	10	17	36
gut	100	94	87	93	84	100	90	83	63

2. Beurteilung des Weinmostes 1959 - 1971

Jahr	Güte des Mostes Weinmost insgesamt					Ø Mostgewicht		Ø Säuregehalt	
	sehr gut	gut	mittel	gering	sehr gering	weiß	rot	weiß	rot
	% der Mostmenge					Grad Oechsle		Promille	
1959	68	27	4	1	-	92	85	7,4	6,6
1960	6	35	45	12	2	68	66	9,8	9,3
1961	13	46	34	7	0	73	70	9,3	7,8
1962	14	46	30	9	1	74	72	10,8	9,5
1963	8	36	41	13	2	69	72	10,5	9,0
1964	23	49	24	4	0	78	75	7,1	6,2
1965	1	14	44	32	9	61	61	13,7	12,6
1966	21	52	24	3	0	77	75	8,6	8,3
1967	12	41	37	9	1	73	73	10,8	9,5
1968	0	11	44	36	9	61	61	12,6	12,1
1969	10	39	44	7	0	70	72	11,0	10,6
1970	8	40	42	10	0	64	65	10,3	9,9
1971	49	42	9	0	0	81	82	8,5	7,9

1959 - 1970 Endgültige Ergebnisse.

## 3. Beginn der Lese

% der ausgewerteten Meldungen

Rebsorten Länder mit Weinbau	Vor dem 1. Oktober	1. - 10. Oktober	11. - 20. Oktober	Nach dem 20. Oktober	Rebsorten Länder mit Weinbau	Vor dem 1. Oktober	1. - 10. Oktober	11. - 20. Oktober	Nach dem 20. Oktober		
<u>Weißes Gewächs</u>											
<u>Silvaner</u>					<u>Ruländer</u>						
Bundesgebiet	1967	9	67	23	1	Hessen	.	.	.		
	1968	6	54	31	9	Baden-Württemberg	7	40	39		
	1969	2	49	37	12	Saarland	100	-	-		
	1970	-	13	55	32	<u>Rotes Gewächs</u>					
	1971	17	46	32	5						
Nordrhein-Westfalen		-	100	-	-						
Hessen		17	50	33	-						
Rheinland-Pfalz		34	61	5	-						
Baden-Württemberg		3	30	53	14						
Bayern		1	37	62	-						
Saarland		-	-	-	-						
<u>Riesling</u>					<u>Portugieser</u>						
Bundesgebiet	1967	5	48	39	8	Bundesgebiet	1967	62	33	5	0
	1968	3	31	37	29		1968	50	33	15	2
	1969	1	28	47	24		1969	46	42	11	1
	1970	-	5	37	58		1970	20	39	32	9
	1971	2	39	49	10		1971	52	42	6	0
Nordrhein-Westfalen		-	50	50	-	Nordrhein-Westfalen		-	-	100	-
Hessen		3	32	65	-	Hessen		67	33	-	-
Rheinland-Pfalz		2	52	44	2	Rheinland-Pfalz		91	9	-	-
Baden-Württemberg		3	22	53	22	Baden-Württemberg		13	75	11	1
Bayern		5	27	54	14	Bayern		6	75	19	-
Saarland		-	-	-	-	Saarland		-	-	-	-
<u>Müller-Thurgau</u>					<u>Burgunder</u>						
Bundesgebiet	1967	70	27	2	1	Bundesgebiet	1967	16	55	28	1
	1968	58	37	4	1		1968	4	35	55	6
	1969	57	38	4	1		1969	2	37	53	8
	1970	3	55	37	5		1970	-	8	52	40
	1971	44	46	10	0		1971	6	36	45	13
Nordrhein-Westfalen		-	50	50	-	Nordrhein-Westfalen		-	-	-	-
Hessen		62	38	-	-	Hessen		33	33	34	-
Rheinland-Pfalz		68	31	1	-	Rheinland-Pfalz		.	.	.	.
Baden-Württemberg		24	57	18	1	Baden-Württemberg		5	36	45	14
Bayern		10	68	21	1	Bayern		-	43	57	-
Saarland		100	-	-	-	Saarland		100	-	-	-
<u>Elbling</u>					<u>Schwarzriesling</u>						
Saarland		100	-	-	-	Baden-Württemberg		6	58	31	5
<u>Gutedel</u>					<u>Trollinger</u>						
Baden-Württemberg		9	28	57	6	Baden-Württemberg		3	18	56	23
					<u>Limberger</u>						
					Baden-Württemberg						
					6						
					24						
					46						
					24						

4. Mostertrag, Mostgewichta) Weinmost

Lfd. Nr.	Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Reb- fläche im Ertrag	Mostertrag			
			je ha	ins- gesamt	Durchschnittl.	
					Most- ge- wicht	Säure- ge- halt
ha	hl	Grad	Promille			
1	Nordrhein-Westfalen	18	43,6	785	81	7,6
2	Hessen	3 308	59,5	196 826	85	9,2
3	Hess. Bergstraße	273	62,7	17 127	88	9,7
4	Rheingau	3 035	59,2	79 699	84	9,1
5	Rheinland-Pfalz	52 854	83,0	4 384 592	80	8,5
6	Mittelrhein (einschl. Lahn)	848	63,8	54 113	74	10,1
7	Nahe (Koblenz)	3 258	68,3	222 529	83	9,4
8	Obermosel	898	109,8	98 576	66	11,6
9	Saar	1 044	88,5	92 412	75	11,7
10	Ruwer	317	98,7	31 295	75	12,9
11	Mittelmosel	5 789	103,1	596 810	77	10,2
12	Untermosel	2 821	98,9	278 988	73	10,7
13	Ahr	495	71,8	35 535	79	8,2
14	Worms und Umgegend	5 369	76,7	412 008	83	7,4
15	Oppenheim und Umgegend	1 431	64,0	91 623	86	7,8
16	Mainz und Umgegend	1 100	66,1	72 740	85	7,3
17	Ingelheim und Umgegend	1 459	72,8	106 282	85	7,9
18	Wiesbach	1 957	66,6	130 302	84	7,5
19	Bingen und Umgegend	364	74,4	27 077	84	8,1
20	Nahe (Rheinhessen)	697	75,0	52 306	81	7,4
21	Alzey und Umgegend	5 704	75,1	428 227	82	7,4
22	Mittelhaardt	5 865	83,5	489 771	80	7,4
23	Oberhaardt	10 804	87,3	943 576	80	8,2
24	Unterhaardt mit Zellertal	2 170	88,2	191 325	80	7,4
25	Nahe (Pfalz)	464	62,7	29 097	82	8,4
26	Baden-Württemberg	16 453	65,4	1 076 117	85	7,9
27	Nordwürttemberg	6 440	69,9	450 123	82	8,6
28	Oberes Neckartal	34	50,9	1 732	74	8,0

und Güte des Mostes:

insgesamt

Mostgewicht nach Oechsle						Güte des Mostes					Lfd. Nr.
Anteil des Mostertraces						sehr gut	gut	mittel	ge- ring	sehr gering	
unter 50°	50° bis unter 60°	60° bis unter 70°	70° bis unter 80°	80° bis unter 90°	90° und mehr						
%											
-	-	-	43	57	-	57	38	5	-	-	1
-	-	1	23	56	20	50	40	10	-	-	2
-	-	-	4	61	35	86	13	1	-	-	3
-	-	1	26	55	18	47	43	10	-	-	4
0	1	12	37	40	10	45	46	9	0	0	5
-	2	26	57	13	2	31	55	14	0	-	6
-	-	4	28	55	13	51	42	7	-	-	7
-	10	74	16	0	-	34	58	8	-	-	8
-	5	13	59	19	4	33	53	14	0	-	9
-	6	17	54	21	2	11	76	13	-	-	10
-	0	21	48	24	7	32	50	17	1	-	11
-	2	39	42	12	5	34	46	19	1	-	12
-	0	22	26	40	12	52	44	4	-	-	13
-	-	3	30	55	12	50	42	8	0	-	14
-	-	0	15	61	24	54	45	1	-	-	15
-	-	-	19	60	21	49	48	3	-	-	16
-	-	0	23	59	18	59	39	2	-	-	17
-	-	1	29	53	17	58	40	2	-	-	18
-	-	-	23	67	10	45	55	-	-	-	19
-	-	1	42	53	4	39	57	4	-	-	20
-	-	5	28	54	13	56	37	7	-	-	21
-	0	9	47	33	11	46	40	12	1	1	22
-	0	9	38	44	9	44	49	7	0	-	23
0	0	8	45	37	10	47	46	7	0	-	24
-	-	4	41	41	14	41	50	7	2	-	25
-	-	1	20	47	32	67	29	4	0	0	26
-	-	0	20	55	25	61	33	6	0	-	27
-	-	-	100	-	-	30	70	-	-	-	28

## 4. Mostertrag, Mostgewicht

a) Weinmost

Lfd. Nr.	Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Reb- fläche im Ertrag	Mostertrag			
			je ha	ins- gesamt	Durchschnittl.	
					Most- ge- wicht	Säure- ge- halt
ha	hl					
29	Unteres Neckartal	3 498	66,8	233 744	82	8,4
30	Remstal	784	76,6	60 028	82	8,9
31	Enztal	549	80,3	44 109	80	9,1
32	Zabergäu	997	79,6	79 313	84	8,6
33	Kocher und Jagsttal	446	51,5	22 984	82	8,5
34	Tauber- und Jagsttal	132	62,2	8 213	83	7,8
35	Nordbaden	1 951	68,5	133 607	83	7,4
36	Tauber- und Maintal	303	46,3	14 014	84	7,1
37	Neckar- und Jagsttal	59	33,4	1 972	82	7,8
38	Bergstraße	658	73,8	48 567	82	7,6
39	Kraichgau	819	76,5	62 626	83	7,3
40	Pfinz-, Enz- und Albtal	112	57,4	6 428	80	8,4
41	Südbaden	8 037	61,1	491 438	88	7,3
42	See- und Oberrhein- gegend	152	79,6	12 092	87	8,5
43	Oberes Rheintal	27	88,1	2 380	86	12,0
44	Markgräflerland	1 438	59,4	85 408	83	7,2
45	Kaiserstuhl	2 913	64,7	188 604	91	7,0
46	Breisgau	1 871	60,1	112 430	89	7,3
47	Ortenau und Bühler- gegend <sup>1)</sup>	1 636	55,3	90 524	88	8,0
48	Südwestfalen-Hohenzollern	25	38,0	949	80	8,3
49	Oberes Neckartal	21	41,0	861	79	8,3
50	Enztal	3	10,7	32	90	8,0
51	Bayern	2 629	42,8	112 411	90	7,3
52	Unterfranken	2 358	42,2	99 588	89	7,2
53	Mittelfranken	266	47,6	12 659	91	7,4
54	Übrige Gebiete	5	32,8	164	78	10,9
55	Saarland	33	108,4	3 601	69	11,0
56	Bundesgebiet	75 295	76,7	5 774 332	81	8,4
57	1970 <sup>2)</sup>	73 700	134,2	9 889 019	.	.

1) Einschl. Tettang. - 2) Endgültige Ergebnisse.



und Güte des Mostes

insgesamt

Mostgewicht nach Oechsle						Güte des Mostes					Lfd. Nr.
Anteil des Mostertrages											
unter 50°	50° bis unter 60°	60° bis unter 70°	70° bis unter 80°	80° bis unter 90°	90° und mehr	sehr gut	gut	mittel	ge- ring	sehr gering	
%											
-	-	0	16	56	28	62	32	6	-	-	29
-	-	-	7	58	35	57	39	4	-	-	30
-	-	1	40	49	10	61	35	4	-	-	31
-	-	-	14	58	28	62	30	8	-	-	32
-	-	-	19	54	27	45	53	2	-	-	33
-	-	-	38	50	12	79	13	7	1	-	34
-	-	1	34	39	26	59	36	5	0	0	35
-	-	-	18	63	19	50	48	2	0	0	36
-	-	-	31	55	14	51	46	3	-	-	37
-	-	-	35	33	32	58	34	8	0	-	38
-	-	1	34	33	32	61	36	2	1	0	39
-	-	11	55	28	6	60	34	6	-	-	40
-	-	0	8	41	51	76	22	2	0	-	41
-	-	-	10	40	50	63	30	7	-	-	42
-	-	-	25	50	25	84	16	-	-	-	43
-	-	3	15	49	33	68	29	3	0	-	44
-	-	-	-	37	63	81	18	1	0	-	45
-	-	-	5	43	52	75	24	1	-	-	46
-	-	-	9	35	56	75	21	4	-	-	47
-	-	-	47	41	12	65	28	7	-	-	48
-	-	-	53	47	-	62	31	7	-	-	49
-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	50
-	0	2	11	44	43	66	30	4	0	-	51
-	0	2	11	47	40	67	29	4	0	-	52
-	0	1	12	24	63	61	33	5	1	-	53
-	-	-	58	42	-	-	68	32	-	-	54
-	-	50	25	25	-	50	50	-	-	-	55
0	1	9	33	42	15	49	42	9	0	0	56
•	•	•	•	•	•	7	38	46	9	0	57

## 4. Mostertrag, Mostgewicht

b) Weiß

Lfd. Nr.	Land Verwaltungsbezirk Weinbaugesbiet	Reb- fläche im Ertrag	Mostertrag			
			je ha	ins- gesamt	Durchschnittl.	
					Most- ge- wicht	Säure- ge- halt
ha	hl	Grad	Promille			
1	Nordrhein-Westfalen	17	43,7	743	81	7,7
2	Hessen	3 250	59,8	194 326	85	9,2
3	Hess. Bergstraße	271	62,8	17 027	88	9,7
4	Rheingau	2 979	59,5	177 299	84	9,2
5	Rheinland-Pfalz	48 483	82,3	3 991 263	80	8,6
6	Mittelrhein (einschl. Lahn)	838	63,7	53 381	74	10,1
7	Nahe (Koblenz)	3 233	68,3	220 814	83	9,4
8	Obermosel	898	109,8	98 576	66	11,6
9	Saar	1 043	88,5	92 340	75	11,7
10	Ruwer	317	98,7	31 295	75	12,9
11	Mittelmosel	5 785	103,1	596 525	77	10,2
12	Untermosel	2 814	99,0	278 503	73	10,7
13	Ahr	194	72,7	14 104	74	8,3
14	Worms und Umgegend	4 995	76,0	379 620	83	7,4
15	Oppenheim und Umgegend	1 426	64,0	91 264	87	7,8
16	Mainz und Umgegend	1 037	65,8	68 235	85	7,3
17	Ingelheim und Umgegend	1 127	72,3	81 482	85	7,9
18	Wiesbach	1 815	65,4	118 701	84	7,5
19	Bingen und Umgegend	344	73,8	25 387	84	8,1
20	Nahe (Rheinhausen)	665	74,7	49 676	81	7,4
21	Alzey und Umgegend	5 483	74,8	410 128	83	7,4
22	Mittelhaardt	4 462	80,9	360 976	81	7,5
23	Oberhaardt	10 081	86,7	874 023	80	8,3
24	Unterhaardt mit Zellertal	1 464	80,1	117 266	82	7,6
25	Nahe (Pfalz)	462	62,7	28 967	82	8,4
26	Baden-Württemberg	10 058	65,6	659 502	85	7,6
27	Nordwürttemberg	2 687	66,5	178 762	83	8,8
28	Oberes Neckartal	33	50,8	1 678	74	8,0

und Güte des Mostes

most

Mostgewicht nach Oechsle						Güte des Mostes					Lfd. Nr.
Anteil des Mostertrages											
unter 50°	50° bis unter 60°	60° bis unter 70°	70° bis unter 80°	80° bis unter 90°	90° und mehr	sehr gut	gut	mittel	ge- ring	sehr gering	
%											
-	-	-	44	56	-	59	35	6	-	-	1
-	-	1	23	56	20	50	40	10	-	-	2
-	-	-	4	60	36	86	13	1	-	-	3
-	-	1	26	56	17	47	43	10	-	-	4
0	1	11	36	41	11	45	45	10	0	0	5
-	2	26	57	13	2	31	55	14	0	-	6
-	-	4	28	55	13	51	42	7	-	-	7
-	10	74	16	0	-	34	58	8	-	-	8
-	5	13	59	19	4	33	53	14	0	-	9
-	6	17	54	21	2	11	76	13	-	-	10
-	0	21	48	24	7	32	50	17	1	-	11
-	2	39	42	12	5	34	46	19	1	-	12
-	0	36	38	24	2	48	43	9	-	-	13
-	-	2	27	58	13	51	41	8	0	-	14
-	-	0	15	61	24	54	45	1	-	-	15
-	-	-	19	59	22	50	47	3	-	-	16
-	-	0	22	61	17	59	39	2	-	-	17
-	-	0	28	54	18	59	40	1	-	-	18
-	-	-	23	66	11	48	52	-	-	-	19
-	-	-	42	54	4	39	57	4	-	-	20
-	-	5	28	54	13	56	37	7	-	-	21
-	0	6	44	35	15	50	36	12	1	1	22
-	0	9	37	45	9	44	49	7	0	-	23
0	0	3	38	46	13	51	43	6	0	-	24
-	-	4	41	41	14	41	50	7	2	-	25
-	-	0	18	49	33	68	29	3	0	0	26
-	-	-	20	55	25	58	37	5	0	-	27
-	-	-	100	-	-	27	73	-	-	-	28

## 4. Mostertrag, Mostgewicht

b) Weiß

Lfd. Nr.	Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Reb- fläche im Ertrag	Mostertrag			
			je ha	ins- gesamt	Durchschnittl.	
					Most- ge- wicht	Säure- ge- halt
ha	hl	Grad	Promille			
29	Unteres Neckartal	1 348	65,2	87 946	83	8,6
30	Remstal	361	71,7	25 891	85	8,6
31	Enztal	111	73,2	8 125	81	9,0
32	Zabergäu	347	83,2	28 861	84	9,7
33	Kocher- und Jagsttal	365	50,9	18 576	83	8,7
34	Tauber- und Jagsttal	122	63,0	7 685	83	7,8
35	Nordbaden	1 560	70,0	109 130	83	7,3
36	Tauber- und Maintal	280	46,4	12 993	84	7,1
37	Neckar- und Jagsttal	41	35,5	1 454	82	7,5
38	Bergstraße	539	74,0	39 887	83	7,5
39	Kraichgau	644	79,4	51 106	84	7,2
40	Pfinz-, Enz- u. Albtal	56	65,9	3 690	78	8,1
41	Südbaden	5 800	64,0	371 143	87	7,1
42	Seegegend	81	83,8	6 788	84	8,0
43	Oberes Rheintal	4	97,3	389	81	.
44	Markgräflerland	1 326	59,7	79 216	82	7,1
45	Kaiserstuhl	2 072	66,9	138 593	90	6,7
46	Breisgau	1 255	64,5	80 986	87	6,9
47	Ortenau und Bühler- gegend	1 062	61,4	65 171	87	8,0
48	Südwürttemberg-Hohenzollern <sup>1)</sup>	11	42,5	467	78	8,6
49	Oberes Neckartal	10	41,4	414	78	8,6
50	Enztal	0	40,4	3	.	.
51	Bayern	2 592	42,9	111 233	90	7,3
52	Unterfranken	2 321	42,4	98 410	89	7,2
53	Mittelfranken	266	47,6	12 659	91	7,4
54	Übrige Gebiete	5	32,8	164	78	10,9
55	Saarland	33	108,6	3 590	69	11,0
56	Bundesgebiet	64 433	77,0	4 960 657	81	8,5
57	1970 <sup>2)</sup>	63 024	130,8	8 246 443	66	10,0

1) Einschl. Tettng. - 2) Endgültige Ergebnisse.

und Güte des Mostes

most

Mostgewicht nach Oechsle						Güte des Mostes					Lfd. Nr.
Anteil des Mostertrages											
unter 50°	50° bis unter 60°	60° bis unter 70°	70° bis unter 80°	80° bis unter 90°	90° und mehr	sehr gut	gut	mittel	ge- ring	sehr gering	
-	-	-	16	57	27	61	34	5	-	-	29
-	-	-	-	59	41	65	33	2	-	-	30
-	-	-	42	47	11	65	34	1	-	-	31
-	-	-	12	59	29	45	41	14	-	-	32
-	-	-	18	56	26	44	54	2	-	-	33
-	-	-	36	57	7	80	12	7	1	-	34
-	-	0	29	44	27	62	35	2	1	0	35
-	-	-	17	66	17	50	49	1	0	0	36
-	-	-	21	62	17	57	42	1	-	-	37
-	-	-	27	39	34	64	32	4	0	-	38
-	-	-	29	34	37	63	35	1	1	0	39
-	-	3	62	32	3	67	28	5	-	-	40
-	-	0	9	45	46	75	23	2	0	-	41
-	-	-	14	36	50	53	41	6	-	-	42
-	-	-	40	40	20	72	28	-	-	-	43
-	-	2	17	49	32	68	30	2	-	-	44
-	-	-	-	43	57	81	18	1	0	-	45
-	-	-	6	47	47	73	26	1	-	-	46
-	-	-	8	42	50	74	21	5	-	-	47
-	-	-	53	40	7	60	33	7	-	-	48
-	-	-	57	43	-	55	37	8	-	-	49
.	.	.	.	.	.	100	-	-	-	-	50
-	0	2	11	43	44	66	30	4	0	-	51
-	0	2	11	47	40	67	29	4	0	-	52
-	0	1	12	24	63	61	33	5	1	-	53
-	-	-	58	42	-	-	68	32	-	-	54
-	-	50	25	25	-	50	50	-	-	-	55
0	1	9	33	42	15	49	42	9	0	0	56
.	25	44	23	6	2	12	35	36	14	3	57

## 4. Mostertrag, Mostgewicht

c) Rot

Lfd. Nr.	Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Reb- fläche im Ertrag	Mostertrag			
			je ha	ins- gesamt	Durchschnittl.	
					Most- ge- wicht	Säure- ge- halt
ha	hl	Grad	Promille			
1	Nordrhein-Westfalen	1	42,0	42	80	6,0
2	Hessen	58	43,1	2 500	91	7,8
3	Hess. Bergstraße	2	50,0	100	84	9,3
4	Rheingau	56	42,9	2 400	91	7,7
5	Rheinland-Pfalz	4 371	90,0	393 329	78	7,4
6	Mittelrhein (einschl. Lahn)	10	73,2	732	73	9,8
7	Nahe (Koblenz)	25	68,6	1 715	83	7,9
8	Obermosel	0	.	.	.	.
9	Saar	1	.	.	.	.
10	Ruwer	0	.	.	.	.
11	Mittelmosel	4	.	.	.	.
12	Untermosel	7	69,3	485	92	7,3
13	Ahr	301	71,2	21 431	83	8,2
14	Worms und Umgegend	374	86,6	32 388	76	7,3
15	Oppenheim und Umgegend	5	.	.	.	.
16	Mainz und Umgegend	63	71,5	4 505	84	7,5
17	Ingelheim und Umgegend	332	74,7	24 800	84	8,1
18	Wiesbach	142	81,7	11 601	81	8,0
19	Bingen und Umgegend	20	84,5	1 690	82	8,0
20	Nahe (Rheinhessen)	32	82,2	2 630	75	7,8
21	Alzey und Umgegend	221	81,9	18 099	80	7,8
22	Mittelhaardt	1 403	91,8	128 795	76	7,3
23	Oberhaardt	723	96,2	69 553	76	7,5
24	Unterhaardt mit Zellertal	706	104,9	74 059	77	7,0
25	Nahe (Pfalz)	2	.	.	.	.
26	Baden-Württemberg	6 395	65,1	416 615	85	8,3
27	Nordwürttemberg	3 753	72,3	271 361	82	8,4
28	Oberes Neckartal	1	54,0	54	.	.

\*) Einschl. Most aus gemischten Beständen.

und Güte des Mostes

most\*)

Mostgewicht nach Oechsle						Güte des Mostes					Lfd. Nr.
Anteil des Mostertrages						sehr gut	gut	mittel	ge- ring	sehr gering	
unter 50°	50° bis unter 60°	60° bis unter 70°	70° bis unter 80°	80° bis unter 90°	90° und mehr						%
-	-	-	100	-	-	15	85	-	-	-	1
-	-	-	10	23	67	83	17	-	-	-	2
-	-	-	10	90	-	100	-	-	-	-	3
-	-	-	9	20	71	82	18	-	-	-	4
0	0	15	49	31	5	39	51	9	1	0	5
-	0	32	58	10	-	11	72	17	-	-	6
-	-	-	27	65	8	53	41	6	-	-	7
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11
-	-	-	-	28	72	3	97	-	-	-	12
-	-	12	18	51	19	55	45	-	-	-	13
-	-	18	58	21	3	31	58	10	1	-	14
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15
-	-	-	22	67	11	30	65	5	-	-	16
-	-	-	27	53	20	61	38	1	-	-	17
-	-	6	39	42	13	43	45	12	-	-	18
-	-	-	28	72	-	3	97	-	-	-	19
-	-	28	42	30	-	30	63	7	-	-	20
-	-	10	33	53	4	47	52	1	-	-	21
-	0	18	54	27	1	34	50	14	2	0	22
-	0	18	54	25	3	38	55	7	-	-	23
0	0	16	55	23	6	40	51	9	-	-	24
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	25
-	-	1	23	45	31	67	28	5	0	-	26
-	-	0	21	54	25	62	32	6	0	-	27
.	.	.	.	.	.	100	-	-	-	-	28

## 4. Mostertrag, Mostgewicht

c) Rot

Lfd. Nr.	Land Verwaltungsbezirk Weinbauggebiet	Reb- fläche im Ertrag	Mostertrag			
			je ha	ins- gesamt	Durchschnittl.	
					Most- ge- wicht	Säure- ge- halt
ha	hl	Grad	Promille			
29	Unteres Neckartal	2 150	67,8	145 798	82	8,3
30	Remstal	423	80,7	34 137	79	9,1
31	Enztal	438	82,2	35 984	80	9,1
32	Zabergäu	650	77,6	50 452	84	7,9
33	Kocher- u. Jagsttal	81	54,4	4 408	80	8,7
34	Tauber- u. Jagsttal	10	52,8	528	83	7,1
35	Nordbaden	391	62,6	24 477	79	8,1
36	Tauber- u. Maintal	23	44,4	1 021	85	7,7
37	Neckar- u. Jagsttal	18	28,8	518	80	8,7
38	Bergstraße	119	72,9	8 680	77	8,3
39	Kraichgau	175	65,8	11 520	80	7,8
40	Pfinz-, Enz- u. Alb- tal	56	48,9	2 738	82	8,7
41	Südbaden	2 237	53,8	120 295	93	8,1
42	See- gegend	71	74,7	5 304	91	9,1
43	Oberes Rheintal	23	86,6	1 991	87	12,0
44	Markgräflerland	112	55,3	6 192	89	8,1
45	Kaiserstuhl	841	59,5	50 011	95	7,7
46	Breisgau	616	51,0	31 444	93	8,2
47	Ortenau und Bühler- gegend	574	44,2	25 353	92	8,1
48	Südwestfalen-Hohenzollern <sup>1)</sup>	14	34,4	482	81	8,0
49	Oberes Neckartal	11	40,6	447	80	8,0
50	Enztal	3	11,0	29	90	8,0
51	Bayern	37	31,8	1 178	88	7,1
52	Unterfranken	37	31,8	1 178	88	7,1
53	Mittelfranken	-	-	-	-	-
54	Übrige Gebiete	-	-	-	-	-
55	Saarland	0	80,0	11	82	9,0
56	Bundesgebiet	10 862	74,9	813 675	82	7,9
57	1970 <sup>2)</sup>	10 676	153,9	1 642 576	66	10,0

\*) Einschl. Most aus gemischten Beständen. - 1) Einschl. Tettnang. - 2) Endgültige Ergebnisse.



und Güte des Mostes

most\*)

Mostgewicht nach Oechsle						Güte des Mostes					Lfd. Nr.
Anteil des Mostertrages											
unter 50°	50° bis unter 60°	60° bis unter 70°	70° bis unter 80°	80° bis unter 90°	90° und mehr	sehr gut	gut	mittel	ge- ring	sehr gering	
%											
-	-	1	17	55	27	63	30	7	-	-	29
-	-	-	14	57	29	51	44	5	-	-	30
-	-	1	38	51	10	60	35	5	-	-	31
-	-	-	15	58	27	72	23	5	-	-	32
-	-	-	21	50	29	49	50	1	-	-	33
-	-	-	40	40	20	65	29	5	1	-	34
-	-	3	44	31	22	44	42	14	0	-	35
-	-	-	20	50	30	42	40	18	-	-	36
-	-	-	45	45	10	32	58	10	-	-	37
-	-	-	55	17	28	28	45	26	1	-	38
-	-	1	42	32	25	55	39	5	1	-	39
-	-	25	44	19	12	50	43	7	-	-	40
-	-	1	5	23	71	80	18	2	0	-	41
-	-	-	-	50	50	77	15	8	-	-	42
-	-	-	-	67	33	86	14	-	-	-	43
-	-	6	6	44	44	73	22	3	2	-	44
-	-	-	-	8	92	83	16	1	-	-	45
-	-	-	-	23	77	81	19	-	-	-	46
-	-	-	11	11	78	77	20	3	-	-	47
-	-	-	42	42	16	70	24	6	-	-	48
-	-	-	50	50	-	68	25	7	-	-	49
-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	50
-	0	-	11	73	16	68	23	8	1	-	51
-	0	-	11	73	16	68	23	8	1	-	52
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54
-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	55
0	0	8	35	38	19	54	39	7	0	0	56
.	24	42	27	6	1	7	38	46	9	0	57

5. Mostertrag und Mostgewicht nach Rebsorten

Silvaner

Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Reb- fläche im Ertrag	Mostertrag				Mostergewicht nach Oechsle						
		je ha	ins- gesamt	Durchschnittl.		Anteil des Mostertrages						
				Most- ge- wicht	Säure- ge- halt	unter 50°	50° bis unter 60°	60° bis unter 70°	70° bis unter 80°	80° bis unter 90°	90° und mehr	
												Grad
ha	hl											
Nordrhein-Westfalen	2	43,0	86	79	8,6	-	-	-	100	-	-	
Hessen	283	52,8	14 942	84	8,5	-	-	1	20	47	32	
Hess. Bergstraße	78	64,2	5 008	86	9,2	-	-	-	8	38	54	
Rheingau	205	49,8	10 209	84	8,3	-	-	1	29	54	16	
Rheinland-Pfalz	15 471	76,0	1 175 110	82	8,1	0	0	4	31	51	14	
Mittelrhein (einschl. Lahn)	35	74,1	2 594	74	9,8	-	1	10	80	9	-	
Nahe (Koblenz)	1 151	64,9	74 700	84	8,8	-	-	2	23	57	18	
Obermosel	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Saar	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Ruwer	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Mittelmosel	12	78,9	947	77	8,1	-	-	12	56	29	3	
Untermosel	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Ahr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Worms und Umgegend	1 928	77,4	149 227	84	7,7	-	-	1	25	55	19	
Oppenheim und Umgegend	707	65,3	46 167	86	8,1	-	-	-	16	58	26	
Mainz und Umgegend	441	70,4	31 046	85	7,8	-	-	-	20	56	24	
Ingelheim und Umgegend	563	78,8	44 364	84	8,3	-	-	1	21	65	13	
Wiesbach	920	68,1	62 652	85	7,7	-	-	-	27	50	23	
Bingen und Umgegend	201	76,6	15 397	84	8,3	-	-	-	20	68	12	
Nahe (Rheinessen)	359	72,8	26 135	81	7,8	-	-	-	40	58	2	
Alzey und Umgegend	2 396	76,9	184 252	83	8,0	-	-	10	15	64	11	
Mittelhaardt	1 762	79,5	140 079	81	7,5	-	1	6	40	37	16	
Oberhaardt	4 194	81,0	339 714	80	8,5	-	-	6	43	42	9	
Unterhaardt mit Zellertal	572	77,2	44 158	83	7,7	0	0	3	33	48	16	
Nahe (Pfalz)	226	59,2	13 379	82	8,6	-	-	6	38	38	18	
Baden-Württemberg	1 379	65,3	90 004	85	7,9	-	-	0	28	54	18	
Nordwürttemberg	725	62,5	45 312	83	8,3	-	-	-	24	62	14	
Oberes Neckartal	32	50,8	1 632	74	8,0	-	-	-	100	-	-	

5. Mostertrag und Mostgewicht nach Rebsorten

Silvaner

Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Reb- fläche im Ertrag	Mostertrag				Mostgewicht nach Oechsle					
		je ha	ins- gesamt	Durchschnittl.		Anteil des Mostertrages					
				Most- ge- wicht	Säure- ge- halt	unter 50°	50°	60°	70°	80°	90°
							bis 60°	bis 70°	bis 80°	bis 90°	und mehr
ha	hl	Grad	Promille	%							
Unteres Neckartal	205	61,3	12 540	83	7,9	-	-	-	26	59	15
Remstal	144	69,7	10 012	84	8,2	-	-	-	-	89	11
Enztal	32	71,5	2 319	82	8,7	-	-	-	40	53	7
Zabergäu	56	108,7	6 047	82	8,4	-	-	-	-	100	-
Kocher- und Jagsttal	205	48,7	9 993	84	8,7	-	-	-	7	64	29
Tauber- und Jagsttal	52	53,7	2 769	84	8,0	-	-	-	33	33	34
Nordbaden	177	63,2	11 163	81	7,8	-	-	2	39	43	16
Tauber- und Maintal	55	48,1	2 662	83	7,8	-	-	-	14	64	22
Neckar- u. Jagsttal	14	24,6	341	81	8,5	-	-	-	-	100	-
Bergstraße	68	82,0	5 606	80	7,8	-	-	-	54	23	23
Kraichgau	35	64,9	2 239	80	7,5	-	-	-	46	39	15
Pfinz-, Enz- u. Albtal	4	70,4	315	74	7,9	-	-	20	80	-	-
Südbaden	472	70,6	33 308	88	7,4	-	-	-	17	45	38
Seegegend	0	40,0	10	.	.	-	-	-	-	.	-
Oberes Rheintal	0	80,0	2	.	.	-	-	-	-	.	-
Markgräflerland	49	72,0	3 549	85	6,9	-	-	-	17	33	50
Kaiserstuhl	394	71,3	28 086	89	7,4	-	-	-	-	50	50
Breisgau	12	63,7	758	83	6,8	-	-	-	29	29	42
Ortenau u. Bühler- gegend	17	54,5	903	83	8,1	-	-	-	25	63	12
Südwestfalen-Hohenzollern	6	39,7	221	78	8,5	-	-	-	67	33	-
Oberes Neckartal	5	39,4	216	78	8,5	-	-	-	67	33	-
Enztal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bayern	1 290	44,2	57 079	90	7,4	-	0	2	10	36	52
Unterfranken	1 096	43,6	47 786	90	7,3	-	0	2	11	41	46
Mittelfranken	194	47,9	9 293	91	7,5	-	0	1	7	22	70
Übrige Gebiete	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saarland	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bundesgebiet	18 425	72,6	1 337 221	83	8,1	0	0	4	30	50	16
19702)	18 055	116,5	2 103 664	68	9,5	.	.	.	.	.	.

1) Einschl. Tettang. - 2) Endgültige Ergebnisse.

5. Mostertrag und Mostgewicht nach Rebsorten

Riesling

Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Reb- fläche im Ertrag	Mostertrag				Mostgewicht nach Oechsle					
		je ha	ins- gesamt	Durchschnittl.		Anteil des Mostertrages					
				Most- ge- wicht	Säure- ge- halt	unter 50°	50°	60°	70°	80°	90°
							bis 60°	bis 70°	bis 80°	bis 90°	und mehr
ha	hl	Grad	Promille	%							
Nordrhein-Westfalen	6	43,3	260	81	9,2	-	-	-	25	75	-
Hessen	2 510	60,4	151 604	86	9,6	-	-	2	26	52	20
Hess. Bergstraße	125	64,0	8 000	87	10,9	-	-	-	3	68	29
Rheingau	2 385	60,2	143 577	86	9,5	-	-	2	29	50	19
Rheinland-Pfalz	13 899	88,1	1 224 280	78	10,3	-	1	18	44	29	8
Mittelrhein (einschl. Lahn)	722	62,4	45 053	74	10,3	-	2	27	57	13	1
Nahe (Koblenz)	905	66,7	60 364	82	9,9	-	-	9	26	55	10
Obermosel	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Saar	895	87,8	78 581	75	12,1	-	6	14	58	18	4
Ruwer	294	98,8	29 047	74	13,4	-	7	17	54	20	2
Mittelmosel	4 778	105,0	501 690	77	10,5	-	0	22	46	25	7
Untermosel	2 260	98,4	222 384	75	11,1	-	0	33	44	16	7
Ahr	105	68,0	7 140	73	9,8	-	3	52	14	27	4
Worms und Umgegend	434	65,6	28 470	84	8,4	-	-	1	25	57	17
Oppenheim und Umgegend	226	61,6	13 922	86	8,9	-	-	-	18	54	28
Mainz und Umgegend	90	51,4	4 626	87	7,5	-	-	-	17	51	32
Ingelheim und Umgegend	56	66,0	3 696	85	8,5	-	-	-	23	58	19
Wiesbach	64	60,1	3 846	86	8,2	-	-	-	18	53	29
Bingen und Umgegend	50	73,3	3 665	85	8,5	-	-	-	25	53	22
Nahe (Rheinhessen)	37	65,1	2 409	81	9,4	-	-	-	48	44	8
Alzey und Umgegend	164	65,6	10 758	84	9,1	-	-	-	22	65	13
Mittelhaardt	1 611	77,4	124 691	81	8,3	-	-	5	45	36	14
Oberhaardt	847	68,8	58 274	80	9,6	-	0	7	42	42	9
Unterhaardt mit Zellertal	224	75,7	16 957	81	8,5	-	0	3	44	45	8
Nahe (Pfalz)	133	63,2	8 406	82	9,2	-	-	2	39	48	11
Baden-Württemberg	2 116	70,7	149 696	84	9,2	-	-	-	24	52	24
Nordwürttemberg	1 419	72,0	102 122	83	9,5	-	-	-	22	63	15
Oberes Neckartal	0	35,0	2	.	.	-	-	-	.	.	.

## 5. Mostertrag und Mostgewicht nach Rebsorten

## Riesling

Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Reb- fläche im Ertrag	Mostertrag				Mostgewicht nach Oechsle					
		je ha	ins- gesamt	Durchschnittl.		Anteil des Mostertrages					
				Most- ge- wicht	Säure- ge- halt	unter 50°	50° bis 60°	60° bis 70°	70° bis 80°	80° bis 90°	90° und mehr
		ha	hl	Grad	Promille	%					
Unteres Neckartal	885	70,0	61 968	83	9,1	-	-	-	16	68	16
Remstal	152	75,2	11 435	86	9,4	-	-	-	-	78	22
Enztal	55	71,9	3 940	80	9,5	-	-	-	47	47	6
Zabergäu	223	80,4	17 953	85	10,7	-	-	-	17	58	25
Kocher- u. Jagsttal	94	64,1	5 994	81	9,7	-	-	-	36	57	7
Tauber- u. Jagsttal	10	85,0	830	78	11,0	-	-	-	100	-	-
Nordbaden	213	68,6	14 610	85	8,6	-	-	-	38	35	27
Tauber- u. Maintal	2	36,7	83	78	8,0	-	-	-	100	-	-
Neckar- u. Jagsttal	6	35,1	226	82	8,8	-	-	-	33	67	-
Bergstraße	72	63,4	4 593	83	8,7	-	-	-	33	47	20
Kraichgau	127	73,9	9 376	86	8,5	-	-	-	24	29	47
Pfinz-, Enz- u. Albtal	5	66,3	332	78	8,4	-	-	-	83	-	17
Südbaden	484	68,1	32 954	88	8,6	-	-	-	8	42	50
See- u. Oberrhein	0	75,0	3	82	8,0	-	-	-	-	100	-
Oberes Rheintal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Markgräflerland	3	52,7	170	89	6,4	-	-	-	-	50	50
Kaiserstuhl	9	85,0	737	86	7,5	-	-	-	-	100	-
Breisgau	7	60,6	431	84	8,5	-	-	-	20	60	20
Ortenau u. Bühler- u. Jagsttal	465	68,0	31 613	88	8,6	-	-	-	8	33	59
Südwestfalen-Hohenzollern	0	42,4	10	77	8,5	-	-	-	67	33	-
Oberes Neckartal	0	43,3	7	77	8,5	-	-	-	67	33	-
Enztal	0	40,4	3	.	.	-	-	-	-	-	-
Bayern	105	35,7	3 745	93	8,9	-	-	1	10	51	38
Unterfranken	102	35,6	3 631	93	8,9	-	-	1	10	51	38
Mittelfranken	1	47,7	48	-	-	-	-	-	-	-	-
Übrige Gebiete	2	32,9	66	-	-	-	-	-	-	-	-
Saarland	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bundesgebiet	18 636	82,1	1 529 585	79	10,1	-	1	15	40	33	11
1970 <sup>2)</sup>	18 349	119,3	2 189 209	67	11,7	.	.	.	.	.	.

1) Einschl. Tettnang. - 2) Endgültige Ergebnisse.

5. Mostertrag und Mostgewicht nach Rebsorten

Müller-Thurgau

Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Reb- fläche im Ertrag	Mostertrag				Mostgewicht nach Oechsle					
		je ha	ins- gesamt	Durchschnittl.		Anteil des Mostertrages					
				Most- ge- wicht	Säure- ge- halt	unter 50°	50° bis unter 60°	60° bis unter 70°	70° bis unter 80°	80° bis unter 90°	90° und mehr
ha	hl	Grad	Promille	%							
Nordrhein-Westfalen	9	44,1	397	82	6,6	-	-	-	45	55	-
Hessen	394	59,3	23 364	86	7,3	-	-	0	16	71	13
Hess. Bergstraße	53	55,8	2 957	86	7,8	-	-	-	1	75	24
Rheingau	341	59,7	20 358	86	7,2	-	-	0	18	71	11
Rheinland-Pfalz	13 483	81,1	1 092 890	81	7,2	0	0	7	38	46	9
Mittelrhein (einschl.Lahn)	68	71,2	4 842	75	8,1	-	2	23	52	22	1
Nahe (Koblenz)	931	74,7	69 546	82	7,8	-	-	1	36	53	10
Obermosel	30	93,2	2 796	69	9,0	-	2	57	40	1	-
Saar	121	97,9	11 846	78	8,3	-	-	6	62	25	7
Ruwer	22	98,9	2 176	77	8,0	-	-	12	52	36	-
Mittelmosel	850	95,3	81 005	76	7,6	-	-	11	67	21	1
Untermosel	343	106,4	36 632	73	8,0	-	1	26	63	9	1
Ahr	74	77,6	5 742	73	7,4	-	-	37	48	15	-
Worms und Umgegend	2 033	76,8	156 134	82	6,8	-	-	3	29	63	5
Oppenheim und Umgegend	392	60,0	23 520	86	7,0	-	-	-	12	70	18
Mainz und Umgegend	449	64,2	28 826	85	6,5	-	-	-	19	64	17
Ingelheim und Umgegend	452	65,7	29 696	84	7,0	-	-	-	24	59	17
Wiesbach	666	61,5	40 959	83	7,0	-	-	1	32	58	9
Bingen und Umgegend	61	66,7	4 069	81	7,2	-	-	-	44	53	3
Nahe (Rheinhessen)	233	79,6	18 547	81	6,3	-	-	-	44	49	7
Alzey und Umgegend	2 336	73,5	171 696	82	6,7	-	-	0	44	43	13
Mittelhaardt	611	90,2	55 112	80	6,4	-	-	7	49	28	16
Oberhaardt	3 276	93,0	304 668	80	7,7	-	0	13	31	48	8
Unterhaardt mit Zellertal	444	87,1	38 672	81	7,2	0	0	4	43	43	10
Nahe (Pfalz)	91	70,4	6 406	80	6,8	-	-	5	50	38	7
Baden-Württemberg	2 938	77,2	226 678	84	6,6	-	-	-	17	68	15
Nordwürttemberg	418	59,7	24 935	84	7,2	-	-	-	16	64	20
Oberes Neckartal	1	40,0	42	.	.	-	-	-	.	-	-

5. Mostertrag und Mostgewicht nach Rebsorten

Müller-Thurgau

Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Reb- fläche im Ertrag	Mostertrag				Mostgewicht nach Oechsle					
		je ha	ins- gesamt	Durchschnittl.		unter 50°	Anteil des Mostertrages				
				Most- ge- wicht	Säure- ge- halt		50° bis unter 60°	60° bis unter 70°	70° bis unter 80°	80° bis unter 90°	90° und mehr
		ha	hl	Grad	Pro mille	%					
Unteres Neckartal	181	54,3	9 849	84	7,0	-	-	-	17	61	22
Remstal	54	71,0	3 826	84	7,4	-	-	-	-	75	25
Enztal	18	88,7	1 555	82	8,2	-	-	-	33	56	11
Zabergäu	50	76,0	3 776	86	7,7	-	-	-	7	60	33
Kocher- u. Jagsttal	60	37,9	2 278	84	6,7	-	-	-	19	69	12
Tauber- u. Maintal	54	66,4	3 609	84	6,7	-	-	-	-	100	-
Nordbaden	781	79,3	61 912	82	6,9	-	-	-	31	62	7
Tauber- u. Maintal	191	47,7	9 097	84	6,9	-	-	-	11	83	6
Neckar- u. Jagsttal	17	48,7	813	83	6,7	-	-	-	14	72	14
Bergstraße	250	83,6	20 880	82	7,0	-	-	-	41	53	6
Kraichgau	288	99,2	28 592	81	6,8	-	-	-	35	58	7
Pfinz-, Enz- u. Alb- tal	36	70,7	2 530	77	8,1	-	-	-	67	33	-
Südbaden	1 735	80,5	139 647	85	6,4	-	-	-	8	77	15
Seegengegend	54	92,1	4 964	81	7,9	-	-	-	43	43	14
Oberes Rheintal	3	100,0	348	82	.	-	-	-	-	100	-
Markgräflerland	243	86,0	21 060	85	6,5	-	-	-	9	75	16
Kaiserstuhl	677	82,4	55 760	85	6,2	-	-	-	-	100	-
Breisgau	518	77,9	40 342	86	6,1	-	-	-	3	81	16
Ortenau und Bühler- gegend	240	71,6	17 173	85	7,0	-	-	-	8	72	20
Südwürttemberg-Hohen- zollern	4	47,1	184	79	8,8	-	-	-	50	50	-
Oberes Neckartal	4	45,5	167	79	8,8	-	-	-	50	50	-
Enztal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bayern	1 011	43,9	44 421	89	7,0	-	0	2	13	48	37
Unterfranken	944	43,6	41 158	89	6,9	-	0	2	11	50	37
Mittelfranken	65	49,2	3 198	91	7,5	-	-	2	25	31	42
Übrige Gebiete	2	32,4	65	79	9,0	-	-	-	55	45	-
Saarland	2	100,0	203	68	8,0	-	-	100	-	-	-
Bundesgebiet	17 837	77,8	1 387 953	82	7,1	0	0	6	33	50	11
1970 <sup>2)</sup>	17 383	156,1	2 714 029	64	9,0	.	.	.	.	.	.

1) Einschl. Tettang. - 2) Endgültige Ergebnisse.

5. Mostertrag und Mostgewicht nach Rebsorten

Portugieser

Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Reb- fläche im Ertrag	Mostertrag				Mostgewicht nach Oechsle					
		je ha	ins- gesamt	Durchschnittl.		Anteil des Mostertrages					
				Most- ge- wicht	Säure- ge- halt	unter 50°	50° bis unter 60°	60° bis unter 70°	70° bis unter 80°	80° bis unter 90°	90° und mehr
		ha	hl	Grad	Promille	%					
Nordrhein-Westfalen	1	42,0	42	80	6,0	-	-	-	100	-	-
Hessen	8	60,0	480	82	8,2	-	-	-	60	30	10
Hess. Bergstraße	2	60,0	120	82	8,2	-	-	-	60	30	10
Rheingau	6	60,0	360	82	8,2	-	-	-	60	30	10
Rheinland-Pfalz	4 028	91,5	368 551	77	7,4	0	0	16	50	30	4
Mittelrhein(einschl.Lahn)	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Nahe (Koblenz)	17	70,9	1 205	83	7,9	-	-	-	27	65	8
Obermosel	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Saar	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ruwer	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Mittelmosel	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Untermosel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ahr	164	74,9	12 284	81	8,3	-	-	18	19	51	12
Worms und Umgegend	355	87,4	31 027	76	7,3	-	-	18	58	21	3
Oppenheim und Umgegend	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Mainz und Umgegend	62	71,6	4 439	84	7,5	-	-	-	22	67	11
Ingelheim und Umgegend	291	75,6	22 000	84	8,1	-	-	-	29	55	16
Wiesbach	138	82,3	11 357	81	7,9	-	-	6	40	43	11
Bingen und Umgegend	17	86,7	1 474	82	8,0	-	-	-	28	72	-
Nahe (Rheinhessen)	31	82,7	2 564	75	7,8	-	-	28	42	30	-
Alzey und Umgegend	212	82,2	17 426	80	7,8	-	-	10	33	53	4
Mittelhaardt	1 369	92,3	126 359	76	7,3	-	0	18	54	27	1
Oberhaardt	664	97,0	64 408	76	7,5	-	0	18	54	25	3
Unterhaardt mit Zellertal	695	105,1	73 045	77	7,0	0	0	16	55	23	6
Nahe (Pfalz)	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Baden-Württemberg	767	80,1	61 481	82	7,5	-	-	2	28	60	10
Nordwürttemberg	673	80,2	53 955	83	7,5	-	-	1	18	71	10
Oberes Neckartal	1	76,7	48	.	.	-	-	-	-	.	-



5. Mostertrag und Mostgewicht nach Rebsorten

Portugieser

Land Verwaltungsbezirk Weinbaugbiet	Reb- fläche im Ertrag	Mostertrag				Mostgewicht nach Oechsle					
		je ha	ins- gesamt	Durchschnittl.		Anteil des Mostertrages					
				Most- ge- wicht	Säure- ge- halt	unter 50°	50° bis unter 60°	60° bis unter 70°	70° bis unter 80°	80° bis unter 90°	90° und mehr
ha	hl	Grad	Promille	%							
Unteres Neckartal	222	70,0	15 556	82	7,5	-	-	2	19	68	11
Remstal	65	81,6	5 327	84	7,4	-	-	-	10	90	-
Enztal	123	88,3	10 862	80	8,4	-	-	-	41	53	6
Zabergäu	235	89,0	20 940	85	7,1	-	-	-	-	80	20
Kocher- und Jagsttal	23	40,7	945	83	6,8	-	-	-	11	78	11
Tauber- und Jagsttal	3	96,2	277	85	5,0	-	-	-	-	100	-
Nordbaden	84	82,9	6 932	77	7,6	-	-	4	50	39	7
Tauber- und Maintal	4	53,1	237	91	6,7	-	-	-	-	40	60
Neckar- und Jagsttal	3	10,4	28	81	8,1	-	-	-	-	100	-
Bergstraße	31	75,0	2 327	76	7,6	-	-	-	90	10	-
Kraichgau	40	93,7	3 750	78	7,5	-	-	-	57	43	-
Pfinz-, Enz- u. Alb- tal	5	107,9	590	74	8,6	-	-	40	20	40	-
Südbaden	4	84,4	314	78	8,5	-	-	17	17	33	33
Seegegend	0	90,0	23	85	7,1	-	-	-	-	100	-
Oberes Rheintal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Markgräflerland	0	31,7	8	65	9,0	-	-	100	-	-	-
Kaiserstuhl	1	90,0	47	85	9,0	-	-	-	-	100	-
Breisgau	0	67,9	22	94	.	-	-	-	-	-	100
Ortenau und Bühler- gegend	2	90,0	214	75	8,5	-	-	-	100	-	-
Südwürttemberg-Hohen- zollern	7	38,8	280	80	8,3	-	-	-	50	50	-
Oberes Neckartal	7	38,8	280	80	8,3	-	-	-	50	50	-
Enztal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bayern	17	26,7	454	85	6,5	-	0	-	10	85	5
Unterfranken	17	26,7	454	85	6,5	-	0	-	10	85	5
Mittelfranken	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Übrige Gebiete	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saarland	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bundesgebiet	4 821	89,4	431 008	78	7,4	0	0	14	47	34	5
1970 <sup>2)</sup>	5 014	161,9	811 812	62	9,3	.	.	.	.	.	.

1) Einschl. Tettang. - 2) Endgültige Ergebnisse.



## 5. Mostertrag und Mostgewicht nach Rebsorten

Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Reb- fläche im Ertrag	Mostertrag				Mostgewicht nach Oechsle					
		je ha	ins- gesamt	Durchschnittl.		Anteil des Mostertrages					
				Most- ge- wicht	Säure- ge- halt	unter 50°	50° bis unter 60°	60° bis unter 70°	70° bis unter 80°	80° bis unter 90°	90° und mehr
		ha	hl	Grad	Promille	%					
Gutedel											
Baden-Württemberg	1 224	52,5	64 298	80	7,3	-	-	1	30	57	12
Nordwürttemberg	5	44,5	226	82	8,7	-	-	-	37	44	19
Oberes Neckartal	0	40,0	2	.	.	.	.	.	.	.	.
Unteres Neckartal	3	39,0	102	84	8,1	-	-	-	18	55	27
Remstal	0	30,0	1	90	.	-	-	-	-	-	100
Enztal	1	40,2	50	79	9,2	-	-	-	64	27	9
Zabergäu	0	40,0	15	80	.	-	-	-	-	100	-
Kocher- u. Jagsttal	0	35,9	13	84	9,5	-	-	-	-	100	-
Tauber- u. Jagsttal	0	100,0	43	80	9,5	-	-	-	50	50	-
Nordbaden	23	36,7	833	81	6,3	-	-	-	29	71	-
Tauber- und Maintal	20	37,0	741	81	6,3	-	-	-	22	78	-
Neckar- und Jagsttal	1	17,5	19	82	7,8	-	-	-	33	67	-
Bergstraße	0	20,0	3	80	6,0	-	-	-	-	100	-
Kraichgau	1	48,8	54	74	5,5	-	-	-	100	-	-
Pfinz-, Erz- u. Alb- tal	0	49,5	16	83	7,8	-	-	-	-	100	-
Südbaden	1 196	52,8	63 229	80	7,3	-	-	2	27	59	12
See- u. Oberrhein- land	0	95,6	43	90	8,0	-	-	-	-	50	50
Oberes Rheintal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Markgräflerland	841	54,6	45 896	79	7,4	-	-	4	44	52	-
Kaiserstuhl	1	45,0	66	82	6,1	-	-	-	-	100	-
Breisgau	353	48,7	17 175	83	7,1	-	-	-	13	74	13
Ortenau und Bühler- gegend	1	37,4	49	89	7,1	-	-	-	-	40	60
Südwürttemberg-Hohen- zollern	0	70,0	10	.	.	.	.	.	.	.	.
Oberes Neckartal	0	70,0	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Enztal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ruländer											
Baden-Württemberg	1 357	50,3	68 180	95	7,2	-	-	-	7	20	73
Nordwürttemberg	54	47,3	2 558	91	7,6	-	-	-	10	21	69
Oberes Neckartal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Unteres Neckartal	37	48,6	1 815	92	7,5	-	-	-	-	19	81
Remstal	5	42,9	194	92	7,7	-	-	-	-	20	80
Enztal	1	47,1	43	81	9,3	-	-	-	33	50	17
Zabergäu	8	47,6	360	90	7,6	-	-	-	17	-	83
Kocher- und Jagsttal	2	21,1	48	86	7,0	-	-	-	20	20	60
Tauber- u. Jagsttal	2	65,0	98	77	9,0	-	-	-	100	-	-
Nordbaden	191	48,8	9 307	92	7,2	-	-	-	12	25	63
Tauber- und Maintal	3	26,0	85	95	.	-	-	-	-	-	100
Neckar- und Jagsttal	0	29,1	8	87	7,9	-	-	-	25	25	50
Bergstraße	60	50,7	3 051	92	7,1	-	-	-	-	20	80
Kraichgau	119	48,6	5 771	92	7,2	-	-	-	17	17	66
Pfinz-, Erz- u. Alb- tal	8	46,9	392	82	8,0	-	-	-	-	80	20
Südbaden	1 110	50,7	56 273	96	7,2	-	-	-	-	16	84
See- u. Oberrhein- land	19	68,1	1 268	91	8,7	-	-	-	-	-	100
Oberes Rheintal	0	70,0	3	90	.	-	-	-	-	-	100
Markgräflerland	57	41,1	2 338	94	7,1	-	-	-	-	29	71
Kaiserstuhl	697	52,2	36 364	98	6,8	-	-	-	-	-	100
Breisgau	145	56,6	8 211	96	8,2	-	-	-	-	5	95
Ortenau u. Bühler- gegend	193	41,9	8 089	91	7,6	-	-	-	-	29	71

1) Einschl. Tettwang.

5. Mostertrag und Mostgewicht nach Rebsorten

Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Reb- fläche im Ertrag	Mostertrag				Mostgewicht nach Oechsle					
		je ha	ins- gesamt	Durchschnittl.		Anteil des Mostertrages					
				Most- ge- wicht	Säure- ge- halt	unter 50°	50° bis unter 60°	60° bis unter 70°	70° bis unter 80°	80° bis unter 90°	90° und mehr
ha	hl	Grad	Promille	%							
Ruländer											
Südwestfalen-Hohenzollern <sup>1)</sup>	1	31,5	42	80	8,0	-	-	-	50	50	-
Oberes Neckartal	1	26,9	23	80	8,0	-	-	-	50	50	-
Enztal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Weißer Burgunder											
Baden-Württemberg	320	59,2	18 965	90	7,3	-	-	-	10	26	64
Nordwestfalen	1	35,8	44	83	6,8	-	-	-	33	33	34
Oberes Neckartal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Unteres Neckartal	1	40,0	24	.	.	.	.	.	.	.	.
Remstal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enztal	0	20,0	2	85	9,1	-	-	-	-	100	-
Zabergäu	1	34,2	17	83	6,5	-	-	-	50	-	50
Kocher- und Jagsttal	0	38,2	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Tauber- und Jagsttal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nordbaden	77	58,9	4 006	87	7,1	-	-	-	19	25	56
Tauber- und Maintal	3	39,4	99	88	7,8	-	-	-	20	20	60
Neckar- und Jagsttal	0	20,0	4	95	9,0	-	-	-	-	-	100
Bergstraße	35	60,9	2 161	87	7,1	-	-	-	-	44	56
Kraichgau	30	58,5	1 729	88	7,1	-	-	-	25	19	56
Pfinz-, Enz- u. Jagsttal	0	70,0	13	75	9,5	-	-	-	100	-	-
Südbaden	251	59,4	14 915	91	7,4	-	-	-	-	24	76
See- und Jagsttal	1	74,7	46	90	8,8	-	-	-	-	50	50
Oberes Rheintal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Markgräflerland	53	46,7	2 485	92	6,5	-	-	-	-	25	75
Kaiserstuhl	123	62,0	7 627	92	7,5	-	-	-	-	-	100
Breisgau	72	64,0	4 620	90	7,8	-	-	-	-	29	71
Ortenau und Bühler- und Jagsttal <sup>1)</sup>	2	70,0	137	92	.	-	-	-	-	50	50
Südwestfalen-Hohenzollern <sup>1)</sup>	0	10,0	0	85	.	-	-	-	-	100	-
Oberes Neckartal	0	10,0	0	85	.	-	-	-	-	100	-
Enztal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewürztraminer											
Baden-Württemberg	99	34,8	3 439	103	5,1	-	-	-	-	8	92
Nordwestfalen	7	20,7	149	97	5,7	-	-	-	-	23	77
Oberes Neckartal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Unteres Neckartal	6	20,1	114	98	5,5	-	-	-	-	25	75
Remstal	1	22,0	20	95	7,0	-	-	-	-	-	100
Enztal	0	20,0	9	100	.	-	-	-	-	-	100
Zabergäu	0	28,2	6	90	4,5	-	-	-	-	67	33
Kocher- und Jagsttal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tauber- und Jagsttal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nordbaden	4	45,2	176	96	5,9	-	-	-	-	17	83
Tauber- und Maintal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Neckar- und Jagsttal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bergstraße	3	51,0	161	95	6,0	-	-	-	-	25	75
Kraichgau	1	20,0	15	105	4,5	-	-	-	-	-	100
Pfinz-, Enz- u. Albtal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1) Einschl. Tettnang.

5. Mostertrag und Mostgewicht nach Rebsorten

Land Verwaltungsbezirk Weinbauggebiet	Reb- fläche im Ertrag	Mostertrag				Mostgewicht nach Oechsle					
		je ha	ins- gesamt	Durchschnittl.		Anteil des Mostertrages					
				Most- ge- wicht	Säure- ge- halt	unter 50°	50° bis unter 60°	60° bis unter 70°	70° bis unter 80°	80° bis unter 90°	90° und mehr
ha	hl	Grad	Promille	%							
Gewürztraminer											
Südbaden	88	35,4	3 114	104	5,0	-	-	-	-	-	100
Seegegend	0	55,6	9	105	8,0	-	-	-	-	-	100
Oberes Rheintal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Markgräflerland	24	24,9	603	113	5,1	-	-	-	-	-	100
Kaiserstuhl	33	40,1	1 318	102	4,1	-	-	-	-	-	100
Breisgau	16	45,2	740	104	5,6	-	-	-	-	-	100
Ortenau und Bühlergegend <sup>1)</sup>	14	31,1	444	101	6,5	-	-	-	-	-	100
Südwestfalen-Hohenzollern	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oberes Neckartal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enztal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trollinger, Blauer											
Baden-Württemberg	1 722	78,4	135 097	79	8,9	-	-	1	45	51	3
Nordwestfalen	1 716	78,5	134 743	79	8,9	-	-	1	41	55	3
Oberes Neckartal	0	26,0	0	.	.	.	.	.	.	.	.
Unteres Neckartal	1 041	75,0	78 071	79	8,6	-	-	2	35	61	2
Remstal	324	82,9	26 843	78	9,5	-	-	-	44	56	-
Enztal	144	94,9	13 646	79	9,5	-	-	-	47	53	-
Zabergäu	175	78,7	13 748	81	9,0	-	-	-	44	44	12
Kocher- und Jagsttal	32	75,2	2 435	77	9,5	-	-	-	50	40	10
Tauber- und Jagsttal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nordwestfalen	6	52,4	340	76	9,2	-	-	-	88	12	-
Tauber- und Maintal	0	46,2	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Neckar- und Jagsttal	5	39,4	190	75	9,4	-	-	-	100	-	-
Bergstraße	0	85,0	12	70	9,0	-	-	-	100	-	-
Kraichgau	1	91,0	131	78	9,0	-	-	-	67	33	-
Pfinz-, Enz- u. Albtal	0	96,0	6	.	.	.	.	.	.	.	.
Südbaden	0	79,2	13	.	.	.	.	.	.	.	.
Seegegend	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oberes Rheintal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Markgräflerland	0	80,0	12	.	.	.	.	.	.	.	.
Kaiserstuhl	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Breisgau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ortenau und Bühlergegend <sup>1)</sup>	0	67,1	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Südwestfalen-Hohenzollern	0	45,0	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Oberes Neckartal	0	45,0	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Enztal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Limberger											
Baden-Württemberg	372	73,4	27 303	85	8,7	-	-	2	19	56	23
Nordwestfalen	356	73,8	26 263	85	8,7	-	-	1	15	57	27
Oberes Neckartal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Unteres Neckartal	152	73,2	11 110	85	8,6	-	-	2	54	34	10
Remstal	0	60,0	21	89	.	-	-	-	-	50	50
Enztal	99	78,0	7 731	82	9,4	-	-	-	35	59	6
Zabergäu	98	71,2	6 975	87	8,0	-	-	-	-	73	27
Kocher- und Jagsttal	7	62,4	426	85	.	-	-	-	17	50	33
Tauber- und Jagsttal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1) Einschl. Tettang.

5. Mostertrag und Mostgewicht nach Rebsorten

Land Verwaltungsbezirk Weinbaugbiet	Reb- fläche im Ertrag	Mostertrag				Mostgewicht nach Oechsle					
		je ha	ins- gesamt	Durchschnittl.		Anteil des Mostertrages					
				Most- ge- wicht	Säure- ge- halt	unter 50°	50° bis 60°	60° bis 70°	70° bis 80°	80° bis 90°	90° und mehr
ha	hl	Grad	Promille	%							
<b>Limberger</b>											
Nordbaden	16	66,1	1 039	79	7,9	-	-	9	46	45	-
Tauber- und Maintal	0	46,2	2	.	.	.	.	.	.	.	.
Neckar- und Jagsttal	2	44,0	72	81	8,3	-	-	-	33	67	-
Bergstraße	0	84,1	8	.	.	.	.	.	.	.	.
Kraichgau	14	68,6	945	79	8,0	-	-	-	57	43	-
Pfinz-, Enz- u. Albtal	0	70,0	12	68	10,5	-	-	100	-	-	-
Südbaden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Seegegend	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oberes Rheintal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Markgräflerland	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kaiserstuhl	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Breisgau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ortenau und Bühlergegend	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Südwürttemberg-Hohenzollern	0	33,6	1	78	8,5	-	-	-	50	50	-
Oberes Neckartal	0	33,6	1	78	8,5	-	-	-	50	50	-
Enztal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Müllerrebe (Schwarzriesling)</b>											
Baden-Württemberg	581	52,7	30 609	88	8,0	-	-	-	14	42	44
Nordwürttemberg	504	54,5	27 497	88	8,0	-	-	-	14	43	43
Oberes Neckartal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Unteres Neckartal	424	54,4	23 063	88	7,9	-	-	-	6	46	48
Remstal	5	38,0	182	89	.	-	-	-	-	50	50
Enztal	13	47,0	590	82	8,9	-	-	-	43	36	21
Zabergäu	59	59,9	3 560	86	8,4	-	-	-	9	55	36
Kocher- und Jagsttal	2	30,7	60	90	10,5	-	-	-	-	33	67
Taubergegend	2	23,3	42	87	10,0	-	-	-	33	-	67
Nordbaden	65	40,4	2 632	90	7,7	-	-	-	19	31	50
Tauber- und Maintal	1	30,0	26	75	.	-	-	-	100	-	-
Neckar- und Jagsttal	3	24,8	71	84	8,0	-	-	-	-	75	25
Bergstraße	2	84,1	134	.	.	.	.	.	.	.	.
Kraichgau	27	52,6	1 412	87	7,2	-	-	-	20	20	60
Pfinz-, Enz- u. Albtal	33	30,0	989	95	8,5	-	-	-	-	-	100
Südbaden	8	51,3	390	87	8,0	-	-	-	-	67	33
Seegegend	0	65,0	6	.	.	.	.	.	.	.	.
Oberes Rheintal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Markgräflerland	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kaiserstuhl	0	40,6	11	.	.	.	.	.	.	.	.
Breisgau	7	50,9	355	87	8,0	-	-	-	-	67	33
Ortenau und Bühlergegend	0	67,6	18	.	.	.	.	.	.	.	.
Südwürttemberg-Hohenzollern	4	22,6	90	84	7,3	-	-	-	20	40	40
Oberes Neckartal	2	32,8	68	81	7,0	-	-	-	33	67	-
Enztal	2	11,3	22	92	8,1	-	-	-	-	-	100

1) Einschl. Tettngang.