

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **B**

LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI

Reihe 2

Gartenbau und Weinwirtschaft

III. Weinwirtschaft

Stand der Reben

Juni 1973



Bestellnummer: 210230 – 730002

VERLAG W. KOHLHAMMER, STUTT GART UND MAINZ

Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	3
Tabellenteil	
1. Allgemeine Angaben über Witterung und Entwicklung der Reben	4
2. Allgemeiner Beginn der Blüte	5
3. Durchschnittliche Dauer der Blüte	6
4. Begutachtung des Standes der Reben	7

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden
- 0 = mehr als nichts, aber weniger als
die Hälfte der kleinsten Einheit,
die in der Tabelle zur Darstellung
gebracht werden kann.

Die Angaben beziehen sich auf die Länder mit Weinbau

Erschienen im Juli 1973

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis: DM -,50

Ergebnisse für die einzelnen Länder werden in den "Statistischen Berichten"
der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer C II 4 veröffentlicht.

V o r b e m e r k u n g

In der Berichtszeit vom 24.5. bis zum 30.6.1972 wurde die Witterung im Hinblick auf die Entwicklung der Reben überwiegend (75 % der Meldungen) als "gut" beurteilt. Die Niederschläge wurden größtenteils (65 %) als ausreichend und der Temperaturverlauf normal bis günstig bezeichnet. Da auch die Sonnenscheindauer als genügend bis reichlich beurteilt und Wetterschäden nur lokal gemeldet wurden, kann diesmal von erheblich günstigeren Verhältnissen als im gleichen Zeitraum des Vorjahres berichtet werden.

Der Blütebeginn der nachgewiesenen Rebsorten lag 1973 um durchweg ein bis zwei Wochen früher als 1972. Die Dauer der Blüte war im Durchschnitt noch etwas kürzer als die schon günstigen Angaben aus dem Vorjahr. Da auch der Verlauf der Blüte von 68 % der Berichterstatter als gut und der Gescheinsansatz von 58 % als gut und 42 % als mittel eingestuft wurden, lassen diese Angaben mit den zu dieser Jahreszeit notwendigen Vorbehalten und unter der Voraussetzung eines normalen Witterungsverlaufs ein günstiges Ernteergebnis erwarten.

Die Note für den Stand der Reben im Juni beträgt 2,1 und hat sich damit gegenüber Vorjahr und Vormonat leicht verbessert.

1. Allgemeine Angaben über Witterung und Entwicklung der Reben

% der ausgewerteten Meldungen

Berichtsgegenstand und Beurteilung	Nord- rhein- West- falen	Hessen	Rhein- land- Pfalz	Baden- Württem- berg	Bayern	Saar- land	Insgesamt		
							Jun	Mai	Jun
							1973		1972
Wetterschäden									
keine	50	91	88	79	90	100	84	95	86
schwache	50	9	11	16	6	-	13	4	12
mittlere	-	-	1	4	2	-	2	1	2
starke	-	-	0	1	2	-	1	0	0
Niederschläge									
zu gering	75	76	62	6	14	-	34	30	7
ausreichend	25	24	38	91	86	100	65	70	85
zu hoch	-	-	-	3	-	-	1	0	8
Temperaturverlauf									
ungünstig	-	-	-	1	1	-	1	13	55
normal	50	12	33	46	42	-	39	68	42
günstig	50	88	67	53	57	100	60	19	3
Sonnenscheindauer									
zu gering	25	-	-	1	5	-	1	.	70
genügend	75	29	43	64	62	-	53	.	30
reichlich	-	71	57	35	33	100	46	.	0
Witterung für die Reben									
schlecht	-	-	-	-	1	-	0	.	18
mittel	75	3	21	30	22	-	25	.	75
gut	25	97	79	70	77	100	75	.	7
Gescheinansatz									
schlecht	-	-	-	1	-	-	0	.	1
mittel	75	3	36	50	48	13	42	.	29
gut	25	97	64	49	52	87	58	.	70
Verlauf der Blüte									
schlecht	-	-	-	2	-	-	1	.	34
mittel	75	12	21	42	38	-	31	.	59
gut	25	88	79	56	62	100	68	.	7

2. Allgemeiner Beginn der Blüte Juni 1973

% der ausgewerteten Meldungen

Rebsorte	Datum	Nord- rhein- West- falen	Hessen	Rhein- land- Pfalz	Baden- Württem- berg	Bayern	Saarland	Insgesamt	
								1973	1972
Silvaner,	bis 10.6.	-	-	-	-	-	.	-	-
Grüner	vom 11.-20.6.	100	71	49	26	14	.	37	0
	vom 21.-30.6.	-	29	49	67	79	.	58	48
	nach dem 30.6.	-	-	2	7	7	.	5	52
Riesling,	bis 10.6.	-	-	0	-	-	.	0	-
Weißer	vom 11.-20.6.	75	68	46	33	14	.	41	0
	vom 21.-30.6.	25	32	52	64	81	.	57	46
	nach dem 30.6.	-	-	2	3	5	.	2	54
Müller-Thurgau	bis 10.6.	-	6	1	2	-	-	2	0
	vom 11.-20.6.	50	88	63	53	29	-	57	2
	vom 21.-30.6.	50	6	34	44	70	87	40	62
	nach dem 30.6.	-	-	2	1	1	13	1	36
Elbling,	bis 10.6.	.	.	-	.	.	-	-	-
Weißer	vom 11.-20.6.	.	.	23	.	.	-	18	-
	vom 21.-30.6.	.	.	69	.	.	87	73	45
	nach dem 30.6.	.	.	8	.	.	13	9	55
Ruländer	bis 10.6.	.	.	.	1	.	-	1	-
	vom 11.-20.6.	.	.	.	57	.	-	56	2
	vom 21.-30.6.	.	.	.	40	.	87	41	54
	nach dem 30.6.	.	.	.	2	.	13	2	44
Portugieser,	bis 10.6.	-	14	2	1	-	.	2	0
Blauer	vom 11.-20.6.	67	86	73	40	31	.	56	3
	vom 21.-30.6.	33	-	24	58	69	.	41	63
	nach dem 30.6.	-	-	1	1	-	.	1	34
Burgunder	bis 10.6.	.	-	-	1	-	.	1	0
Blauer	vom 11.-20.6.	.	100	63	56	30	.	57	3
	vom 21.-30.6.	.	-	32	41	70	.	40	58
	nach dem 30.6.	.	-	5	2	-	.	2	39

Zahl der Meldungen mit Angaben über Beginn der Blüte

Silvaner, Grüner	1	24	342	329	73	.	769	742
Riesling, Weißer	4	34	421	322	21	.	802	784
Müller-Thurgau	4	34	480	473	83	8	1 082	1 043
Elbling, Weißer	.	.	26	.	.	8	34	31
Ruländer	.	.	.	273	.	8	281	289
Portugieser, Blauer	3	7	223	233	13	.	479	483
Burgunder, Blauer	.	4	63	339	10	.	416	409

3. Durchschnittliche Dauer der Blüte

% der ausgewerteten Meldungen

Rebsorte	Datum	Nord- rhein- West- falen	Hessen	Rhein- land- Pfalz	Baden- Württem- berg	Bayern	Saarland	Insgesamt	
								1973	1972
Silvaner, Grüner	bis 4 Tage	-	-	9	4	7	.	6	6
	5 - 7 "	-	50	35	36	33	.	36	25
	8 - 10 "	100	45	47	45	42	.	45	46
	11 - 14 "	-	5	9	14	15	.	12	19
	15 Tage u.m.	-	-	0	1	3	.	1	4
Riesling, Weißer	bis 4 Tage	-	7	9	6	6	.	8	4
	5 - 7 "	-	46	29	37	35	.	33	25
	8 - 10 "	100	37	48	43	47	.	45	42
	11 - 14 "	-	10	13	13	6	.	13	22
	15 Tage u.m.	-	-	1	1	6	.	1	7
Müller-Thurgau	bis 4 Tage	-	6	8	7	10	-	8	7
	5 - 7 "	-	49	35	40	34	100	38	25
	8 - 10 "	75	33	47	42	46	-	44	52
	11 - 14 "	25	12	10	10	8	-	9	13
	15 Tage u.m.	-	-	0	1	2	-	1	3
Elbling, Weißer	bis 4 Tage	.	.	-	.	.	-	-	-
	5 - 7 "	.	.	20	.	.	100	40	-
	8 - 10 "	.	.	50	.	.	-	37	90
	11 - 14 "	.	.	25	.	.	-	19	10
	15 Tage u.m.	.	.	5	.	.	-	4	-
Ruländer	bis 4 Tage	.	.	.	4	.	-	4	7
	5 - 7 "	.	.	.	36	.	100	38	25
	8 - 10 "	.	.	.	45	.	-	43	46
	11 - 14 "	.	.	.	13	.	-	13	17
	15 Tage u.m.	.	.	.	2	.	-	2	5
Portugieser, Blauer	bis 4 Tage	-	20	13	8	20	.	11	12
	5 - 7 "	-	40	40	40	40	.	40	24
	8 - 10 "	100	40	42	43	30	.	42	46
	11 - 14 "	-	-	5	8	10	.	7	10
	15 Tage u.m.	-	-	-	1	-	.	0	8
Burgunder, Blauer	bis 4 Tage	.	50	9	6	-	.	6	7
	5 - 7 "	.	-	44	35	29	.	36	24
	8 - 10 "	.	-	40	46	57	.	46	49
	11 - 14 "	.	50	7	11	14	.	11	12
	15 Tage u.m.	.	-	-	2	-	.	1	8

4. Begutachtung des Standes der Reben

Noten: 1,0 (sehr gut) = mehr als 3/4 Herbst, 2,0 (gut) = mehr als 1/2 bis 3/4 Herbst, 3,0 (mittel) = 1/2 Herbst, 4,0 (gering) = 1/4 bis 1/2 Herbst, 5,0 (sehr gering) = weniger als 1/4 Herbst.

Land Verwaltungsbezirk Anbaugebiet/Bereich	Note		
	1973		1972
	Juni	Mai	Juni
Nordrhein-Westfalen	2,5	2,6	2,4
Hessen	1,8	2,0	1,9
Hessische Bergstraße	2,1	2,1	1,9
Rheingau	1,7	1,9	1,9
Rheinland-Pfalz	2,1	2,4	2,3
Koblenz	2,1	2,4	2,2
Trier	2,1	2,3	2,4
Rheinhausen-Pfalz	2,1	2,4	2,3
Ahr	2,5	2,7	.
Mittelrhein	2,1	2,2	.
Bacharach	2,1	2,3	.
Rhein-Burgenua	2,1	2,1	.
Mosel-Saar-Ruwer	2,0	2,3	.
Bernkastel	2,0	2,2	.
Obermosel	2,1	2,3	.
Saar-Ruwer	2,2	2,5	.
Zell/Mosel	2,0	2,2	.
Nahe	2,1	2,4	.
Bad-Kreuznach	2,1	2,5	.
Schloß-Böckelheim	2,1	2,3	.
Rheinhausen	2,1	2,4	.
Bingen	2,1	2,5	.
Nierstein	2,0	2,4	.
Wonnegau	2,1	2,3	.
Rheinpfalz	2,2	2,4	.
Südliche Weinstraße	2,3	2,5	.
Mittelhaardt-Deutsche Weinstraße	2,0	2,3	.

4. Begutachtung des Standes der Reben

Land Verwaltungsbezirk Anbaugebiet/Bereich	Note		
	1973		1972
	Juni	Mai	Juni
Baden-Württemberg	2,2	2,3	2,2
Württemberg	2,2	2,3	.
Remstal-Stuttgart	2,3	2,6	.
Württembergisch Unterland	2,1	2,2	.
Kocher-Jagst-Tauber	2,2	2,6	.
Baden	2,1	2,3	.
Badische Bergstraße/Kraichgau	2,1	2,3	.
Badisches Frankenland	2,1	2,8	.
Bodensee	2,2	2,1	.
Markgräflerland	2,3	2,4	.
Kaiserstuhl-Tuniberg	2,1	2,2	.
Breisgau	2,1	2,2	.
Ortenau	2,1	2,2	.
Bayern	2,1	2,4	2,3
Unterfranken	2,1	2,4	2,3
Mittelfranken	2,6	2,8	2,1
Übrige Gebiete	2,0	2,0	1,9
Saarland	1,5	2,0	3,4
Bundesgebiet	2,1	2,4	2,3
1962	2,3	2,4	
1963	2,5	2,9	
1964	1,8	2,0	
1965	2,1	2,1	
1966	2,3	2,4	
1967	2,1	2,2	
1968	2,3	2,3	
1969	2,5	2,3	
1970	2,0	2,4	
1971	2,7	2,3	