

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **B**

LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI

Reihe 2

Gartenbau und Weinwirtschaft

III. Weinwirtschaft

Stand der Reben

Juni 1974



Bestellnummer: 210231 – 740002

VERLAG W. KOHLHAMMER, STUTTGART UND MAINZ

Erschienen im August 1974

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Einzelpreis DM 1,--

Jahresbezugspreis DM 16,-- (für einen kompletten Berichtsjahrgang)

Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	4
Tabellenteil	
1. Allgemeine Angaben über Witterung und Entwicklung der Reben	5
2. Allgemeiner Beginn der Blüte	6
3. Durchschnittliche Dauer der Blüte	7
4. Begutachtung des Standes der Reben	8

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden
- 0 = mehr als nichts, aber weniger als
die Hälfte der kleinsten Einheit,
die in der Tabelle zur Darstellung
gebracht werden kann.

Die Angaben beziehen sich auf die Bundesländer mit Weinbau

Ergebnisse für die einzelnen Länder werden in den "Statistischen Berichten"
der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer C II 4 veröffentlicht.

V o r b e m e r k u n g

Die Berichterstatter sahen die in der Zeit vom 24.5. bis 30.6.1974 vorherrschende Witterung für die Entwicklung der Reben überwiegend (63 % der Meldungen) als "mittel" an. Es fielen meist ausreichend Niederschläge und der Temperaturverlauf wie auch die Sonnenscheindauer wurden in jeweils etwa zwei Drittel der Meldungen als normal bzw. genügend bezeichnet. Wetterschäden sind nur vereinzelt aufgetreten.

Die Blüte setzte in diesem Jahr zum Teil etwas später ein als 1973, wo sie ausgesprochen früh begonnen hatte, und ihre Dauer erstreckte sich vielfach über einen längeren Zeitraum als im vorigen Jahr. Deshalb beurteilten die Berichterstatter den Verlauf der Blüte zu 36 % als gut (1973: 68 %), zu 53 % als mittel (31 %) und zu 11 % als schlecht (1 %). Auch der Gescheinsatz entsprach nicht ganz dem des Vorjahres. Aufgrund dieser vorgenannten Kriterien ist - wie immer zu dieser Jahreszeit mit Vorbehalt - in diesem Jahr quantitativ wohl kaum mit einem so guten Ernteergebnis wie 1973 zu rechnen.

Der Stand der Reben hat sich mit der Durchschnittsnote 2,3 gegenüber dem Vormonat leicht verbessert, im Vergleich zum Juni 1973 wurde er um zwei Zehntelnoten geringer bewertet. Wie die nachstehende Zusammenstellung zeigt, kann er als durchschnittlich bezeichnet werden.

Jahr	Note	
	Juni	Mai
1964	1,8	2,0
1965	2,1	2,1
1966	2,3	2,4
1967	2,1	2,2
1968	2,3	2,3
1969	2,5	2,3
1970	2,0	2,4
1971	2,7	2,3
1972	2,3	2,2
1973	2,1	2,4

1. Allgemeine Angaben über Witterung und Entwicklung der Reben.

‡ der ausgewerteten Meldungen

Berichtsgegenstand und Beurteilung	Nord- rhein- West- falen	Hessen	Rhein- land- Pfalz	Baden- Württem- berg	Bayern	Saar- land	Insgesamt		
							Juni	Mai	Juni
							1974		1973
Wetterschäden									
keine	100	82	84	80	67	71	81	92	84
schwache	-	12	14	13	23	29	14	6	13
mittlere	-	6	2	5	6	-	4	2	2
starke	-	-	-	2	4	-	1	0	1
Niederschläge									
zu gering	75	15	18	6	-	-	11	73	34
ausreichend	25	76	82	85	86	100	84	27	65
zu hoch	-	9	0	9	14	-	5	-	1
Temperaturverlauf									
ungünstig	-	15	9	25	39	-	18	39	1
normal-	75	55	70	67	60	29	67	51	39
günstig	25	30	21	8	1	71	15	10	60
Sonnenscheindauer									
zu gering	-	18	12	32	52	-	23	.	1
genügend	100	82	75	65	48	100	70	.	53
reichlich	-	-	13	3	-	-	7	.	46
Witterung für die Reben									
schlecht	-	-	1	10	15	-	6	.	0
mittel	-	53	54	72	78	29	63	.	25
gut	100	47	45	18	7	71	31	.	75
Gescheinansatz									
schlecht	-	-	1	31	15	-	15	.	0
mittel	75	21	29	54	67	100	43	.	42
gut	25	79	70	15	18	-	42	.	58
Verlauf der Blüte									
schlecht	-	-	4	19	23	-	11	.	1
mittel	-	32	47	59	63	14	53	.	31
gut	100	68	49	22	14	86	36	.	68

2. Allgemeiner Beginn der Blüte Juni 1974

% der ausgewerteten Meldungen

Rebsorte	Datum	Nord- rhein- West- falen	Hessen	Rhein- land- Pfalz	Baden- Württem- berg	Bayern	Saarland	Insgesamt	
								1974	1973
Müller-Thurgau	bis 10.6.	-	3	3	1	3	-	2	2
	vom 11.-20.6.	100	79	57	32	29	14	45	57
	vom 21.-30.6.	-	18	39	55	58	86	47	40
	nach dem 30.6.	-	-	1	12	10	-	6	1
Riesling, Weißer	bis 10.6.	-	-	2	2	6	.	2	0
	vom 11.-20.6.	25	68	41	21	31	.	34	41
	vom 21.-30.6.	75	32	56	61	63	.	57	57
	nach dem 30.6.	-	-	1	16	-	.	7	2
Silvaner, Grüner	bis 10.6.	-	-	2	1	-	.	1	-
	vom 11.-20.6.	50	78	48	19	20	.	35	37
	vom 21.-30.6.	50	22	49	63	65	.	55	58
	nach dem 30.6.	-	-	1	17	15	.	9	5
Elbling, Weißer	bis 10.6.	.	.	-	.	.	-	-	-
	vom 11.-20.6.	.	.	29	.	.	14	26	18
	vom 21.-30.6.	.	.	63	.	.	86	68	73
	nach dem 30.6.	.	.	8	.	.	-	6	9
Ruländer	bis 10.6.	.	.	.	0	.	-	1	1
	vom 11.-20.6.	.	.	.	31	.	14	30	56
	vom 21.-30.6.	.	.	.	56	.	86	57	41
	nach dem 30.6.	.	.	.	13	.	-	12	2
Burgunder, Blauer	bis 10.6.	-	20	1	1	13	.	2	1
	vom 11.-20.6.	-	60	46	29	37	.	32	57
	vom 21.-30.6.	-	20	52	58	37	.	56	40
	nach dem 30.6.	-	-	1	12	13	.	10	2
Portugieser, Blauer	bis 10.6.	-	-	2	0	-	.	1	2
	vom 11.-20.6.	-	60	72	34	39	.	53	56
	vom 21.-30.6.	100	40	25	57	53	.	41	41
	nach dem 30.6.	-	-	1	9	8	.	5	1

Zahl der Meldungen über Beginn der Blüte

Müller-Thurgau	4	33	458	425	69	7	996	1 082
Riesling, Weißer	4	34	403	295	16	.	752	802
Silvaner, Grüner	2	23	308	288	59	.	680	769
Elbling, Weißer	.	.	24	.	.	7	31	34
Ruländer	.	.	.	254	.	7	261	281
Burgunder, Blauer	-	5	70	309	8	.	392	416
Portugieser, Blauer	1	5	216	205	13	.	440	479

3. Durchschnittliche Dauer der Blüte

% der ausgewerteten Meldungen

Rebsorte	Datum	Nord- rhein- West- falen	Hessen	Rhein- land- Pfalz	Baden- Württem- berg	Bayern	Saarland	Insgesamt	
								1974	1973
Müller-Thurgau	bis 4 Tage	-	12	5	3	4	-	4	8
	5 - 7 "	-	24	24	25	12	-	23	38
	8 - 10 "	25	46	47	38	45	100	44	44
	11 - 14 "	75	9	17	23	23	-	20	9
	15 Tage u.m.	-	9	7	11	16	-	9	1
Riesling, Weißer	bis 4 Tage	-	11	3	2	8	.	3	8
	5 - 7 "	-	18	23	21	31	.	22	33
	8 - 10 "	50	47	42	43	38	.	43	45
	11 - 14 "	50	18	22	25	8	.	23	13
	15 Tage u.m.	-	6	10	9	15	.	9	1
Silvaner, Grüner	bis 4 Tage	-	9	6	2	5	.	4	6
	5 - 7 "	-	22	29	22	15	.	25	36
	8 - 10 "	50	52	45	38	39	.	42	45
	11 - 14 "	50	13	18	31	24	.	24	12
	15 Tage u.m.	-	4	2	7	17	.	5	1
Elbling, Weißer	bis 4 Tage	.	.	-	.	.	-	-	-
	5 - 7 "	.	.	9	.	.	-	7	40
	8 - 10 "	.	.	24	.	.	100	43	37
	11 - 14 "	.	.	62	.	.	-	46	19
	15 Tage u.m.	.	.	5	.	.	-	4	4
Ruländer	bis 4 Tage	.	.	.	1	.	-	1	4
	5 - 7 "	.	.	.	23	.	-	22	38
	8 - 10 "	.	.	.	36	.	100	39	43
	11 - 14 "	.	.	.	27	.	-	26	13
	15 Tage u.m.	.	.	.	13	.	-	12	2
Burgunder, Blauer	bis 4 Tage	.	-	10	3	-	.	4	6
	5 - 7 "	.	25	33	19	57	.	23	36
	8 - 10 "	.	75	39	37	29	.	38	46
	11 - 14 "	.	-	13	29	14	.	25	11
	15 Tage u.m.	.	-	5	12	-	.	10	1
Portugieser, Blauer	bis 4 Tage	-	25	11	6	10	.	8	11
	5 - 7 "	-	50	34	28	20	.	31	40
	8 - 10 "	100	25	44	37	30	.	41	42
	11 - 14 "	-	-	9	24	30	.	16	7
	15 Tage u.m.	-	-	2	5	10	.	4	0

4. Begutachtung des Standes der Reben

Noten: 1,0 (sehr gut) = mehr als 3/4 Herbst, 2,0 (gut) = mehr als 1/2 bis
3/4 Herbst, 3,0 (mittel) = 1/2 Herbst, 4,0 (gering) = 1/4 bis 1/2
Herbst, 5,0 (sehr gering) = weniger als 1/4 Herbst.

Land Verwaltungsbezirk Anbaugebiet/Bereich	Note		
	1974		1973
	Juni	Mai	Juni
Nordrhein-Westfalen	2,2	2,8	2,5
Hessen	2,0	2,1	1,8
Hessische Bergstraße	1,9	1,6	2,1
Rheingau	2,0	2,2	1,7
Rheinland-Pfalz	2,0	2,2	2,1
Koblenz	2,1	2,3	2,1
Trier	2,2	2,3	2,1
Rheinhessen-Pfalz	2,0	2,1	2,1
Ahr	2,1	2,1	2,5
Mittelrhein	2,1	2,2	2,1
Bacharach	2,0	2,4	2,1
Rhein-Burgengau	2,2	2,0	2,1
Mosel-Saar-Ruwer	2,3	2,4	2,0
Bernkastel	2,2	2,2	2,0
Obermosel	2,7	2,7	2,1
Saar-Ruwer	2,4	2,5	2,2
Zell/Mosel	2,3	2,6	2,0
Nahe	2,0	2,2	2,1
Bad-Kreuznach	1,9	2,1	2,1
Schloß-Böckelheim	2,2	2,3	2,1
Rheinhessen	1,9	2,2	2,1
Bingen	2,0	2,3	2,1
Nierstein	1,9	2,2	2,0
Wonnegau	1,9	2,0	2,1
Rheinpfalz	2,0	2,1	2,2
Südliche Weinstraße	2,0	2,2	2,3
Mittelhaardt-Deutsche Weinstraße	2,0	1,9	2,0
Baden-Württemberg	3,1	3,3	2,2
Württemberg	3,0	3,1	2,2
Remstal-Stuttgart	2,9	3,1	2,3
Württembergisch Unterland	3,0	3,0	2,1
Kocher-Jagst-Tauber	4,0	4,1	2,2
Baden	3,1	3,5	2,1
Badische Bergstraße/Kraichgau	2,7	2,7	2,1
Badisches Frankenland	3,3	4,1	2,1
Bodensee	2,8	3,3	2,2
Markgräflerland	4,0	4,6	2,3
Kaiserstuhl-Tuniberg	2,9	3,4	2,1
Breisgau	3,2	3,6	2,1
Ortenau	2,6	2,6	2,1
Bayern	2,8	3,1	2,1
Unterfranken	2,8	3,1	2,1
Mittelfranken	3,2	3,8	2,6
Übrige Gebiete	2,3	3,0	2,0
Saarland	2,3	2,2	1,5
Bundesgebiet	2,3	2,5	2,1